Torcecuello

LR

Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

ESTATUS

Escaso

Escaso

Escaso

TAMAÑO

16–17 cm.

25–27 cm.

P

30-45 g.

Identificación:

Sexos similares. Poseen un plumaje muy mimético, de colores pardo- rojizos, grises y blanco finamente rallados de negro. Pico corto y puntiagudo. Lista superciliar oscura que llega hasta el final del cuello. Tiene otra línea casi negra en el píleo y el dorso.

Especies parecidas:

Se puede confundir de lejos con jóvenes de Alcaudón común.

Hábitat:

Huertos y jardines, zonas bien arboladas, en migración se pueden observar incluso en cañaverales y marismas.

Comportamiento:

Aunque es un picido, no se comporta como tal, no taladra los árboles para obtener alimento ni para hacer su nido, usa agujeros ya existentes. No utiliza la cola para trepar por los árboles, ya que posee una cola larga, parecida a cualquier otra ave. Es característico el modo de capturar a sus presas, tiene una larga lengua con la que extrae los insectos de las pequeñas cavidades.

Distribución:

Paleártico Occidental. En la Península Ibérica se encuentra la subespecie nominal típica. En el parque se encuentra en cualquier zona, si bien debido a su críptico plumaje suele ser detectado la mayoría de las veces por su canto.

Fenología:

Principalmente estival, existiendo algunas parejas reproductoras que pueden ser sedentarias. La migración prenupcial se realiza entre finales de febrero hasta Mayo y la postnupcial desde finales de Agosto hasta mediados de Octubre. Como invernante es raro.