500.000 525.000 550.000 575.000 600.000 625.000

4.200.000 4.175.000 4.150.000 4.125.000 4.100.000 4.075.000

Río de la Vega
Pico del Becerro
Sª de la Sagra
Sª del Pozo
Sª de Castril
EMBALSE SAN CLEMENTE
Río Castril
Río Guardal
Río Galera
Río Alhárabe
Río de Alcaín
Río Guadiana Menor
Río Guadalentín
Río Baza
Río Pardo
Río Gallego
Río Alcantar
Río Almanzora
Río Guadix
Sierra de Baza
Sierra de Gor
Sierra de los Filabres
Sierra Nevada
Río Nacimiento
Río Andarax
Río Chico
Río Aguas
Río Alias
Sª del Oso
Sª de María
Sª de Orce
Sª de las Estancias
Sª de Lucar
Sierra Alhamilla
Sierra de Gádor
Sª de la Contraviesa
Sª Cabrera
Mar Mediterráneo
Murcia
Baza
Caniles
Huéscar
Orce
Galera
Alcaín
Alcóntar
Alboloduy
Alcolea
Tabernas
Pechina
Almería
Aguadulce
El Ejido
Roquetas de Mar
Santa Domingo
Adra
Pulpí
Cuevas del Almanzora
Vera
Garrucha
Mojácar
Turre
Los Gallardos
Antas
Lubrín
Sorbas
Tabernas
Gérgal
Tahal
Alcudia de Monteagud
Huércal-Overa
Pozo-Cuerta
Rbla. de Alboloduy
Rbla. del Saltador
Rbla. de los Molinos
Rbla. de Morales
Rbla. del Arital
Rbla. del Saltador
EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA
EMBALSE DE BENMAR
EMBALSE DE CUEVAS DE ALMANZORA
EMBALSE DE LA BERMEJA
EMBALSE DE LA ALCOLEA
EMBALSE DE LOS MOLINOS
EMBALSE DE ISABEL II
A-92 A-334 A-330 A-92 N-340 N-344 N-340 A-92 N-340 N-344

Alpujarreño

- AP1 **BgPl.** Modelo alpujarreño de *Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.*
- AP2 **PcQr.t.** Modelo alpujarreño de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación termófila bética con *Pistacia lentiscus.*
- AP3 **SmQr.** Modelo alpujarreño de *Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.*
- AP4 **SmQr.c.** Modelo alpujarreño de *Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación calcífuga con *Cytisus malacitanus.*
- AP5 **BgPl.m.** Modelo alpujarreño de *Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.* Faciación mesomediterránea.
- AP6 **PcQr.** Modelo alpujarreño de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica.
- AP8 **AdQr.m.** Modelo alpujarreño de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación mesomediterránea con *Retama sphaerocarpa.*
- AP9 **BhQr.** Modelo alpujarreño de *Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.*
- AP11 **AdQr.s.** Modelo alpujarreño de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica supramediterránea.

Caridemo

- CA1 **MePa.** Modelo caridemo de *Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae S.*
- CA2 **ChRl.** Modelo caridemo de *Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S.*
- CA3 **Zl.** Modelo caridemo de *Ziziphoto loti S.*
- CA4 **Psl.** Modelo caridemo para vegetación litoral psamrófila.

Filábrico

- FI1 **PcQr.** Modelo filábrico de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica.
- FI2 **AdQr.m.** Modelo filábrico de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación mesomediterránea con *Retama sphaerocarpa*
- FI3 **DoPs.** Modelo filábrico de *Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.*
- FI4 **GbJn.** Modelo filábrico de *Genisto basticae-Juniperetо nanae S.*
- FI5 **AdQr.s.** Modelo filábrico de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica supramediterránea.
- FI6 **BhQr.** Modelo filábrico de *Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.*

Gadorense

- GA1 **SmQr.** Modelo gadorense de *Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.*
- GA2 **PcQr.t.** Modelo gadorense de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación termófila bética con *Pistacia lentiscus.*
- GA3 **PcQr.** Modelo gadorense de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica.
- GA4 **BhQr.** Modelo gadorense de *Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.*
- GA5 **DlAg.** Modelo gadorense de *Daphno latifoliae-Acereto granatensis S.* Faciación típica supramediterránea.
- GA6 **DoPs.** Modelo gadorense de *Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.*

Guadiciano-Baztetano

- GB1 **PcQr.** Modelo guadiciano-baztetano de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica.
- GB2 **RlQc.** Modelo guadiciano-baztetano de *Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S.* Faciación guadiciano-bacense y almeriense con *Ephedra fragilis.*

Marianense

- ME2 **RlJp.** Modelo manchego-espunense de *Rhamno lycioidis-Juniperetо phoeniceae S.*
- ME1 **BrQr.** Modelo manchego-espunense de *Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.*

Nevadense

- NE1 **BgPl.** Modelo nevadense de *Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.*
- NE2 **AdQr.m.** Modelo nevadense de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación mesomediterránea.
- NE3 **AdQr.s.** Modelo nevadense de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica supramediterránea.
- NE4 **GbJn.** Modelo nevadense de *Genisto basticae-Juniperetо nanae S.*

Almeriense Occidental

- OC1 **SmQr.** Modelo almeriense occidental de *Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.*
- OC2 **BgPl.w.** Modelo almeriense occidental de *Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.* Faciación con *Salsola webbii.*
- OC3 **MZl.** Modelo almeriense occidental de *Mayteno europaei-Ziziphoto loti S.*
- OC4 **PcQr.** Modelo almeriense occidental de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica.
- OC5 **AdQr.m.** Modelo almeriense occidental de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación mesomediterránea con *Retama sphaerocarpa .*
- OC7 **Mt.** Modelo almeriense occidental para vegetación edafoxerófila tabernense sobre margas subsalinas.
- OC8 **Yt.** Modelo almeriense occidental para vegetación edafoxerófila tabernense sobre yesos.

Almeriense Oriental

- OR1 **RlQc.** Modelo almeriense oriental de *Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S.* Faciación guadiciano-bacense y almeriense con *Ephedra fragilis.*
- OR2 **Zl.** Modelo almeriense oriental de *Ziziphoto loti S.*
- OR3 **ChRl.** Modelo almeriense oriental de *Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S.*
- OR4 **MePa.** Modelo almeriense oriental de *Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae S.*
- OR5 **RlQr.** Modelo almeriense oriental de *Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S.*
- OR6 **AdQr.m.** Modelo almeriense oriental de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación mesomediterránea con *Retama sphaerocarpa.*
- OR7 **Ys.** Modelo almeriense oriental para vegetación sobre yesos de Sorbas.
- OR8 **Yc.** Modelo almeriense oriental para vegetación sobre yesos de Sierra de Cabrera.

Serrano-Estandense

- SE1 **PcQr.** Modelo serrano-estanciense de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica
- SE2 **AdQr.m.** Modelo serrano-estanciense de *Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.* Faciación mesomediterránea con *Retama sphaerocarpa.*
- SE3 **DoPs.** Modelo serrano-estanciense de *Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.*
- SE4 **RmJp.m.** Modelo serrano-estanciense de *Rhamno myrtifolii-Juniperetо phoeniceae S.* Faciación mesomediterránea.
- SE5 **BhQr.** Modelo serrano-estanciense de *Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.*

Serrano-Mariense

- SR1 **PcQr.** Modelo serrano-mariense de *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.* Faciación típica.
- SR2 **BhQr.** Modelo serrano- mariense de *Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.*
- SR3 **DoPs.** Modelo serrano- mariense de *Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.*

Signos convencionales

- Autovía
- Carretera RIGE
- Red básica
- Núcleos de población
- Límite de provincia
- Ríos
- Embalses

Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz:
MODELOS DE GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN Y SERIES DE VEGETACIÓN
Mapa 3. Almería

1:400.000
0 5 10 20 30 Km

Consejería de Medio Ambiente
JUNTA DE ANDALUCIA