

4. GLOSARIO

Arvense: Adjetivo calificativo aplicado a las plantas que invaden cultivos y prados artificiales; generalmente en competencia con la vegetación sostenida por el hombre.

Axilar: Concerniente a la axila, situado o nacido en ella: rama axilar, pedúnculo axilar, racimo axilar.

Bulboso: Dícese de planta que tiene bulbo. Engrosado inferiormente a manera de bulbo.

Caducifolio: Así se llama a los árboles y arbustos que no se conservan verdes todo el año porque se les cae la hoja al comenzar la estación desfavorable (estación fría o seca). A este término se opone perennifolio.

Canchales: Zona generalmente con fuerte pendiente y sustrato constituido por piedras sueltas.

Cespitosa: Dícese de la planta capaz de formar césped; tratándose de gramíneas o de especies gramínoideas, las vivaces o perennes que amacollan mucho y, creciendo muy próximas, llegan a cubrir o encespedar extensiones más o menos grandes de terreno.

Cima: Inflorescencia cuyo eje remata en una flor, lo propio que los ejes secundarios que van surgiendo en sus costados.

Cimosa: Concerniente a la cima.

Cuspidado: Acabado en punta o cúspide.

Edáfica: Relativo al suelo. Se entienden como formaciones edáficas a las que, dentro del área climática general, ofrecen tipo diferente, debido al carácter diferencial del suelo.

Efímero: Pasajero, de corta duración.

Escapo: Es el tallo que, arrancando de un rizoma, bulbo, etc., está desprovisto de hojas y trae las flores en el ápice.

Esciófilo: Calificativo ecológico de las plantas que requieren sombra. Esta condición fisiológica suele acusarse con frecuencia en la morfología externa e interna.

Escobonal: Formación vegetal dominada por especies arbustivas de aspecto retamoide (*Genista sp.*, *Cytissus sp.*, etc.); propias de zonas elevadas de las montañas próximas al límite del bosque.

Espinar: Formación arbustiva dominada por especies espinosas caducifolias.

Estolón: Brote lateral, más o menos delgado, a menudo muy largo, que nace de la base de los tallos, tanto si se arrastra por la superficie del suelo como si se desarrolla debajo de él, y que, enraizando y muriendo en las porciones intermedias, engendra nuevos individuos y propaga vegetativamente la planta.

Estolonífero: Dícese de la planta que produce estolones.

Extraplomo: Paredón con una inclinación superior a los 90°.

Fenología: Estudio de ciertos fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo periódico como la brotación, la floración, la maduración de los frutos, etc.

Foliolo: Dícese de la rama foliar articulada sobre el raquis de una hoja o sobre las divisiones del mismo como las hojas de los tréboles.

Fronde: Hoja de los helechos, tanto las vegetativas (trofófilos) como las portadoras de esporangios (esporófilos).

Geófito: Planta terrestre. Planta herbácea vivaz cuyos órganos perdurantes en la época se encuentran bajo tierra (bulbos, rizomas y tubérculos).

Inerme: Desarmado. Aplicase a la planta, al tallo, etc., que no tiene espinas ni agujones.

Inflorescencia: Todo sistema de ramificación que se resuelve en flores. Cuando la flora nace solitaria, en el ápice del tallo o en la axila de una hoja, no existe la inflorescencia.

Juvenil: Referido a la edad del individuo, se considera juvenil cuando la planta no ha desarrollado aún sus estructuras reproductoras y ya no se observan sus cotiledones.

Labelo: En las flores de las orquídeas, el pétalo medio, superior (que resulta inferior por torsión del eje floral), generalmente de tamaño, forma y color muy distintos de los correspondientes a los dos pétalos laterales. Algunas veces el labelo se halla dividido en 3 porciones por medio de ceñiduras más o menos marcadas.

Lanceolada: Aplicase a los órganos laminares, como hojas, brácteas, pétalos, etc., de figura de hierro de lanza. Angostamente elípticos y apuntados en ambos extremos, como hojas de la adelfa.

Lastonar-pastizal: Formación herbácea dominada por especies de gramíneas, siendo especialmente abundante el lastón (*Festuca scariosa*).

Lineares: Prolongado y angosto, de bordes paralelos o casi paralelos, comparable en cierto modo a una línea de trazo grueso.

Marcescente: Aplicase a las hojas que se secan en la planta sin desprenderse. Hay árboles caducifolios que se quedan rápidamente deshojados, porque las hojas se caen aún antes de secarse por completo; otros, en cambio, como los quejigos no las pierden hasta muy avanzado el invierno porque sus hojas son marcescentes.

Ovada: Dícese de los órganos laminares, como hojas, pétalos, etc. de figura de huevo, colocado de manera que su parte más ancha corresponde a la inferior del órgano de que se trata. Si en vez de una lámina es un órgano macizo, es mejor emplear ovoide.

Peciolada: Dícese de la hoja provista de pecíolo, por oposición a la que carece de él, que se llama sésil.

Pecíolo: Pezón o rabillo que une la lámina de la hoja a la base foliar o al tallo. Su forma general, es rolliza y, por lo común, un poco acanalada superiormente. A lo largo de él discurren, en su interior, el hacecillo o los hacecillos conductores que van a parar al rastro foliar del tallo.

Perianto: Envoltura floral, compuesta por antofilos, que rodea los esporofilos; las más veces consta de cáliz y corola.

Pilosidad: Peloso.

Pínnula: Foliolo de una hoja bipinnati- o tripinnaticompuesta.

Piornal: Formación de matorral bajo presente en los pisos más altos de la montaña, dominada por pequeñas matas de porte almohadillado y generalmente espinosas (*Erinacea anthyllis* es muy característica de esta formación).

Plántula: Referido a la edad del individuo, considerando plántula cuando se pueden observar aún los cotiledones en la planta.

Postdispersión: Referido al estado fenológico; cuando la planta porta estructuras reproductoras del mismo año y han diseminado ya todo sus frutos y/o semillas.

Pubescente: Dícese de cualquier órgano vegetal cubierto de pelo fino y suave como un bozo: hojas pubescentes.

Raquis: Eje principal de una inflorescencia compuesta de gramínea, y, por extensión, eje de cualquier inflorescencia. Nervio medio de las

hojas compuestas, sobre el que se insertan los foliolos, o al de las frondes de los helechos.

Reproductor: Referido a la edad del individuo, cuando la planta presenta estructuras reproductoras.

Soro: En pteridófitos (helechos), grupo de esporangios, generalmente de forma característica, hemisférica u oblonga, localizado en los esporofilos.

Subrupícola: Dícese de aquellos vegetales que, como hábitat secundario, pueden vivir sobre rocas o peñascos.

Terófito: Referido a terófito.

Terófito: Conjunto de plantas anuales, capaces de completar todo el ciclo de su existencia en la estación favorable.

Tomentoso: Dícese de la planta o el órgano que están cubiertos de pelos generalmente ramificados, cortos y dispuestos muy densamente, por lo que semejan ser borra.

Umbela: Inflorescencia racemosa simple, con el extremo del eje principal ensanchado en mayor o menor grado para formar un receptáculo del cual arrancan todos los pedicelos, que aquí reciben el nombre de radios de la umbela, y tienen la misma longitud.

Umbrosa: Sinónimo de esciófilo.

Vegetativo: Referido al estado fenológico, la planta no porta estructuras reproductoras, únicamente fotosintéticas y de soporte.

Vivaz: Sinónimo de perenne.