

2018

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Ajedrea, saldoriya, tomillo real

Satureja obovata Lag.



Cneorum tricoccum
JARDÍN BOTÁNICO DETUNDA-CUEVA DE NERJA
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

RED ANDALUZA
JARDINES BOTANICOS
 EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Se trata de una mata de porte de mediano a grande (30 a 60 cm), con tallos erguidos y más o menos pelosos. Tiene hojas pequeñas (0,5 a 1,6 cm de largas) a veces algo crasas, enteras y obovadas. La floración aparece en espigas o dividida en verticilastros separados, con florecillas bilabiadas crema o púrpuras, pedunculadas (de hasta 0,5 cm), acampanadas, con dientes y pelos sobresalientes por la garganta. Con una floración muy extendida en el tiempo es posible verla en flora casi todo el año excepto a finales de invierno.


Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja - Calle Carretera a la Cueva s/n. C.P. 29787 Maro (Nerja, MÁLAGA) - Tfno: 670945712 - jbotanico.cuevanerja.cmaot@juntadeandalucia.es

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES												

¿Dónde crece?

Habita en tomillares y comunidades subarbusivas. Es indiferente al sustrato geológico, apareciendo sobre materiales calizos, margosos, basaltos o incluso esquistos y gneises. Su localización abarca desde las zonas costeras a la media montaña sin sobrepasar los 1.500 m snm (pisos termomediterráneo hasta supramediterráneo).



¿Dónde podemos encontrarla?

Esta bilabiada es exclusiva de la Península Ibérica concretamente en el cuadrante suroeste. Sin embargo, su presencia en el territorio es frecuente y muy extendida. En Andalucía aparece en las provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, en las zonas más costeras y del interior, haciéndose cada vez más rara conforme se aumenta la cota altitudinal.

¿Sabías qué?

De esta especie se han descrito hasta 4 variedades distintas que difieren morfológicamente sobre todo en las características de las hojas pero en el sector de este jardín se dan 3 de ellas. Aquellas con hojas estrechas y pelosas se denomina var. *obovata* y aparece en la mayor parte de su territorio. La var. *hispalense* se diferencia por presentar las hojas más estrechas, pelos glandulíferos muy pequeños en los tallos florales y los dientes del cáliz algo más largos. Está también muy extendida y puede aparecer en el sector Malacitano-almijarense. Y, por último, la variedad más extendida en la zona próxima al jardín (Axarquía) es la var. *malacitana*, de hojas algo crasas e inflorescencia dividida.

El nombre de ajedrea procede del nombre latino (*satureia*) que se le daba a esta planta y otras aromáticas como la *Thymbra capitata*. Se trata de una planta medicinal que se usa como antiespasmódico, carmitivo y antiséptico, con un aceite esencial rico en carvacrol y cineol. Tiene las mismas aplicaciones que otras ajedreas, en algunas zonas de la geografía se usa para adobar aceitunas.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí

