

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TAC CON CONTRASTE INTRAVENOSO

1. Deberá acudir a su cita en **AYUNAS** de alimentos sólidos. No tomará alimentos sólidos, como mínimo, desde 4 horas antes de la hora prevista para la realización de la prueba
2. Deberá **beber abundantes líquidos** durante las 24 horas previas y las 24 horas posteriores a la prueba. Se recomienda unos 2 litros diarios, siempre que no exista indicación médica en contra.
3. No suspenderá la toma de la medicación habitual.

Medicamentos cuya toma debe controlarse o suspenderse al realizar exploraciones radiológicas con contrastes yodados:

- En pacientes **diabéticos**, en tratamiento con METFORMINA O DIAMBEN, debe suspenderse la toma de este medicamento durante las 48 horas posteriores a la prueba.
- La toma de antiinflamatorios no esteroideos y aminoglucósidos debe suspenderse durante la prueba.
- Deben transcurrir 7 días entre la administración de fármacos quimioterápicos, en especial de los derivados del platino, y la administración de contrastes yodados.

Diabéticos en tratamiento con insulina: no es conveniente interrumpir la insulina ni alterar la dieta habitual. Aunque el ayuno no es recomendable, este no debe exceder las seis horas. Si se considera necesario, deberá administrarse la pauta de insulina habitual y controlar la glucemia con otros medios para lo cual deberá consultar a su médico.