

PREPARACIÓN PARA FISTULOGRAFÍA Y REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA DE HEMODIÁLISIS

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

La intervención es realizada por radiólogos intervencionistas bajo anestesia local y permite valorar el estado de su fístula de hemodiálisis. También permite tratar lesiones que provocan un mal funcionamiento de la fístula.

El equipo médico utilizará técnicas radiológicas, como la ecografía y los rayos X, y empleará contraste yodado durante la intervención.

En caso de tener lesiones que provocan un mal funcionamiento de la fístula, como estenosis o estrecheces, se tratarán mediante angioplastias o dilataciones y mediante la colocación de stents o prótesis para permitir un paso adecuado de la sangre y lograr buenas sesiones de diálisis.

¿CÓMO LE BENEFICIARÁ?

Este procedimiento permite valorar el estado, funcionamiento y permeabilidad de su fístula de hemodiálisis.

También permite identificar y tratar lesiones que provocan un mal funcionamiento de la fístula en la misma intervención. De este modo, se consigue prolongar lo máximo posible la vida y utilidad de su fístula.

¿CÓMO PREPARARSE?

La intervención suele realizarse de forma ambulatoria, de tal modo que no requiere ingreso y tras el procedimiento puede marcharse a casa.

Deberá hablar con su médico sobre la medicación que está tomando porque determinados medicamentos deben suspenderse o ajustarse.

Debe guardarse ayunas de 8 horas antes del procedimiento. Aunque podrá tomar su medicación con una pequeña cantidad de agua.

No es recomendable acudir solo a la intervención ni conducir después de la misma, ya que durante la misma puede emplearse medicación relajante.



¿QUÉ RIESGOS TIENE?

Es un procedimiento seguro con una probabilidad baja de complicaciones. Lo más habitual es que tenga molestias y un hematoma en la zona de punción, que desaparece en unos días.

Entre otras posibles complicaciones se encuentran la infección, el sangrado o la trombosis de los vasos estudiados. Estas complicaciones son poco frecuentes, pero pueden suponer un ingreso hospitalario y, muy excepcionalmente, poner en peligro la vida. De todos modos, si ocurriera cualquier complicación, no tenga la menor duda de que se tomarán las medidas adecuadas para intentar solucionarlo.

¿QUÉ PUEDE ESPERAR UNA VEZ COLOCADO EL CATÉTER?

Tras revisar y tratar su fístula podrá dializarse de nuevo sin los problemas que tenía.
Deberá mantener un vendaje en el brazo durante unas horas.
Deberá evitar realizar esfuerzos con el brazo durante unos días.

Si necesita información adicional respecto a la prueba o no puede asistir, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros en los siguientes teléfonos: **957 010 014** o envíe un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: rayos.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

