

Puede usar teléfonos móviles, los cuales no dañan su marcapasos.



Revisiones

Nosotros revisaremos periódicamente su marcapasos. Estas visitas no deben sustituir a las habituales con su cardiólogo y cualquier problema de interés médico debe consultarlo con su médico de familia, quien lo remitirá a donde crea oportuno.



Contacto

Nuestro teléfono de contacto es el: 951.032.636, pregunte por las enfermeras de la Unidad de Arritmias.

Puede encontrar más información en la Web:

<http://www.aredelcorazonhcv.com/>

Teléfonos de interés

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Atención al ciudadano	951 032 248
	951 032 020
	951 032 663
Centralita	951 032 000
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 032 394
Admisión de urgencias	951 032 391
Fax	951 032 022

Hospital Marítimo de Torremolinos

Atención al ciudadano	951 033 713
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 033 711
	951 033 712
Fax	951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero

Atención al ciudadano	951 034 000
	951 034 021
	951 034 031
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 034 005
Fax	951 034 035

Documento aprobado por la Comisión de Calidad
"Educación para la Salud"
Fecha de última revisión: 20/05/2010

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario Teatinos, s/n
29010 - Málaga - España
951 032 000 / Fax 951 032 022
<http://www.huw.es>



Hospital Universitario Virgen de la Victoria



Consejos para el paciente y familia sobre cuidados del Marcapasos

Equipo de Enfermería de la Unidad de Arritmias.
Servicio de Cardiología.
Unidad de Gestión Clínica del Corazón.


Recomendaciones

El equipo de Enfermería de la Unidad de Arritmias le propone las siguientes recomendaciones y consejos para el autocuidado de su marcapasos.

Debe permanecer en reposo absoluto durante las primeras veinticuatro horas después del implante.

Esto es, sin levantarse de la cama y procurando no mover el brazo del lado afectado por el implante.

Usted podrá iniciar la ingesta de alimentos después de haberle sido implantado el marcapasos.



A la mañana siguiente del implante ya se podrá levantar de la cama, caminar y realizar las actividades propias de su vida cotidiana.

Sin embargo, debe evitar realizar movimientos bruscos y repentinos de sus brazos, así como estiramientos forzados durante las cuatro primeras semanas tras el procedimiento.

Cuidados

La herida del procedimiento debe ser curada todos los días con solución antiséptica. Se aconseja usar Povidona Yodada (Betadine®) y tapar posteriormente con apósito estéril.



Esta operación, que es fácil de realizar, la puede llevar a cabo usted mismo o con la ayuda de un familiar durante quince días.



La primera semana cubrirá la herida con el apósito y la siguiente la dejará sin cubrir.

La sutura es reabsorbible, por lo tanto, los puntos no deben ser retirados y se caerán solos en quince o veinte días.

Vigile síntomas

Si el área de la herida se vuelve roja, hinchada o comienza a salir fluido de la misma, póngase inmediatamente en contacto con nosotros.

Haga esto mismo en el caso de que comience a tener fiebre durante los primeros días después del implante.

Tenga presente

Su marcapasos NO sufrirá daños con el manejo adecuado de los electrodomésticos de su casa, tales como microondas, televisor, ordenadores personales, etc.

La utilización de arcos de soldadura eléctricos, caminar o trabajar en centrales eléctricas, tampoco lo dañarán, pero pueden interferir en el adecuado funcionamiento del mismo, procure evitarlo.



En el caso de detectores de metales presentes en aeropuertos y centros oficiales, no pase bajo ellos, identifíquese con su carné de portador de marcapasos al responsable de seguridad.