




Recomendaciones para el control de *Prays oleae* y *Euzophera pinguis*



Recomendaciones para en el cultivo del olivo

FENOLOGÍA ACTUAL

Estado D

(Comienzo de formación de la corola)

RECOMENDACIONES (MEDIDAS CULTURALES)

- Debemos prestar especial atención al repilo debido a las condiciones de humedad a primeras horas de la mañana y al aumento de las temperaturas máximas registradas a medio día.
- Debido al estado fenológico que se encuentra el cultivo del olivo es esencial realizar la colocación de trampas de *Euzophera pinguis* para realizar su seguimiento.
- Es necesario colocar trampas tipo funnel (“polilleros”) con feromona y anotar las capturas, para determinar el momento del tratamiento, si fuese necesario hacerlo. Se coloca una sola trampa por parcela, desde el inicio de primavera hasta que descienden las capturas de adultos, y desde final de verano hasta que descienden las capturas de adultos. Cada semana se retiran los adultos capturados, se cuentan y se anotan. Puesto que los adultos mueren al aparearse y poner los huevos, cuando descienden las capturas indican que hay un mayor número de huevos puestos.
- Para el *Prays oleae* no se utilizarán trampas, según la Guía de Gestión Integrada de Plagas del cultivo del olivo.