



Muestreo de glifodes en el cultivo del olivo

GiP
Andalucía

A

Junta de Andalucía
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

▪ Estado fenológico

El estado fenológico dominante en esta zona, es el estado G2 o fruto cuajado.

▪ Metodología del muestreo

- Selección de la parcela de muestreo: si el olivar es homogéneo (en cuanto a condiciones ambientales: climatología, suelo), el muestreo que se realice sería válido para una superficie de 300 ha. Iniciar los muestreos al detectarse los primeros daños y determinar el alcance de los mismos.
- Número de árboles en cada parcela de muestreo: 10 árboles homogéneos.
- Número unidades de muestreo secundarias: 10 brotes seleccionados en todas las direcciones.
- Trampas que deban utilizarse: descripción, número y modo de uso. De manera opcional, se pueden colocar trampas delta con placa adhesiva y feromona, para hacer un seguimiento del vuelo de adultos. No obstante, preguntar antes a los servicios técnicos de la Administración correspondiente, puesto que en algunas comarcas olivareras este tipo de trampa no ha funcionado bien.
- Definición de las variables que se miden Se anotará el número de brotes atacados, y la variable es “Porcentaje de brotes atacados = (Nº de brotes atacados / Nº de brotes observados) por 100”.
- Época de muestreo Durante primavera y verano principalmente.

▪ **Resultado**

- Se observa presencia de **glifodes** en varetas y en plantaciones jóvenes. Debemos prestar especial atención en este tipo de plantaciones debido a que pueden detener su desarrollo vegetativo.
- Los niveles de capturas de ***Prays oleae*** en su generación carpófaga continúan subiendo. Es necesario realizar muestreos de la puesta en aceituna.
- Comienza la colocación de placas cromotrópicas en las distintas parcelas para realizar el seguimiento de la **mosca del olivo**.