



Recomendaciones para el control de araña marrón en aguacate



Junta de Andalucía
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

FENOLOGÍA ACTUAL

Engorde de fruto

RECOMENDACIONES (MEDIDAS CULTURALES)

- Preservar la fauna auxiliar autóctona, fundamentalmente depredadores, ácaros fitoseidos.
- La retirada de las partes vegetales afectadas contribuye a bajar las poblaciones.
- Se aconseja realizar lavados con jabón potásico.

Métodos biológicos:

- Se considera que la fauna auxiliar autóctona ejerce un control satisfactorio. Los depredadores más importantes son los mismos que intervienen en el control natural del ácaro cristalino.
- Destacan los ácaros fitoseidos del género *Euseius*, *Amblyseius* y *Galendromun* y coleópteros del género *Stethorus*.

Métodos físicos:

- Se pueden bajar las poblaciones, sobre todo de formas móviles (adultos, ninfas y larvas grandes) realizando lavados con agua a presión en las zonas afectadas. Los estados de desarrollo que se escaparían en un primer lavado, huevos y larvas pequeñas, se pueden controlar con una segunda aplicación.

Métodos químicos:

- Se recomienda restringir todo lo posible la realización de tratamientos para no afectar las poblaciones de auxiliares. Solo de forma puntual y localizada, en casos muy excepcionales, sería necesario realizar alguna aplicación.
- Se podrán utilizar en el caso de que existan, los [productos fitosanitarios autorizados para este uso en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.](#)