



Recomendaciones para la *Botrytis cinerea* en el cultivo de tomate

GiP
Andalucía

A

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

FENOLOGÍA ACTUAL

Estado Fenológico:

**Estado de
recolección**

RECOMENDACIONES (MEDIDAS CULTURALES)

- Manejar de forma adecuada la ventilación y el riego para reducir la humedad.
- Retirar y destruir los órganos dañados.
- Marco de plantación lo más amplio posible (siempre que no incida sobre la producción y la rentabilidad del cultivo).
- Evitar la presencia de agua libre sobre el cultivo.
- Abonar de forma equilibrada para evitar el exceso de vigor. Evitar el exceso de abonado nitrogenado.
- Evitar el exceso de follaje en la planta, eliminar los brotes vegetativos excesivos (chupones) lo antes posible.
- Evitar las heridas de poda, con una poda precoz y equilibrada.
- Retirar y destruir los restos de poda.
- Desinfectar el suelo mediante la solarización antes de realizar la plantación. Biofumigación.

Métodos de control químicos:

Se podrán utilizar, en el caso de que existan, los productos fitosanitarios autorizados para este uso en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a consultar en la dirección web:

<http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp>