



Recomendaciones para el control de acariosis en el cultivo del olivo



Junta de Andalucía
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

Recomendaciones para **acariosis** según la **Guía de Gestión Integrada de Plagas de olivar**:

FENOLOGÍA ACTUAL

Estado D o
comienzo de la
corola

RECOMENDACIONES (MEDIDAS CULTURALES)

- Para nuevas plantaciones, utilizar material de vivero sin síntomas de acariosis.
- El exceso de abono nitrogenado y de riego, favorece el desarrollo de esta plaga, no abusar de ello.
- El uso continuado de insecticidas piretroides favorece el desarrollo de esta plaga, por eliminación de los depredadores naturales, que pueden ser hasta quince veces más sensibles a estas materias activas.

Métodos de control biológico:

Se han detectado enemigos naturales, especialmente fitoseidos (*Typhlodromus* spp. y *Neoseiulus californicus*) y estigmeidos (*Zetzellia* spp.)

Métodos de control químico:

- Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- A la hora de seleccionar los medios de control se priorizarán siempre las medidas de prevención y/o culturales, seguidas por el resto de medidas alternativas al control químico y por último los medios químicos.