



RAIF
Red de Alerta e Información
Fitosanitaria de Andalucía

ALGODÓN
PROVINCIA DE CORDOBA

Boletín Fitosanitario
Del 30 de junio al 4 de julio
de 2025



Agentes más destacados: **Earias y heliotis**

ASPECTOS GENERALES



La **fenología** nos muestra como estado dominante en el cultivo "B" (Botones) en todas las zonas biológicas. La zona de Las Colonias es la más adelantada, apareciendo una cantidad importante de capsulas y las primeras flores blancas.

Las parcelas cuentan con una **densidad de plantación** en la provincia de 141 mil plantas/ha, destaca Las Colonias, con un valor medio de 157 mil plantas/ha.

El cultivo continúa con un buen desarrollo vegetativo, contando las plantas un valor medio provincial de **9.0 nudos** (dato anterior 8,6 nudos)

Esta semana (del 26 de junio al 2 de julio), las **temperaturas** máximas han estado entre los 39 °C y los 42 °C, y las mínimas en torno a 20-22 °C. La temperatura media ha estado en torno a los 30-31 °C.

La **previsión meteorológica** para la próxima semana nos indica temperaturas máximas comprendidas entre 37°C y 43°C y las mínimas comprendidas entre 22°C y 24°C, no se esperan precipitaciones. Los vientos van a ser flojos y de componente variable, predominando los vientos con dirección oeste - suroeste.

ARAÑA ROJA (*Tetranychus urticae*)



La incidencia de **Araña roja** (*Tetranychus urticae*) se ve favorecida por la subida de temperaturas y la falta de precipitaciones. Se aprecia un ligero descenso poblacional respecto a la pasada semana, encontrándose este agente distribuido principalmente en lindes y localizadas en focos. Por lo que es recomendable realizar inspecciones visuales en la parcela para constatar su presencia y valorar los niveles poblacionales.

La **media provincial** es de **6,55% de plantas ocupadas**, (4,80%, la semana pasada), detectadas en el 84% de las 25 ECB muestreadas.

Por Zonas Biológicas, Vega Alta continúa siendo es la más afectada, con una media en la zona de 16.17% de plantas ocupadas (la semana anterior 12.60%).

Por otra parte, la **media provincial** del número de adultos por hoja aumenta 0,30, siendo el dato de la semana anterior 0,20 adultos/hoja.



Hoja con araña roja

Es importante mantener limpias las lindes de malas hierbas, ya que es en estos lugares donde se refugian los adultos de estos ácaros antes de invadir los campos de algodón e igualmente aquellas lindes con parcelas sembradas de maíz ya que este cultivo es sensible al ataque de araña roja y puede ser lugar de entrada.

PULGONES (*Aphis gossypii*)



Pulgones

Se mantiene la presencia de **Pulgones** (*Aphis gossypii*), con un **nivel bajo**, de **0.50** de **media provincial** sobre el nivel de 0 a 3, (mismo valor que la semana pasada), encontrándose su presencia en el 85,71% de las 33 ECB muestreadas.

Por Zonas Biológicas, sigue siendo Vega Alta la más afectada con una presencia 0.66 pulgones.



Larva de coccinélido

Las altas temperaturas que se esperan los próximos días serán desfavorables para su desarrollo, aunque se recomienda vigilar su evolución, principalmente en los algodones más tardíos.

TRIPS (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabacci*)



En las observaciones realizadas, continúa apreciándose un descenso de las poblaciones larvianas de este agente, y que en estos primeros estadios del cultivo afecta al envés de las hojas, produciendo surcos plateados y deformaciones características en las mismas.

De los muestreos realizados en esta semana, se sigue observando actividad de este agente en algunas ECB de las Zonas Biológicas (menor que la semana pasada), destacando por los valores obtenidos Vega Baja y Santaella, con valor medio de 0,50 y 0,40 larvas/hoja, respectivamente.

El **valor medio provincial** desciende a 0,25 larvas/hoja, (0,30%, la semana pasada), observándose su presencia en el 25% de las ECB muestreadas.

HELIOTIS (*Helicoverpa armigera*)



Se generaliza el aumento de botones florales en todas las parcelas, se aprecia la presencia de las puestas de **heliotis** (*Helicoverpa armigera*).

Debemos seguir estando alerta y realizar frecuentes observaciones en nuestras parcelas para valorar la evolución biológica de esta plaga.

De las observaciones realizadas durante esta semana, se aprecia un **valor medio provincial** de 5.565,38 huevos/ha, (similar a la pasada semana), encontrándose su presencia en el 57,69% de las 26 ECB muestreadas.

Por Zonas Biológicas, sigue destacando la Zona Biológica de Santaella, con un valor medio de 10.522,22 huevos/ha.

En cuanto las poblaciones larvianas de esta semana, se observa un pequeño descenso a **nivel provincial**, con un valor medio de, 2.330,77 larvas pequeñas/ha, (2.810, la pasada semana) encontrándose su presencia en el 53,85% de las 26 ECB muestreadas.

Por Zonas Biológicas sigue siendo la Zona Biológica de Santaella la más afectada, con un valor medio de 5.110 larvas pequeñas/ha (5.830 la semana anterior).



Es interesante conocer que las condiciones meteorológicas que se vienen produciendo en estos días de altas temperaturas y baja humedad relativa, producen un ambiente desfavorable para la viabilidad de las puestas, además, con la previsión para los próximos días de aumento de las temperaturas va incrementarse esta desecación de las mismas.

Se aconseja prestar especial interés a la evolución de las puestas, principalmente en aquellas parcelas que se vayan a realizar riegos al cultivo, ya que una falta de control nos puede llevar a graves pérdidas de producción. En caso de cualquier duda, consulte con su **asesor fitosanitario**.

EARIAS (*Earias insulana*)



En los muestreos realizados durante esta semana, nos indican un leve descenso poblacional de las larvas de **earias** (*Earias insulana*) afectando tanto a los botones florales como a la yema apical del cultivo.

Por la incidencia registrada en esta semana, se observa a **nivel provincial**, un valor medio de 11.700 larvas pequeñas/ha, (13.000, la semana pasada) y encontrándose su presencia en el 85,75% de las 32 ECB muestreadas.

Por Zonas Biológicas destaca la Zona Biológica de Vega Alta, con un valor medio de 19.700 larvas pequeñas/ha (la semana anterior 17.000). También destacar que han sufrido un fuerte descenso de presencia de larvas, con respecto a la semana anterior, en las zonas biológicas de Las Colonias con 3.200 larvas pequeñas/ha, y Vega Baja con 3500 larvas/ha.

Actualmente las poblaciones larvarias de este agente son moderadas y en aumento respecto a la pasada semana, por ello, debemos de estar atentos y realizar las oportunas inspecciones a nuestras parcelas para detectar posibles aumentos poblacionales inesperados, ya que al igual en el seguimiento de **heliotis** (*Helicoverpa armigera*), las condiciones meteorológicas que se vienen produciendo en estos días de temperaturas elevadas y baja humedad relativa, producen un ambiente desfavorable para la viabilidad de las puestas, además, la previsión para los próximos días de aumento de las temperaturas va a favorecer la desecación de muchas puestas. Por lo que se aconseja prestar especial interés a la evolución de las mismas, principalmente en aquellas parcelas que se vayan a iniciar la aportación de agua de riego al cultivo, ya que una falta de control nos puede llevar a graves pérdidas de producción



INSECTOS AUXILIARES



Los **insectos auxiliares** presentes en el cultivo son un factor importante que puede ayudar al control de **pulgones**, **araña** o **mosca blanca**. En estos momentos los niveles, siguen aumentando. Es conveniente seguir su evolución, procurando favorecer su desarrollo y minimizar en la medida de lo posible el impacto negativo de los tratamientos para favorecer la instalación de esta fauna beneficiosa sobre el cultivo.



Se observa presencia de **Coccinella spp**, con una media de 5.000 larvas/Ha (13.000 la semana pasada). **Chrysoperla carnea** con una media de 10.000 larvas/Ha.

A su vez se observa presencia de **chinchas auxiliares** como **Orius**, con una media de 30.000 ninfas/Ha (25.000 la semana anterior).

Respecto a **Nabis**, se aprecia presencia en las observaciones realizadas en la zona biológica de Las Colonias.

ENLACES DE INTERÉS



- Conozca nuestra [Revista digital RAIF](#), trimestral, con artículos muy interesantes sobre las plagas y enfermedades que afectan a los distintos cultivos agrícolas de nuestra comunidad, así como otros aspectos de interés en la sanidad vegetal.
- Consultar [informes fitosanitarios anteriores](#).
- Consultar el [Manual de campo RAIF](#) del cultivo de algodón.
- **Real Decreto 1054/2022**, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. **El presente R.D. tiene como objeto:** establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (**SIEX**) conforme al artículo 5 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (**REA**) y el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (**CUE**), así como **facilitar un seguimiento de las prácticas de agricultores y ganaderos.** ([Ampliar información](#)).
- **Las personas que desarrollan actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios precisan de una formación, que asegure los máximos niveles de protección del medio ambiente, la seguridad de las producciones y la salud del agricultor.** El [Real Decreto 1311/2012 \(texto consolidado\) por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios](#) determina los requisitos de formación que deben poseer los usuarios profesionales a nivel nacional. En Andalucía este Real Decreto ha sido desarrollado por el **Decreto 96/2016**, de 3 de mayo, que regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Con la intención de mejorar la gestión del proceso de obtención de dicha tarjeta identificativa, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha desarrollado una aplicación que incluye la tramitación electrónica por parte de las personas interesadas. ([Ampliar información](#))
- Para consultar información sobre la [Producción Integrada en Andalucía](#) y acceder al [programa de gestión TRIANA](#) acceda a través de este apartado.
- Para obtener información, en el marco de la producción integrada, sobre aquellas **prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas**, así como de la estrategia de control a seguir, consulte **Reglamento Específico de Producción Integrada de olivar.** (Descargar [aquí](#)).
- Acceda al [VISOR RAIF](#) si desea consultar la situación fitosanitaria por Provincia y/o Zona Biológica.
- Consultar la relación de materias activas de [Insecticidas, Fungicidas y Acaricidas](#) autorizadas en Producción Integrada de algodón. La [Orden de 04 de abril de 2023](#) modifica los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Andalucía para **autorizar el uso de todas las sustancias inscritas en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA con las restricciones que se detallan en su ANEXO.**
- Consultar en el [Registro de Productos Fitosanitarios](#) del MAPA las materias activas autorizadas en el cultivo de olivar.
- Aquí puede consultar todo lo relativo a la [Gestión Integrada de Plagas](#) y las [Guías de Cultivos disponibles](#).



ALMENDRO
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Boletín Fitosanitario
Del 30 de junio al 4 de julio de 2025



Agentes más destacados: **Mosquito verde, tigre del almendro, ácaros, y mancha ocre**

ASPECTOS GENERALES



Estado fenológico "J" Fruto desarrollado.

El **estado fenológico** dominante en las distintas variedades sigue siendo "J" (Fruto desarrollado).

La **temperatura** media ha estado en los 30.5 °C, las máximas se han entre los 39-40 °C y las mínimas en los 20.5 °C. Las precipitaciones han sido residuales. La humedad relativa media ha sido del 35 %.

Según la **previsión meteorológica** para la próxima semana, nos indica temperaturas máximas comprendidas entre 37°C y 43°C y las mínimas comprendidas entre 22°C y 24°C, no se esperan precipitaciones. Los vientos van a ser flojos y de componente variable, predominando los vientos con dirección oeste - suroeste.

MOSQUITO VERDE (*Empoasca sp*)

Continúa el aumento del **porcentaje de brotes atacados**, con un valor que ha pasado del 15,3 % al **18,25%**, y registrado en todas las parcelas muestreadas.

Este insecto se alimenta de savia que succiona el de las hojas y brotes tiernos, dando lugar a deformaciones de las hojas, amarilleamientos y hasta incluso caída prematura. Es aconsejable prestar especial atención en plantaciones jóvenes e injertos.



Adulto de mosquito verde

ÁCAROS (*Eotetranychus c*, *Tetranychus urticae*, *Panonychus u.*)



Adulto de Tetranychus urticae

Las condiciones climatológicas que se dan en los meses de julio y agosto favorecen el desarrollo de este agente, que se valora en el **porcentaje de brotes atacados con formas vivas**. Durante este periodo de observación el valor de brotes afectados se ha mantenido en el 10,8%, registrándose este dato en el total de las estaciones muestreadas.

En los meses de julio y agosto, tanto en parcelas de secano como de regadío. Hay que tener en cuenta que las explotaciones convencionales que se trataron con azufre, en floración o con almendra cuajada, no presentaron tantos focos de araña como en las no tratadas.

TIGRE DEL ALMENDRO (*Monosteira unicostata*)

Leve aumento de la presencia de **brotes atacados con formas vivas**, con un porcentaje del **5.50 %**, (4,80% de la semana anterior) registrándose en la totalidad de las parcelas muestreadas.



Hoja afectada por tigre del almendro

Las hojas afectadas por la actividad de este agente presentan un punteado sobre el haz de la hoja y en el envés se observa una serie de pequeños puntos negros que son sus excrementos, la hoja se debilita, reduciendo la actividad fotosintética, y cuando el ataque es muy agresivo se produce la caída de las hojas.



Adulto de tigre del almendro

Es interesante realizar un reconocimiento de las parcelas para valorar el grado de presencia de este agente y el **porcentaje de eclosión de huevos**. En caso de duda solicite información a su **asesor o servicio técnico de su asociación**.

GUSANO CABEZUDO (*Capnodis tenebrionis*)



Adulto de gusano cabezudo

Se mantiene la presencia leve de adultos. Se observan daños sobre los brotes de las hojas. Las parcelas deben muestrearse semanalmente a partir de la entrada en vegetación del cultivo hasta final de verano, valorando la distribución y población de adultos y larvas neonatas. Dado que las condiciones que favorecen el desarrollo de esta plaga son las del secano o próximas a éste, es recomendable en lo posible mejorar en su caso las características del riego.

Es muy importante la detección precoz del problema con presencia de adultos, sin esperar a apreciar los primeros árboles deprimidos. Existe una gran influencia entre parcelas cercanas, actuando a menudo aquellas más abandonadas como foco de contaminación. Se recomienda, como medida complementaria para su control arrancar y quemar cuanto antes los árboles afectados, incluyendo el máximo de raíces.



Larva de gusano cabezudo

El control químico va dirigido a controlar los adultos a fin de evitar que realicen la puesta, diferenciándose dos periodos de tratamientos: el periodo de puesta de los adultos que salen de los refugios invernales y el de los adultos nuevos del año, siempre teniendo en cuenta el plazo de seguridad del producto para la fecha de recolección.

MANCHA OCRE (*Polystigma ocraceum*)



Vuelve a descender levemente el **porcentaje de brotes afectados**, con un valor que ha pasado del 18 % al **15.25 %**, registrado en todas las ECBs muestreadas.

Las variedades más sensibles suelen ser Guara, Antoñeta, etc, mientras que Lauranne, Vairo o ferragnes presentan una mayor tolerancia.

El hongo de un año para otro, permanece en las hojas que caen al suelo y en las que quedan adheridas al árbol, produciéndose una sola infección que pasa del suelo a la hoja, después en las hojas ya no hay nuevas reinfestaciones entre sí. Para evitar o reducir infecciones al año siguiente es importante eliminar las hojas del suelo o destruirlas mediante labores de cultivo.



Síntomas en hojas

CRIBADO (*Coryneum beijerinckii* / *Stigmia carpophila*)



En los muestreos realizados no se detectan **hojas con nuevos síntomas** de esta enfermedad, en todas las ECB.

Se recuerda que la estrategia de lucha contra esta enfermedad es preventiva, cuando las condiciones ambientales son favorables para la enfermedad, con temperaturas suaves y humedad relativa alta. La arboleda debe estar protegida desde el inicio de la brotación, en los estados fenológicos C/D, hasta el cuajado del fruto.

En primavera, en parcelas infectadas, el hongo empezará a producir esporas, a partir del micelio hibernante. La lluvia y el viento dispersarán dichas esporas, que germinarán e infectarán los tejidos. En otoño hay otra fase en la que el hongo vuelve a estar activo.

La destrucción de restos vegetales afectados, podas adecuadas que permitan una correcta aireación y el uso racional de abono nitrogenado son medidas culturales que ayudan a la prevención de esta enfermedad.

ROYA (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Dietel y *T. discolor* (Fuckel) Tranzschel y Litv.



Síntomas Foliares

Desciende levemente el **porcentaje de brotes afectados** pasando del 2 % al **1.5 %**, en todas las parcelas muestreadas.

La Roya es una enfermedad que causa defoliación en el almendro. Aunque en general su importancia suele ser escasa tradicionalmente en nuestra zona, donde suele causar poco daño y sin requerir tratamientos específicos, en las nuevas plantaciones más intensivas y con riego, deberá prestarse atención cuando las condiciones climáticas y microclimáticas son favorables al desarrollo del hongo, primaveras húmedas, temperaturas suaves y falta de aireación. Existe diferente susceptibilidad varietal.

La **Roya del Almendro** puede ser producida por dos hongos basidiomicetos, *Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Dietel y *T. discolor* (Fuckel)

Tranzschel y

Litv, que se diferencian morfológicamente por sus teleosporas. Éstas se componen de dos células similares en el primero y de distinto tamaño en *T. discolor*.

Las uredosporas de estas especies se caracterizan por ser anchas, fusiformes oclavadas con una pared dorada más engrosada en el ápice.



Síntomas en el envés

Los síntomas iniciales consisten en pequeñas lesiones cloróticas angulares de 1-2 mm en el haz de las hojas. Estas manchas están delimitadas, en forma y tamaño, por las nerviaciones foliares y más tarde se pueden agrupar varias y tomar un color amarillo dorado. En el envés de las hojas se aprecian pústulas pulverulentas de color naranja a marrón debidas a las fructificaciones del hongo.



Síntomas en el haz

En almendro se comporta como una roya de ciclo incompleto. El hongo inverna como micelio o uredosporas en las ramas y hojas de desarrollo tardío, que no se han desprendido del árbol. Así puede sobrevivir uno o dos años. Las uredosporas se extienden por el viento y la lluvia, pudiendo germinar con un amplio margen de temperaturas (8-38°C), siendo la humedad el factor limitante. Las uredosporas necesitan agua libre para germinar y

causar infección. Con más de 18 horas de alta humedad relativa se pueden completar ciclos de infección en unos 10 días. Las hojas jóvenes son más susceptibles y la roya se extiende en condiciones húmedas y cálidas especialmente al final de la primavera y en el verano.

INSECTOS AUXILIARES



No se observa la presencia de insectos auxiliares en las parcelas muestreadas en el periodo de observación.



Sifidos

ENLACES DE INTERÉS



- Conozca nuestra nueva [Revista digital RAIF](#), con artículos muy interesantes sobre las plagas y enfermedades que afectan a los distintos cultivos agrícolas de nuestra comunidad, así como otros aspectos de interés en la sanidad vegetal.
- Consulte aquí el [Real Decreto 1311/2012](#), de 14 de septiembre, por el que se establece un marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Aquí puede consultar todo lo relativo a la [Gestión Integrada de Plagas](#) y las [Guías de Cultivos disponibles](#).
- Está disponible en la web RAIF el acceso al nuevo [cuaderno de explotación](#), siguiendo las directrices del Real Decreto 1311/2012.
- Acceda al [visor RAIF](#) si desea consultar la situación fitosanitaria por provincia y/o zona biológica.
- Para obtener información, en el marco de la producción integrada, sobre aquellas prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas, así como de la estrategia de control a seguir, consulte el [Reglamento específico de Producción Integrada de cereales de almendro](#).
- Consultar la relación de materias activas de [Insecticidas, Fungicidas y Acaricidas](#) autorizadas en Producción Integrada de Almendro.
- Para consultar información sobre la [Producción Integrada en Andalucía](#) y acceder al [programa de gestión TRIANA](#) acceda a través de este apartado.
- Consultar en el [Registro de Productos Fitosanitarios](#) del MAPAMA las materias activas autorizadas en cereales de invierno.
- Consultar el [Manual de campo RAIF](#) del cultivo de Almendro



CÍTRICOS PROVINCIA DE CÓRDOBA

Boletín Fitosanitario
Del 30 de junio al 4 de julio de 2025



Plan de Vigilancia de Cítricos:

Greening o HLB de los cítricos: Publicado en BOE el [Real Decreto 115/2023, de 21 de febrero, por el que se establece el programa nacional de control y erradicación de *Trioza erytreae* y el programa nacional de prevención de *Diaphorina citri* y *Candidatus Liberibacter spp.*](#) La lucha contra la enfermedad de Huanglongbing, así como cualquiera de sus dos vectores conocidos y considerados organismos de cuarentena (*Trioza erytreae* y *Diaphorina citri*), se considera de utilidad pública. La presencia de *Trioza erytreae* en España fue declarada en 2015, mientras que se ha confirmado en 2022 y 2023 la presencia de *Diaphorina citri*, en la cuenca del Mediterráneo (Israel y Chipre), cuya aparición en nuestro país tendría un importante impacto ambiental, social y económico.

En 2020 se confirmó oficialmente en Andalucía, en las provincias de Huelva y Sevilla, la presencia de *Scirtothrips aurantii* por el LNR y en agosto de 2024 se informó de su presencia en las provincias de Córdoba y Málaga. Esta especie de trips es originaria de África, donde está muy extendida, reportándose también su presencia en Australia. Esta plaga representa una amenaza real para los cítricos, pero también tiene como hospedantes otras especies como los frutos rojos, aguacate, caqui, hortícolas...[\(Ampliar información\)](#).

Los periodos de recolección son un buen momento para la detección, tanto en campo como en las centrales de manipulación, de posibles deformaciones producidas por *Delottococcus aberiae*, especie de cotonet detectada en 2009 en Valencia y que está ocasionando importantes daños en el levante. En caso de su observación se recomienda dar aviso al Departamento de Sanidad Vegetal de la provincia. [\(Ficha fitopatológica\)](#).

A finales del 2013, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Italia, informó sobre la aparición de un foco de la bacteria *Xylella fastidiosa* en olivares del sur de este país. En la actualidad, la bacteria se ha detectado también en Italia (Toscana), en Francia (isla de Córcega y región PACA), en Portugal (18 zonas demarcadas activas) y en España en las comunidades autónomas de Islas Baleares, Comunidad Valenciana (Alicante) y Extremadura en 2024. En el área de Oporto se encuentra por primera vez la bacteria de *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* sobre cítricos. [Toda la información sobre *X. fastidiosa*](#).

Otras plagas cuarentenarias que están presentes en la cuenca del Mediterráneo y que se encuentran en fase de erradicación son: *Anoplophora chinensis*, *Bactrocera dorsalis*, *Phyllosticta citricarpa* (mancha negra de los cítricos), *Thaumatotibia leucotreta*, *Aleurocanthus spiniferus* o *Scirtothrips dorsalis* entre otras.

ASPECTOS GENERALES



El **estado fenológico** dominante de la **campaña 2025-2026**, que dio comienzo el 1 de abril de 2025, es **J "Fruto al 40% de desarrollo"** en el 95% de las estaciones muestreadas. La zona biológica La Sierra permanece aún como estado dominante **I₂ "Cierre del cáliz"**.

Durante el periodo de observación las **temperaturas** medias han registrado valores en torno a los **30,5 °C**, las máximas han rondado los **40°C** y las mínimas han oscilado entre los **21 °C**. La humedad relativa media no ha superado el 35%, habiéndose registrado ligeras precipitaciones con un acumulado de **0,15 l/m²**.

La **previsión meteorológica** para los próximos 7 días prevé **temperaturas máximas** en torno a los **42 °C** y **mínimas** en torno a los **22 °C**; los **cielos** se mantendrán **despejados**, siendo **baja** la probabilidad de **precipitaciones**.

En caso de alcanzar el umbral de tratamiento, y teniendo en cuenta otros factores, se recomienda el uso de los plaguicidas y fungicidas más compatibles con la fauna auxiliar y alternar las materias activas con distinto modo de acción.

Agente destacado:

Piojo rojo de California

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (*Aonidiella aurantii*)



En nuestra zona de cultivo, al **piojo rojo de California (PRC)** se le ha calculado una **constante térmica generacional de 600 grados día** acumulados partiendo de un **umbral inferior de desarrollo de 11.7 °C**. Así, sumando los grados días acumulados a partir del máximo de **Formas Sensibles (L1+L2)** correspondientes a la 1ª generación se puede prever el de la 2ª generación y así sucesivamente con la 3ª y posible 4ª e incluso 5ª generación. También es posible prever el máximo de Formas Sensibles (L1+L2) de cualquier generación monitoreando el **vuelo de machos** mediante placas engomadas con feromona, y es que, entre el máximo del vuelo de machos y el máximo de Formas Sensibles (L1+L2) hay una diferencia en torno a los **300 grados** acumulados según datos históricos en nuestra zona de cultivo.

Hay que tener en cuenta que, el **seguimiento al binocular de los distintos estadios biológicos** por los que evoluciona el PRC es imprescindible para determinar, realmente, el máximo de Formas Sensibles (L1+L2) de cada generación una vez que aquéllos están sometidos a la meteorología acontecida, pudiéndose adelantar o retrasar dicho máximo.

Por todo ello, y de cara al control poblacional de la 2ª generación se informa que:

- Teniendo en cuenta que, en la semana del 2 de junio, con un acumulado en torno a los 552 grados, se registraron **valores altos de Formas Sensibles (L1+L2) de la 1ª generación**, para la **2ª generación** se prevé un **máximo de Formas Sensibles (L1+L2)** a los **1152 grados acumulados**.
- Por otro lado, se recuerda que, **respecto al 1º vuelo de machos**, este año hubo un pico a principios de mayo con un acumulado de 257 grados, **previéndose el pico del 2º vuelo en torno a los 857 grados**.
- Por todo ello, y una vez sumados 300 grados al acumulado en la integral térmica de esta semana, que se prevé un **máximo de Formas Sensibles (L1+L2) en torno a los 1157 grados acumulados**.
- **Esta semana se acumula en la integral térmica entorno a los 1010 grados, quedando, por tanto, cercano el máximo de formas sensibles (L1+L2) de la 2ª generación.**

En el caso de programar un **tratamiento**, las dos recomendaciones principales son las siguientes:

- Por un lado, tener en cuenta las temperaturas máximas registradas, ya que, altas temperaturas en combinación con una baja humedad relativa pueden ser el mejor tratamiento, llegando a producir una elevada mortandad de larvas móviles y recién fijadas. Hay que inspeccionar bien el interior de las copas, donde el ambiente más fresco y húmedo favorece la supervivencia de esta plaga, ralentizándose en todo caso su desarrollo.
- Y, por otro lado, hacer el seguimiento de los distintos estadios biológicos por los que evoluciona este agente, porque, aunque la integral térmica indique que la provincia se halla en torno al máximo de Formas Sensibles (L1+L2), este valor para una Zona Biológica es orientativo, por lo que se hace imprescindible confirmar localmente que se alcanzan valores elevados.

PULGONES (ppalmt. *Aphys spiraecola* y *Aphys gossypii*)



Se recomienda, especialmente en aquellas épocas en las que hay movimiento de sabia en los árboles, primavera y otoño, prestar atención a la actividad y desarrollo de los pulgones.

Se observa un descenso acentuado esta semana en la incidencia de **brotos con presencia** pasando a un valor de **0.42%** (1% la semana anterior). Su presencia sigue disminuyendo hasta el **42% de las parcelas muestreadas (50% la semana pasada)**.

Hay que matizar que, a parte del **control químico** que sobre esta plaga se realiza teniendo en cuenta los criterios de la gestión integrada, recientemente ha podido haber estado sometido a los tratamientos que se realizan para el control del piojo rojo de California. También las **altas temperaturas** registradas le han podido afectar negativamente.



Es importante recomendar el seguimiento de esta plaga especialmente en **plantaciones jóvenes o reinjertadas**.

COTONET (*Planococcus citri*)



El muestreo de **cotonet** es muy importante durante toda la campaña, **debiéndose concentrar este, cuando el fruto ya esté desarrollado, en zonas de contacto entre frutos y entre frutos y hojas**. Cuando está en crecimiento se recomienda intensificarlo en torno al estado fenológico cierre del cáliz, momento en el que se desplaza hacia el ombligo del fruto (en las del grupo Navel especialmente) aumentando así su vulnerabilidad ante un posible tratamiento.

Esta semana continúa observándose su presencia, si bien **la incidencia es escasa**. La media provincial de **frutos con presencia de colonias** desciende hasta el **2% (2.5% la semana pasada)**.



Hay que tener en cuenta que, *P. citri* pasa el **invierno** protegido en hendiduras, en cortes de poda o en cualquier otra zona del tronco con grietas o fisuras, preferiblemente en la parte sombreada del árbol. En **primavera**, las cochinillas invernantes entran en actividad y se desplazan desde sus refugios hacia el cultivo para colonizar y alimentarse de ramas, ramillas y frutos recién cuajados, apareciendo entre abril y mayo la 1ª generación.

Actualmente, la plaga se encuentra en su **2ª generación**.

A parte de implementar estrategias de control biológico, recurriendo a tratamientos químicos cuando aquéllos no sean eficientes, **es muy importante controlar las poblaciones de hormigas y/o evitar que suban a los árboles** ya que son el principal agente dispersor y protector de esta plaga al obtener nutrientes de ella.

TRIPS (*Scirtothrips aurantii*)



Una vez confirmada, en noviembre de 2020, la presencia del trips *Scirtothrips aurantii* Faure en la provincia de Huelva, **la plaga está ya extendida por la provincia de Córdoba, confirmándose este año su presencia en el término municipal de Palma del Río**.

Esta especie, **es muy polífaga**, se puede encontrar en más de 50 especies de plantas en una amplia gama de diferentes familias, **es originaria de África y Yemen**, donde está muy extendida y causa daños en **cítricos** y algo en mango y aguacate. Según normativa europea, está considerado un **organismo de cuarentena** y, consecuentemente, sometido a regulación, siendo necesario tomar medidas para su erradicación y control. Además, está recogido en la lista A1 de la EPPO (Organización Europea para Protección de las Plantas), la cual recoge los organismos de cuarentena que están ausentes en la región EPPO.

En las cuatro últimas campañas de cítricos, las capturas durante los meses de **enero** y **febrero** prácticamente se mantienen nulas, comenzando a "caer" algunos adultos en las placas amarillas colocadas para su monitoreo durante el mes de marzo. Además, en dicho mes, aunque de manera anecdótica, se puede observar algún brote verde dañado por esta plaga, si bien, no se suelen observar larvas. Es en el mes de **abril**, con temperaturas y humedad relativa favorables, cuando el desarrollo y dispersión de *S. aurantii* aumenta, observándose en **mayo**,



de manera importante, daños nuevos en hojas y en frutos recién cuajados en fase de cierre del cáliz. Dicha incidencia podría reducirse considerablemente en el caso de inviernos y/o inicios de primavera con precipitaciones importantes y temperaturas frescas, tal y como ha ocurrido este año, siendo prácticamente nula su presencia en este mes tanto en placas cromotrópicas como en frutos recién cuajados. Hay que matizar que, sobre esta plaga se realizó su control químico al inicio del cuajado del fruto, hecho que disminuyó aún más su población. **Actualmente, las capturas son escasas, las altas temperaturas registradas en la última semana han bajado la población de la plaga, no apreciándose apenas daños en frutos y hojas**.

Teniendo en cuenta la **predilección de este trips por los brotes nuevos y los frutos al inicio de su desarrollo**, y en aras de prevenir daños en los frutos, **se considera como periodo crítico aquel que va desde la caída de pétalos hasta que el fruto alcance cierto desarrollo**, debiéndose prestar especial atención en aquellas parcelas con huéspedes colindantes.

Respecto a su control, químico y biológico, se recuerda que, a través del **Registro de productos autorizados del MAPA**, se puede consultar el listado de materias activas autorizadas en Cítricos para el control de trips, pudiéndose incorporar, dado el caso, nuevas materias activas o productos fitosanitarios mediante la autorización correspondiente; en cuanto a su control biológico, aún no se tiene suficiente información.

ÁCAROS



Sigue sin observarse **hojas con formas móviles** de **ácaro rojo** (*Panonychus citri*) ni de *Eutetranychus* spp. en ninguna de las zonas biológicas. En la provincia de Córdoba mayoritariamente se identifica la especie *E. orientalis*.

El efecto lavado que han tenido las lluvias durante el otoño de 2024 e invierno y primavera de 2025, mantienen a estas dos plagas con una **población prácticamente nula sobre el cultivo**. En las últimas semanas hay que añadir las **calurosas temperaturas** registradas, las cuales tienen un efecto negativo en el desarrollo de las plagas en general. Aun así, se recomienda prestarles especial atención en esta época.



En el momento de tomar cualquier decisión sobre el control químico de ácaros en general, se recomienda valorar el nivel de **fauna auxiliar** existente ya que éste podría ser suficiente para su control.

MINADOR DE LOS CÍTRICOS (*Phyllocnistis citrella*)



La incidencia de **minador** en las estaciones de control muestreadas sigue siendo baja con valores que continúan descendiendo. Esta semana el porcentaje **de brotes con daños** es de **0.8%** (1.5% la semana anterior), estando presente de forma generalizada en la provincia.

Se recomienda prestar atención a la aparición de daños en brotes nuevos, sobre todo en plantaciones jóvenes y en variedades reinjertadas, ya que éstas son muy sensibles a su ataque.



ENLACES DE INTERÉS



- Conozca nuestra **Revista digital RAIF**, trimestral, con artículos muy interesantes sobre las plagas y enfermedades que afectan a los distintos cultivos agrícolas de nuestra comunidad, así como otros aspectos de interés en la sanidad vegetal.
- Consultar **informes anteriores**.
- Consultar el **Manual de campo RAIF** del cultivo de los cítricos.
- **Real Decreto 1054/2022**, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. **El presente R.D. tiene como objeto:** establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (SIEX) conforme al artículo 5 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) y el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE), así como **facilitar un seguimiento de las prácticas de agricultores y ganaderos.** (**Ampliar información**).
- **Las personas que desarrollan actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios precisan de una formación, que asegure los máximos niveles de protección del medio ambiente, la seguridad de las producciones y la salud del agricultor.** El **Real Decreto 1311/2012 (texto consolidado) por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios** determina los requisitos de formación que deben poseer los usuarios profesionales a nivel nacional. En Andalucía este Real Decreto ha sido desarrollado por el **Decreto 96/2016**, de 3 de mayo, que regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Con la intención de mejorar la gestión del proceso de obtención de dicha tarjeta identificativa, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha desarrollado una aplicación que incluye la tramitación electrónica por parte de las personas interesadas. (**Ampliar información**)
- Para consultar información sobre la **Producción Integrada en Andalucía** y acceder al **programa de gestión TRIANA** acceda a través de este apartado.

- Para obtener información, en el marco de la producción integrada, sobre aquellas **prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas**, así como de la estrategia de control a seguir, consulte **Reglamento Específico de Producción Integrada de cítricos: naranjas, mandarinas, pomelos y limones**. (Descargar [aquí](#)).
- Consultar la relación de materias activas de **Insecticidas, Fungicidas y Acaricidas** autorizadas en Producción Integrada de cítricos. La **Orden de 04 de abril de 2023** modifica los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Andalucía para **autorizar el uso de todas las sustancias inscritas en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA con las restricciones que se detallan en su ANEXO**.
- Consultar en el **Registro de Productos Fitosanitarios** del MAPA las materias activas autorizadas en el cultivo de los cítricos.
- Acceso al **Plan Andaluz de Vigilancia Fitosanitaria en Cítricos**.
- Aquí puede consultar todo lo relativo a la **Gestión Integrada de Plagas** y las **Guías de Cultivos disponibles**.
- Acceda al **VISOR RAIF** si desea consultar la situación fitosanitaria por Provincia y/o Zona Biológica.



OLIVAR PROVINCIA DE CÓRDOBA

Boletín Fitosanitario
Del 30 de junio al 4 de julio
de 2025



Se recuerda que la legislación vigente establece que, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, donde haya leña y restos procedentes de la poda anual del olivar, se tomen las medidas reguladas por la [Ley 43/2002 de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal](#) y desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante las órdenes [del 2 de noviembre del 1981](#) y [del 10 de marzo de 1982](#) que resume y determina las normas a seguir para prevenir los daños de Barrenillo del olivo (*Phloeotribus scarabaeoides*).

A finales del 2013, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de **Italia**, informó sobre la aparición de un foco de la bacteria *Xylella fastidiosa* en olivares del sur de este país. **En la actualidad**, la bacteria se ha detectado también en **Italia** (Toscana), en **Francia** (isla de Córcega y región PACA), en **Portugal** (17 zonas demarcadas activas) y en **España** en las comunidades autónomas de Islas Baleares y Comunidad Valenciana (Alicante).

[Toda la información sobre X. fastidiosa.](#)

ASPECTOS GENERALES

En las zonas biológicas de olivar las temperaturas máximas han oscilado entre 37 y 43 °C y las mínimas entre 18-23 °C, variando la temperatura media entre 28-31°C. En la zona Sierra Morena Guadiato y Sierra Morena Oriental se han registrado precipitaciones escasas comprendidas entre 3,68-2 L/m². Los vientos han sido por lo general flojos y una humedad relativa media por debajo del 40%. Se pueden consultar estos datos en la [tabla de datos meteorológicos](#).

Según a [previsión meteorológica](#) para la próxima semana, nos indica temperaturas máximas comprendidas entre 37°C y 43°C y las mínimas comprendidas entre 22°C y 24°C, no se esperan precipitaciones. Los vientos van a ser flojos y de componente variable, predominando los vientos con dirección oeste - suroeste.



Estado fenológico "G2"

El **estado fenológico** más abundante, en el 83% de las parcelas de control, es "H" (endurecimiento de hueso) siendo en el 17% restante "G2" (fruto cuajado).



Estado fenológico H



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



Junta de Andalucía
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

POLILLA DEL OLIVO (*Prays oleae*) generación carpófaga



Orificio de entrada en fruto

El porcentaje medio de frutos con formas vivas de prays en las zonas más atrasadas es del 8,43% (incluidos los huevos viables). Aparecen frutos con daños en el 100% de las parcelas analizadas.

Las zonas biológicas Campiña Alta Oriental con un 16% y Sierra Morena Oriental con un 17% de aceitunas con prays vivo; en el resto de las zonas se obtienen valores inferiores a la media.

El RPI de olivar indica que habría que intervenir contra esta generación cuando se alcance un 20% de frutos con puestas viables y el 20% de las puestas estén eclosionadas. En estos momentos el porcentaje de huevos eclosionados es el 54,24%.

Siguen apareciendo huevos vacíos, posiblemente influenciado por las altas temperaturas.

Los datos expuestos son medias de zonas amplias para indicar la tendencia temporal que tiene este agente. Para tomar la decisión de intervenir o no contra esta generación del prays en una determinada parcela es imprescindible la determinación de los parámetros citados antes en esa parcela.

Biología de la generación carpófaga: La generación carpófaga corresponde a la fase del ciclo del *Prays oleae* en la que las larvas se alimentan de la almendra (o semilla) contenida en el fruto del olivo. Durante esta etapa, las hembras depositan los huevos en la superficie del fruto. Una vez eclosionados, las larvas se introducen y permanecen protegidas en el interior del fruto, lo que les permite alimentarse de manera eficaz y, en muchos casos, provocar daños irreversibles en la semilla. La acción depredadora de enemigos naturales, principalmente de insectos como la crisopa (*Chrysoperla carnea*), puede reducir significativamente la viabilidad de los huevos, llegando en algunos casos a disminuirla hasta en un 50%.

Daños ocasionados: La actividad de las larvas en la generación carpófaga repercute directamente en la cantidad de la producción del olivar. La posible caída prematura de los frutos repercute en pérdidas económicas significativas para el sector oleícola. En episodios de alta infestación los daños pueden resultar muy severos.

Condiciones ambientales favorables y desfavorables: El desarrollo de la generación carpófaga está fuertemente condicionado por factores climáticos. Temperaturas moderadas, situadas en torno a los 20–25 °C, favorecen la actividad de los adultos y el rápido desarrollo de las larvas, permitiendo que el ciclo biológico se coordine estrechamente con el crecimiento del fruto. Por otro lado, temperaturas extremas (ya sean muy elevadas o demasiado frías) pueden retrasar la eclosión o incluso producir mortalidad en algunas fases del desarrollo. Asimismo, la humedad relativa juega un papel crucial: niveles adecuados de humedad aseguran una eclosión óptima de los huevos y evitan la desecación de las larvas, mientras que una sequedad excesiva o una humedad en exceso pueden, respectivamente, obstaculizar el desarrollo del insecto o favorecer la presencia de enfermedades microbianas tanto en el propio olivo como en la plaga. Las particularidades del microclima en el olivar, en función de la gestión del suelo y la vegetación circundante, pueden marcar diferencias significativas en la intensidad de la infestación.

Medidas para el control y la minimización de sus efectos: El manejo eficaz del *Prays oleae* requiere la implementación de estrategias integradas que combinen diversas medidas:

- **Medidas culturales:** Mantener cubiertas vegetales en los surcos o franjas de vegetación natural en los lindes del olivar resulta fundamental para favorecer la presencia de enemigos naturales. Estas prácticas pueden contribuir a la reducción del sustrato disponible para la plaga, además de promover un ecosistema más equilibrado en el cultivo.
- **Control biológico:** La liberación controlada de depredadores, como la crisopa (*Chrysoperla carnea*), y la conservación de parasitoides autóctonos se ha comprobado como una herramienta eficaz para disminuir la población de *Prays oleae*. Estos agentes biológicos actúan sobre las fases tempranas de la puesta, reduciendo el número de huevos viables y, en consecuencia, el potencial de desarrollo de larvas.
- **Control químico:** En situaciones en las que las medidas culturales y biológicas no controlan adecuadamente la plaga, se recomienda recurrir a aplicaciones puntuales de insecticidas autorizados. Es fundamental realizar estas aplicaciones en momentos óptimos para maximizar la eficacia del producto. Además, se aconseja alternar entre distintas materias activas de forma estratégica, a fin de evitar el desarrollo de resistencias y minimizar el impacto sobre la entomofauna beneficiosa.

Estas estrategias, aplicadas en el marco de un manejo integrado de plagas, permiten reducir significativamente los daños ocasionados por la generación carpófaga, a la vez que se protege el ecosistema del olivar y se promueve una producción sostenible.

En resumen, comprender la biología y el comportamiento de la generación carpófaga del *Prays oleae* es fundamental para diseñar y aplicar medidas que minimicen sus efectos devastadores sobre el olivar. La adecuada coordinación entre condiciones ambientales, monitoreo de la plaga y uso combinado de herramientas culturales, biológicas y químicas constituye la clave para garantizar la salud y productividad del cultivo.

MOSCA DEL OLIVO (*Bactrocera oleae*)



Mosquero Mc-Phail

La media provincial de capturas de moscas en mosqueros y día ha sido de 1,27 (mismo dato de la semana anterior) de un total de 77 estaciones muestreadas, sobresaliendo el dato de la zona biológica de la Subbética Septentrional con 14 moscas por mosquero y día. En cuanto las capturas en placas la media provincial ha subido a 0,29 moscas por placa y día (la semana pasada 0,19).

En cuanto la fertilidad la media provincial baja a un 8.21% (17,50% la semana anterior) destacando la zona biológica de Sierra Morena Occidental con un 100% de hembras fértiles.

La mosca del olivo es una plaga que puede provocar tanto una disminución del rendimiento como una merma importante de la calidad de los aceites.

Las moscas que ahora encontramos en los olivares son las que emergieron en primavera de las pupas enterradas en el suelo; sobreviven alimentándose de sustancias azucaradas que encuentran en flores y en otros lugares. Los inviernos lluviosos, que encharcan el terreno, y las labores de suelo tras la recolección pueden rebajar mucho la población de moscas que emergerán de dichas pupas.



Trampa cromotrópica

Aproximadamente a los tres días de la cópula las hembras pueden efectuar la puesta en frutos para que se inicie una nueva generación. La mosca precisa para ello frutos con el estado fenológico de endurecimiento de hueso o iniciando este estado. Una regla práctica es que, cuando las aceitunas tienen aproximadamente 10 milímetros de diámetro, son susceptibles a la picada de la mosca.

En el 58% de las parcelas de control el estado fenológico es el de endurecimiento del hueso, estos frutos son receptivos, son adecuados para que la mosca los pueda picar.

La temperatura por encima de 36 °C, junto con humedad relativa baja, limita mucho la viabilidad de las distintas fases biológicas de este insecto. Las condiciones ambientales óptimas para la mosca se producen con temperaturas entre 20 °C y 25 °C.

El Reglamento de Producción Integrada establece una tolerancia diferente para la mosca según sea el destino del fruto: En almazara se permite cierto porcentaje de fruto afectado pero un fruto picado no sirve para su aderezo; por esta razón se recomienda prestar especial atención en olivares de verdeo.

Es importante monitorizar la actividad de la mosca con trampas, tanto alimenticias como con feromonas; de esta forma podemos detectar la presencia de mosca en el olivar. También es importante la observación de frutos para ver si la mosca ha empezado a afectarlos.

De las 59 parcelas muestreada no se detecta picada en ninguna de ellas.

Conviene señalar que existe una fauna auxiliar, que puede ejercer un cierto control sobre el crecimiento poblacional de este agente; entre esta fauna auxiliar se pueden destacar a las siguientes especies: *Pnigalio mediterraneus*, *Psittalia concolor*, *Eurytoma martellii*, *Cyrtopyx latipes* y *Eupelmus urozonus*.

ABICHADO (*Euzophera pinguis*)



Excrementos de larvas

Se sigue monitorizando el vuelo con trampas de feromonas y **la media provincial de adultos por trampa y día** desciende a 0,71 (1,26 la semana anterior). Se producen capturas en el 48% de las 25 parcelas de control que han aportado datos. Destacan las zonas biológicas Campiña Alta Oriental I (1,70), campiña Baja Occidental (1,09), Las Colonias Vegas Bajas (1,80) y Sierra Morena Occidental (2,0) adultos por trampa y día. En el resto de las zonas las capturas son menores que la media provincial.



Larva

Euzophera pinguis es un lepidóptero de la familia Pyralidae que actúa como barrenador en el olivo, especialmente en árboles debilitados, viejos o mal gestionados. **Aunque suele considerarse una plaga secundaria, puede provocar daños significativos en determinadas circunstancias**, especialmente si se dan condiciones favorables para su desarrollo o si coincide con otras plagas como el repilo o la tuberculosis.

La biología de *E. pinguis* incluye una o dos generaciones anuales, dependiendo del clima. Las hembras adultas depositan sus huevos en grietas de la corteza, heridas de poda, ramificaciones o en zonas afectadas por enfermedades o heladas. Al eclosionar, las larvas se introducen en el interior de las ramas, donde excavan galerías en el tejido subcortical y cambium. Tras completar su desarrollo larvario, pupan en el interior de las galerías o en la corteza, y de ahí emergen los adultos.

Los daños más característicos son las galerías llenas de serrín y excrementos, así como abultamientos o necrosis en la madera. Esto provoca interrupción del flujo de savia, debilitamiento de ramas, defoliación parcial e incluso la muerte de partes afectadas del árbol. Las entradas de las galerías suelen estar marcadas por acumulaciones de serrín y resina, y pueden facilitar la entrada de patógenos secundarios.

Para combatir esta plaga, lo más importante es aplicar medidas preventivas. Es clave mantener los árboles sanos, evitar el estrés hídrico o nutricional, y realizar podas correctas que no dejen heridas grandes o mal cicatrizadas, es importante aplicar pasta sellante tras la poda. Los restos de poda deben eliminarse o triturarse para evitar que actúen como focos de infestación. En casos graves, puede optarse por la eliminación de ramas afectadas. El control químico no suele ser eficaz, ya que las larvas se desarrollan protegidas en el interior del árbol. Por ello, se recomienda el seguimiento de la plaga y la protección de la fauna auxiliar, especialmente himenópteros parasitoides que actúan sobre sus larvas.

BARRENILLO (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Se siguen produciendo salidas de barrenillo en palos cebo de la mayor parte de las zonas biológicas en las que se mantiene el muestreo.

Se recuerda que la legislación vigente establece que, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, donde haya leña y restos procedentes de la poda anual del olivar, se tomen las medidas reguladas por la Ley 43/2002 de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal y desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante las órdenes del 2 de noviembre del 1981 y del 10 de marzo de 1982 que resume y determina las normas a seguir para prevenir los daños de Barrenillo del olivo (*Phloeotribus scarabaeoides*).



Orificios de entrada

El barrenillo del olivo (*Phloeotribus scarabaeoides*) es un coleóptero de la familia Curculionidae, subfamilia Scolytinae, considerado una de las principales plagas de los olivos en climas mediterráneos. **Ataca especialmente a árboles debilitados, mal gestionados o con presencia de ramas secas y restos de poda sin eliminar.**

Su biología incluye varias generaciones al año, dependiendo de la temperatura. Los adultos emergen en primavera y buscan lugares favorables para la puesta, como ramas cortadas, troncos debilitados o madera muerta. Excavan galerías de nutrición y reproducción bajo la corteza, donde las hembras depositan los huevos. Las larvas se alimentan del tejido subcortical, formando galerías perpendiculares a las maternas. Tras completar su desarrollo, se transforman en pupas y luego emergen como adultos, repitiendo el ciclo.

Los daños se deben a la actividad de las larvas y adultos en las ramas, donde las galerías interrumpen el flujo de savia, provocando marchitez, pérdida de hojas y muerte de ramillas. Las zonas afectadas muestran brotes secos y decaimiento del vigor general. Además, las galerías pueden facilitar la entrada de hongos y otras enfermedades. Esta plaga también afecta a los esquejes en viveros, dificultando la reproducción vegetativa del olivo.

Las medidas de control se basan principalmente en la prevención. Es fundamental mantener el olivar en buen estado sanitario, evitando el debilitamiento del árbol. La poda debe realizarse de forma correcta y los restos deben eliminarse o triturarse rápidamente, ya que son el principal foco para la puesta. También se recomienda evitar heridas innecesarias y controlar otras enfermedades que debiliten la planta. El control químico es poco eficaz debido a la protección que ofrece

la corteza, por lo que no suele ser recomendable salvo en situaciones excepcionales. **El manejo integrado y la limpieza continua del olivar son las herramientas más efectivas para minimizar su incidencia.**

OTIORRINCO (*Othiorhynchus cribricollis*)

Se ha observado su presencia en el 31,8% de las 85 parcelas de control analizadas en mayo. La media provincial es el 0,8% de brotes de la copa afectados. Destacan las zonas biológicas Campiña Baja Oriental (3,5%), Campiña Baja Occidental (1,6%) y Las Colonias-Vega Baja (1,6%).

El **otiorrinco del olivo**, *Othiorhynchus cribricollis*, es un coleóptero de la familia Curculionidae que, aunque históricamente ha sido considerado una plaga menor, en los últimos años ha adquirido mayor relevancia en algunas zonas olivereras, especialmente en plantaciones jóvenes o con manejo ecológico. Esta especie es polífaga, afectando también a otros cultivos leñosos y ornamentales.



Hojas con insectos

Desde el punto de vista biológico, *O. cribricollis* presenta un ciclo de vida adaptado a climas templados y se reproduce de forma partenogenética, es decir, sin necesidad de machos, lo que favorece su rápida expansión. Los adultos, de color negro o pardo oscuro y con cuerpo robusto, no vuelan, lo que limita su dispersión natural. Su actividad se concentra durante la noche o en condiciones de baja luminosidad, ya que se ocultan durante el día bajo restos vegetales, piedras o en grietas del suelo. Las hembras depositan los huevos en el suelo, donde las larvas se desarrollan alimentándose de raíces.

Los principales daños en el olivo los causan los adultos, que se alimentan del borde de las hojas jóvenes, dejando unas muescas semicirculares características. Aunque este daño no suele ser grave en árboles adultos, puede afectar al desarrollo de plantas jóvenes, reduciendo su vigor y ralentizando su crecimiento. En casos de alta densidad, la defoliación parcial puede comprometer la brotación o la formación floral del siguiente ciclo. Las larvas, por su parte, se alimentan de raíces, aunque en el olivo este daño suele ser menor que en otras especies.

Las condiciones meteorológicas influyen significativamente en su desarrollo. *O. cribricollis* prefiere climas templados y húmedos, siendo más activo en primavera y otoño. Los veranos muy secos y calurosos limitan la actividad de los adultos y la supervivencia de las larvas, mientras que inviernos suaves favorecen la persistencia de las poblaciones.

Para minimizar los daños del otiorrinco, es fundamental el seguimiento visual de los daños en hojas, especialmente en primavera y otoño. En plantaciones jóvenes o ecológicas, pueden utilizarse bandas adhesivas o barreras físicas en los troncos para impedir el ascenso de los adultos. También se recomienda mantener el suelo limpio de restos vegetales y evitar un exceso de humedad. En casos graves, pueden aplicarse tratamientos con insecticidas autorizados al suelo o al follaje durante los momentos de máxima actividad nocturna. Además, el fomento de enemigos naturales, como aves insectívoras y carábidos, puede contribuir al control biológico de esta plaga.

TOPILLOS (*Pitymys sp.*)

Se ha detectado su presencia en el 22% de las 41 parcelas de control analizadas.

Los topillos (género *Pitymys*) son pequeños roedores que viven en madrigueras. Su aspecto recuerda al de un ratón, pero tienen cola mucho más corta (2-2,5 cm) y orejas pequeñas, con pelaje pardo amarillento y vientre blanquecino. Construyen nidos subterráneos con musgo y raíces a unos 30-35 cm de profundidad, formando galerías largas. Pueden tener 4-5 camadas al año (3-4 crías cada una, hasta 12-20 crías anuales). Son nocturnos y crepusculares, pasando la mayor parte del tiempo bajo tierra. Su población suele estar limitada por depredadores naturales (reptiles, aves rapaces, mamíferos), por lo que eliminar estos controladores naturales puede favorecer plagas.



Daños de topillo



Topillo

Daños en el olivar: Los topillos son herbívoros y resultan claramente perjudiciales para el cultivo. Se alimentan de raíces y corteza basal de los árboles, provocando anillamientos en el tronco a ras de suelo. En plantaciones de frutales jóvenes (y en el olivar), roen la corteza cercana al suelo y destruyen raíces en distintos puntos, lo que puede causar la muerte de los árboles afectados y un importante decaimiento de la plantación. Según las guías técnicas oficiales, en olivares jóvenes y viveros los daños pueden ser graves. Los síntomas más evidentes son árboles secos o débiles y túneles superficiales en el suelo junto a las raíces dañadas.

Medidas de control: Las recomendaciones oficiales insisten en un manejo integrado basado principalmente en prácticas culturales y el respeto a los depredadores naturales. Entre las medidas más eficaces se citan:

- **Labores culturales:** eliminar las hierbas adventicias en el pie de los olivos y arar o pisar el suelo para destruir galerías en la zona radicular. En olivos de regadío se puede usar riego por inundación para anegar las madrigueras.
- **Control biológico:** favorecer la presencia de depredadores autóctonos que regulan naturalmente la población de topillos.
- **Métodos físicos:** se pueden usar trampas de caída no tóxicas; por ejemplo, enterrar recipientes o cajones a ras de suelo en las galerías para capturar los topillos al caer.
- **Rodenticidas autorizados:** solo deben usarse cebos químicos homologados cuando sea estrictamente necesario. Su aplicación ha de ajustarse a la normativa vigente y priorizar siempre las técnicas no químicas.

GLIFODES (*Palpita vitrealis*)

En el muestreo realizado en mayo, el porcentaje de brotes de la copa afectados es el 2,5% como media provincial.

Estos daños aparecen en el 37,1% de las 124 parcelas de control que han aportado datos.

Destacan la zona biológica Campiña baja Oriental (9,0%), Campiña baja Occidental (4,8%) y Las Colonias-Vega Baja (2,9%).



Daños de Glifodes

El glifodes del olivo, *Palpita vitrealis*, es un lepidóptero de la familia Crambidae que, aunque tradicionalmente se ha considerado una plaga secundaria del olivo, en los últimos años ha incrementado su presencia e incidencia en diversas zonas olivareras, especialmente en aquellas de clima más cálido y húmedo. Su presencia también se ha documentado en otros hospedantes, como el jazmín y algunas especies de laurel, lo que favorece su persistencia en el entorno.

La biología del glifodes comprende varias generaciones al año, con mayor actividad entre la primavera y el otoño. Los adultos son polillas de tamaño medio, con alas blancas semitransparentes y un característico reflejo nacarado. Las hembras depositan los huevos en el envés de las hojas jóvenes. Tras la eclosión, las larvas se alimentan del limbo foliar, generando galerías y perforaciones características. En casos de fuerte infestación, pueden llegar a consumir por completo las hojas o agruparse sobre los brotes tiernos, afectando al crecimiento vegetativo del árbol.

Los daños ocasionados por *P. vitrealis* afectan principalmente a la masa foliar del olivo. Las larvas se alimentan de las hojas tiernas, provocando defoliaciones que debilitan al árbol, especialmente si coinciden con etapas de estrés hídrico o con ataques de otras plagas. Además, al atacar los brotes jóvenes, pueden interferir en la formación de la floración del año siguiente, con la consiguiente pérdida de rendimiento.

Las condiciones meteorológicas influyen notablemente en la dinámica poblacional del glifodes. Temperaturas suaves y una humedad ambiental moderada favorecen su desarrollo, mientras que inviernos fríos y veranos excesivamente secos pueden limitar su expansión. Las zonas costeras o de sierra baja, con microclimas más húmedos, suelen presentar mayores niveles de infestación.

Para minimizar los daños causados por *P. vitrealis*, es fundamental llevar a cabo un seguimiento regular de su presencia mediante inspección visual de brotes y hojas, especialmente en primavera y principios de otoño. En casos de elevada población, puede valorarse la aplicación de insecticidas autorizados, preferiblemente selectivos, en los primeros estadios larvarios, cuando su eficacia es mayor. El fomento de la biodiversidad y de enemigos naturales, como crisopas y sírfidos, contribuye al control biológico del glifodes. Además, mantener un equilibrio en el abonado nitrogenado ayuda a reducir el atractivo del olivo para esta plaga, ya que los brotes muy tiernos favorecen la oviposición.

ACARIOSIS (*Aceria oleae*)



Hojas afectadas

Se detecta su presencia en el 48,2% de las 83 parcelas de control muestreadas desde mediados de mayo.

Biología de *Aceria oleae*. *Aceria oleae* es un ácaro del grupo de los eriophídeos que presenta un cuerpo alargado y vermiforme, con dimensiones que oscilan entre 0,1 y 0,35 mm. Debido a su reducido tamaño, se requiere el uso de aumentos para poder estudiarlo en detalle. Su ciclo de vida es muy ágil, pudiendo completarse en tan solo 10–15 días bajo condiciones favorables. Durante este ciclo, el ácaro pasa por las etapas de huevo, larva, ninfa y adulto, lo que le permite generar rápidamente colonias que pueden afectar considerablemente al olivar. Estos ácaros se alimentan del tejido blando de hojas,

brotos y, en algunos casos, de estructuras florales, lo que los hace especialmente dañinos durante los periodos de máximo crecimiento vegetativo, como la primavera y el verano.

Daños Causados en el Olivar. La infestación por *Aceria oleae* provoca una serie de síntomas en el olivo que pueden comprometer tanto su desarrollo como su productividad:

- **Deformaciones y Agallas:** Uno de los síntomas más característicos es la formación de agallas en las hojas y brotes. Estas deformaciones pueden alterar la arquitectura del árbol y reducir la capacidad fotosintética.
- **Decoloración y Enrollamiento:** Las hojas afectadas pueden presentar tonalidades amarillentas o bronceadas, y en casos severos, llegar a enrollarse, lo que indica un significativo detrimento en su funcionalidad.
- **Retraso en el Crecimiento:** En plántones y árboles jóvenes, la alimentación excesiva del ácaro puede limitar el crecimiento, debilitando la planta y haciéndola más vulnerable a otras plagas y enfermedades.
- **Impacto en la Producción:** En olivos destinados tanto a la producción de aceite como a la obtención de aceituna de mesa, la presencia de *Aceria oleae* puede traducirse en una disminución de la calidad y cantidad de la cosecha.

Influencia de las Condiciones Ambientales. El desarrollo y la propagación de *Aceria oleae* están estrechamente relacionados con las condiciones ambientales:

- **Temperatura:** El ácaro prospera en condiciones de temperatura moderada, típicamente durante la primavera y el verano, que facilitan un desarrollo rápido y la multiplicación de sus poblaciones. Temperaturas extremas, tanto altas como bajas, pueden limitar su actividad y supervivencia.
- **Humedad:** Una humedad relativa adecuada favorece la proliferación de estos ácaros, dado que un ambiente muy seco puede resultar desfavorable para su ciclo de vida. Además, prácticas agronómicas inadecuadas, como un exceso de riego, pueden potenciar su desarrollo al crear microclimas ideales para su reproducción.
- **Manejo del Cultivo:** La aplicación desmedida de abonos nitrogenados, que estimula un crecimiento vegetativo excesivo, puede aumentar la susceptibilidad del olivo al ataque de *Aceria oleae*. De igual manera, ciertos tratamientos químicos, como el uso continuado de insecticidas piretroides, pueden desplazar el equilibrio natural, eliminando enemigos biológicos que normalmente controlan la plaga.

Medidas para Controlar la Plaga y Minimizar sus Efectos. El manejo de la acariosis en el olivar debe basarse en un enfoque integrado que combine medidas culturales, biológicas y, en última instancia, químicas:

- **Medidas Culturales y Preventivas:**
 - **Selección de Material Vegetal:** Es fundamental el uso de plántones y viveros libres de acariosis, evitando así la introducción de la plaga en nuevas plantaciones.
 - **Manejo del Riego y Fertilización:** Se debe evitar el exceso de riego y abonos nitrogenados, ya que estas prácticas pueden crear condiciones que favorezcan la proliferación del ácaro.
 - **Monitoreo Sistemático:** Realizar inspecciones periódicas durante las fases de mayor actividad vegetativa y en la floración permite detectar a tiempo la presencia de la plaga, lo que facilita una intervención oportuna.
- **Control Biológico:**
 - **Uso de Enemigos Naturales:** Se han identificado depredadores como ciertos fitoseidos (*Typhlodromus spp.*, *Neoseiulus californicus*) y estigmeidos (*Zetzellia spp.*) que pueden ayudar a reducir las poblaciones de *Aceria oleae*. Fomentar y proteger a estos enemigos naturales es clave para mantener el equilibrio biológico en el olivar.
- **Control Químico:**
 - **Aplicación Cautelosa de Pesticidas:** Los productos fitosanitarios autorizados deben considerarse únicamente cuando las medidas preventivas y biológicas no resulten suficientes. Es importante elegir

aquellos productos que tengan el menor impacto posible sobre los enemigos naturales de la plaga, evitando el uso indiscriminado de insecticidas, especialmente piretroides.

ALGODONCILLO (*Euphyllura olivina*)



Inflorescencias afectadas

En los muestreos realizados desde mediados de mayo, el porcentaje medio provincial de frutos con presencia de masa algodonosa o insectos es el 7,4% y estas parcelas afectadas son el 87,1% de las 93 parcelas de control analizadas. Destacan las zonas biológicas Campiña Alta Occidental (9,1%) y Subbética Meridional (8,0%), en el resto de las zonas se obtienen porcentajes inferiores a la media provincial.

El algodoncillo del olivo (*Euphyllura olivina*) es un pequeño insecto hemíptero de la familia Psyllidae, que afecta principalmente a los brotes y flores del olivo. Es una plaga habitual en zonas con primavera templada y húmeda, y **aunque normalmente no causa daños graves, puede afectar la producción si se dan condiciones favorables a su**

desarrollo.

La biología de *E. olivina* se caracteriza por presentar una generación anual. Los adultos pasan el invierno refugiados en grietas de la corteza o en la vegetación del entorno. Con la llegada de la primavera, se reactivan y las hembras depositan los huevos en los brotes tiernos y racimos florales. Las ninfas, al emerger, se alimentan succionando savia, segregando al mismo tiempo una sustancia cerosa blanca muy característica, similar al algodón, que les sirve de protección. Esta fase coincide con el desarrollo floral del olivo, entre marzo y mayo, dependiendo de la zona.

Los daños que causa el algodoncillo son principalmente indirectos. La succión continua debilita brotes jóvenes y flores, lo que puede reducir el cuajado de frutos. Además, la sustancia algodonosa dificulta la correcta polinización, ya que puede cubrir las flores e impedir el acceso de los insectos polinizadores. En ataques intensos, puede haber una caída prematura de flores y debilitamiento general del crecimiento vegetativo. Los daños son más visibles en olivares jóvenes o en años con primaveras especialmente suaves y húmedas.

Para combatir esta plaga, se recomienda un seguimiento visual en primavera, especialmente durante la floración. Si se detectan poblaciones elevadas de ninfas, puede considerarse un tratamiento insecticida específico, preferentemente de forma localizada y respetando la fauna auxiliar. La poda equilibrada, que favorezca la aireación y evite el exceso de brotes tiernos, también contribuye a reducir la incidencia. Además, mantener el olivar libre de malas hierbas y restos vegetales facilita la detección y limita refugios invernales del insecto. En general, un manejo adecuado y el control natural por parte de depredadores y parasitoides suele ser suficiente para mantener las poblaciones de *Euphyllura olivina* por debajo del umbral de daño.

VERTICILOSIS (*Verticillium dahliae*)

En el periodo en el que se ha realizado los muestreos de verticilosis, la media provincial de árboles con síntomas de esta enfermedad es menor al 0,1%. Se han encontrado árboles afectados en el 7% de las 45 parcelas de control analizadas.

La verticilosis del olivo, causada por el hongo *Verticillium dahliae*, es una de las enfermedades vasculares más graves que afectan a este cultivo en regiones mediterráneas. Se trata de un patógeno de suelo que ataca a través del sistema radicular y coloniza los vasos conductores, provocando alteraciones fisiológicas que pueden desembocar en la muerte de ramas o incluso del árbol completo.

Desde el punto de vista biológico, *V. dahliae* es un hongo capaz de sobrevivir durante años en el suelo en forma de estructuras de resistencia llamadas microsclerocios. Estas estructuras germinan en presencia de exudados radiculares del olivo u otras plantas hospedantes. Tras penetrar por las raíces, el hongo asciende por el xilema, multiplicándose y liberando toxinas que obstruyen el transporte de savia. Existen dos formas patogénicas principales: la defoliante, más agresiva y frecuente en variedades sensibles como 'Picual', y la no defoliante, de menor impacto, pero también relevante.

Los síntomas más comunes incluyen marchitez progresiva de ramas, amarilleamiento de hojas, defoliación, decaimiento general y necrosis vascular. En los casos más graves, se observa la muerte súbita de ramas completas o del árbol entero. La enfermedad puede manifestarse de forma lenta y crónica o con brotes agudos en primavera u otoño, coincidiendo con condiciones favorables para el hongo.

Las condiciones meteorológicas tienen una influencia decisiva en la aparición y gravedad de la verticilosis. La humedad del suelo elevada, las temperaturas suaves (entre 20 y 25 °C) y un drenaje deficiente favorecen la infección y diseminación del



Árbol con síntomas



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



Junta de Andalucía
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural

hongo. Por el contrario, los suelos bien aireados y los veranos secos y calurosos limitan su desarrollo. La alternancia de lluvias y temperaturas moderadas en primavera y otoño suele coincidir con una mayor expresión de la enfermedad.

Para minimizar los daños causados por *V. dahliae*, se recomienda una estrategia preventiva y de manejo integrado. Entre las medidas más eficaces destacan el uso de material vegetal certificado y libre de patógenos, la elección de variedades más tolerantes (como 'Frantoio' o 'Empeltre'), y la mejora del drenaje y estructura del suelo. También es fundamental evitar el cultivo de especies hospedantes previas (como algodón, tomate o girasol) y reducir el laboreo profundo que pueda activar los microsclerocios. En parcelas afectadas, la solarización del suelo, el uso de cubiertas vegetales no hospedantes y la incorporación de materia orgánica pueden contribuir a reducir la presión del inóculo en el medio.

REPILO (*Fusicladium oleagineum*)



Hoja con síntomas

Se han realizado una serie de evaluaciones para determinar cuanta presencia de repilo hay en estos momentos en las parcelas de control. Desde mediados de mayo hasta mediados de junio, en las 99 parcelas de control analizadas se detecta presencia de repilo visible en el 79,8% de ellas. El porcentaje medio provincial de hojas con repilo visible es el 3,7%.

Los datos detallados del porcentaje de hojas con repilo visible en cada zona biológica, ordenados de mayor a menor son los siguientes:

Campiña Alta Occidental	4,7 %
Campiña Baja Occidental	3,5 %
Subbética Central	3,4 %
Subbética Meridional	3,0 %
Sierra Morena Central	2,9 %
Campiña Baja Oriental	2,7 %
Sierra Morena Occidental	2,5 %
Campiña Alta Oriental I	2,5 %
Sierra Morena Oriental	1,8 %
Las Colonias-Vega Baja	1,7 %

El repilo del olivo (*Fusicladium oleagineum*, antes *Spilocaea oleagina*) es una enfermedad fúngica que afecta principalmente a las hojas del olivo, aunque en casos severos también puede dañar brotes y peciolo. El hongo penetra a través de los estomas y desarrolla su micelio en el interior de la hoja, donde forma manchas circulares de color oscuro que posteriormente se necrosan, provocando defoliación prematura. Esta pérdida de hoja reduce la capacidad fotosintética del árbol, debilitándolo y disminuyendo la producción de aceituna en las siguientes campañas.

La estrategia para luchar contra la enfermedad es preventiva, con tratamientos fungicidas cuando las condiciones ambientales sean propicias para su desarrollo. La humedad elevada es un factor clave, ya que el hongo necesita agua libre en las hojas para germinar y penetrar en los tejidos. Factores como la lluvia, el rocío, las nieblas y las humedades relativas altas favorecen su evolución, al igual que aquellas condiciones que prolongan la humedad sobre el árbol, como una baja insolación, marcos de plantación densos, falta de poda que dificulte la aireación y ubicación en zonas bajas con escaso drenaje.

Las temperaturas entre 8 °C y 24 °C son favorables para el desarrollo del hongo, con un óptimo en torno a los 20 °C, mientras que la humedad relativa óptima es del 100%.

Además del control químico, existen medidas culturales que pueden reducir la incidencia del repilo. Entre ellas, destacan la poda de formación y aireación para favorecer la penetración de la luz y la circulación del aire, la eliminación de restos vegetales infectados para reducir la carga inócula y la elección de marcos de plantación que eviten excesiva densidad de árboles. El uso de variedades menos sensibles y una fertilización equilibrada también pueden contribuir a minimizar el impacto de la enfermedad.

ENLACES DE INTERÉS

- Conozca nuestra [Revista digital RAI](#), trimestral, con artículos muy interesantes sobre las plagas y enfermedades que afectan a los distintos cultivos agrícolas de nuestra comunidad, así como otros aspectos de interés en la sanidad vegetal.
- Consultar [informes fitosanitarios anteriores](#).
- Consultar el [Manual de campo RAI](#) del cultivo del olivar.

- **Real Decreto 1054/2022**, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. **El presente R.D. tiene como objeto:** establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (SIEX) conforme al artículo 5 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) y el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE), así como **facilitar un seguimiento de las prácticas de agricultores y ganaderos.** ([Ampliar información](#)).
- Las personas que desarrollan actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios precisan de una formación, que asegure los máximos niveles de protección del medio ambiente, la seguridad de las producciones y la salud del agricultor. El [Real Decreto 1311/2012 \(texto consolidado\) por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios](#) determina los requisitos de formación que deben poseer los usuarios profesionales a nivel nacional. En Andalucía este Real Decreto ha sido desarrollado por el **Decreto 96/2016**, de 3 de mayo, que regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Con la intención de mejorar la gestión del proceso de obtención de dicha tarjeta identificativa, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha desarrollado una aplicación que incluye la tramitación electrónica por parte de las personas interesadas. ([Ampliar información](#))
- Para consultar información sobre la [Producción Integrada en Andalucía](#) y acceder al [programa de gestión TRIANA](#) acceda a través de este apartado.
- Para obtener información, en el marco de la producción integrada, sobre aquellas **prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas**, así como de la estrategia de control a seguir, consulte **Reglamento Específico de Producción Integrada de olivar.** (Descargar [aquí](#)).
- Acceda al [VISOR RAIF](#) si desea consultar la situación fitosanitaria por Provincia y/o Zona Biológica.
- Consultar la relación de materias activas de [Insecticidas, Fungicidas y Acaricidas](#) autorizadas en Producción Integrada de olivar. La [Orden de 04 de abril de 2023](#) modifica los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Andalucía para **autorizar el uso de todas las sustancias inscritas en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA con las restricciones que se detallan en su ANEXO.**
- .
- Consultar en el [Registro de Productos Fitosanitarios](#) del MAPA las materias activas autorizadas en el cultivo de olivar.
- Aquí puede consultar todo lo relativo a la [Gestión Integrada de Plagas](#) y las [Guías de Cultivos disponibles](#).



VID
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Boletín Fitosanitario
Del 30 de junio al 4 de julio
de 2025



A finales del 2013, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de **Italia**, informó sobre la aparición de un foco de la bacteria *Xylella fastidiosa* en olivares del sur de este país. Esta bacteria tiene un amplio rango de hospedadores, entre ellas cultivos como la vid, incluida en la lista de vegetales sensibles. **En la actualidad**, la bacteria se ha detectado también en **Italia** (Toscana), en **Francia** (isla de Córcega y región PACA), en **Portugal** (17 zonas demarcadas activas) y en **España** en las comunidades autónomas de Islas Baleares y Comunidad Valenciana (Alicante).

[Toda la información sobre *X. fastidiosa*.](#)

Agentes más destacados:

Mildiu y Mosquito verde


ASPECTOS GENERALES

Se generaliza como **estado fenológico dominante "L" (cerramiento de racimo)**, en el **100% de las zonas biológicas**.

Esta semana (del 26 de junio al 2 de julio), las **temperaturas** máximas han estado en los 39 °C, y las mínimas en torno a 21-22 °C. La temperatura media ha estado en torno a los 30 °C.

La **previsión meteorológica** para la próxima semana nos indica temperaturas máximas comprendidas entre 37°C y 43°C y las mínimas comprendidas entre 22°C y 24°C, no se esperan precipitaciones. Los vientos van a ser flojos y de componente variable, predominando los vientos con dirección oeste - suroeste.

Antes de realizar cualquier control fitosanitario debemos de consultar al asesor fitosanitario de nuestra asociación o cooperativa para asegurar el éxito de nuestra intervención, además al realizar cualquier tipo de tratamiento químico debemos atender a las indicaciones del técnico asesor, así como la información reflejada en la etiqueta de los productos fitosanitarios a utilizar, respetando los plazos de seguridad que marcan los fabricantes de estos productos.



Estado fenológico "L"
(Cerramiento de racimo)

ESFINGE RAYADA (*Hyles livornica*)



Desciende la población del esfingido, por lo que puede que estén siendo devoradas por alguno de sus depredadores, o continúen crisalidando.

El adulto de este lepidóptero tiene una envergadura alar de 6 a 8,5 cm. Los machos son ligeramente más pequeños que las hembras. Las alas delanteras y el cuerpo son castaño oliváceos o beige, con bandas blancas. Las alas posteriores son rosadas con bordes blanco y negros. La cabeza y el tórax son castaño oliva con bandas blancas. El abdomen castaño oliva con segmentos blanco y negros. Los primeros dos segmentos tienen manchas laterales grandes blanco y negros. Las antenas son castaño oscuro oliváceo con el extremo blanco.

Las orugas son una explosión de colores: un punteado de verde-amarillo sobre fondo negro, una línea dorsal naranja bordeada a cada lado por parejas de círculos claros rodeados de negro, la cabeza de color carne y el cuerno caudal naranja oscuro con la punta negra. Sin embargo, estos colores varían notablemente según los estadios de desarrollo larvario.

Los huevos son esféricos de 1 mm de diámetro, del mismo color verde que la hoja o el tallo de la planta sobre el que la hembra los deposita.

Las orugas son polípagas. Entre las plantas de las que se alimentan destacan la vid (*Vitis vinifera*). Los adultos liban el néctar de flores de corola tubular. La esfinge rayada se distribuye por el norte de África y el sur de Europa. En Europa llegan individuos migratorios procedentes de África que se suman a la población residente. En la península Ibérica, la esfinge rayada realiza 2 generaciones por año, con los ejemplares adultos de la 1ª generación entre los meses de abril y junio y los de 2ª generación entre agosto y septiembre.

ARAÑA AMARILLA (*Tetranychus urticae*)



Continúa sin detectarse la presencia de este agente, así como la no existencia de daños en ninguna de las parcelas muestreadas (sobre un total de 11 estaciones de control).



Hoja con síntomas

Los adultos de araña amarilla miden unos 0,5 mm. Los machos son de forma aplanada con largas patas, mientras que las hembras son más esféricas. La coloración es variable: rojo anaranjado (hembra) o amarillento (macho) dependiendo del sexo, ambos con los ojos rojos. Presentan 2 manchas dorsales laterales oscuras en el interior del cuerpo, que se observan mejor en los individuos de color claro. En sus estados inmaduros presentan la misma forma, aunque inicialmente con 3 pares de patas en lugar de 4, y su cuerpo es de una coloración más pálida. Los huevos son de unos 0,1 mm, esféricos, lisos, transparentes, volviéndose de color naranja conforme evoluciona.

Comienzan a aumentar sus poblaciones en primavera. En verano completa una generación en poco más de una semana, necesitando más tiempo cuando las temperaturas son más bajas. Pueden estar sucediéndose las generaciones ininterrumpidamente durante todo el año en zonas donde el invierno es suave (aunque de una forma más lenta), o bien, invernar como adulto hasta la próxima primavera en las regiones más frías.

CARACOLES (*Teba pisana*)



Las observaciones de esta semana nos indican la presencia de daños por caracoles en el 27,3% de las parcelas muestreadas en la provincia (sobre un total de 11 estaciones de control), aumentando la media provincial a 1,1% de racimos con daños (0,7% la semana anterior); manteniéndose La zona biológica de las Arenas como las más afectada con el 2,7% de racimos dañados.

Los caracoles, son moluscos de la clase gasterópodos, de cuerpo blando y pegajoso. Son hermafroditas y ovíparos. Durante el proceso de reproducción, que suele darse en primavera y otoño, ambos individuos participantes se inseminan mutuamente y depositan cada uno aproximadamente entre 50 y 150 huevos; los huevos son generalmente de forma esférica, de color blancuzco o transparentes, se suelen depositar en un nido realizado en el suelo. Los huevos eclosionan aproximadamente a las 2-3 semanas y los ejemplares jóvenes alcanzan la madurez sexual a los pocos meses.



Los daños se producen durante la brotación. Normalmente mordisquean hojas, brotes, e incluso racimos, a los que también ensucian con sus secreciones. Los ataques más significativos se producen al inicio de la brotación, pero si ésta es rápida, los daños ocasionados no son importantes. Como medidas de prevención y/o culturales se aconseja mantener la parcela limpia de malas hierbas; eliminar las malas hierbas antes del inicio de la brotación de la viña, no sólo de la parcela sino también de márgenes, bandas o zonas próximas; así como, aplicar cebos sobre el suelo en las zonas más frecuentadas por los caracoles.

ACARIOSIS (*Calepitrimerus vitis*)



Se mantienen los mismos valores de la semana pasada en cuanto a la media provincial con un 55% de estaciones afectadas, y una media de racimos afectados del 2,2%. Sigue siendo la zona biológica de Los Llanos la más afectada por la presencia de acariosis con un 2,70% de cepas con presencia.

Se recomienda vigilar aquellos viñedos con antecedentes de daños importantes, principalmente en los momentos de brotación a floración. En cuanto a la sintomatología recordar que a simple vista se observan numerosos puntos blancos ocasionados por las picaduras de estos **eriófidos** visibles por transparencia. Destacar que las variedades de hoja lampiña son menos preferidas por este ácaro, que las de abundante pilosidad, como el **Tempranillo**.



Acariosis

ERINOSIS (*Eriophyes vitis*)



Erinosis (raza de las agallas)

No se detecta la presencia de daños por este agente en las 11 estaciones de control muestreadas. Los síntomas que suelen observarse generalmente corresponden a la **raza de las agallas**, que no suele dar problemas en plantaciones adultas.

Este ácaro produce abultamientos en la cara superior de las hojas; en la cara inferior se manifiesta por la presencia de un polvillo blanco que se vuelve oscuro y es el que abriga las larvas. En aquellos viñedos con presencia de síntomas eliminar los restos de poda.

MOSQUITO VERDE (*Jacobiasca lybica* y *Empoasca spp.*)



Aumenta la presencia de adultos de mosquito en hoja. El porcentaje de parcelas afectadas sube al 82% de las 11 estaciones muestreadas (la semana anterior fue el 45,5%). La media provincial aumenta a 0,06 insectos por hoja (0,01 en el muestreo anterior), el porcentaje de hojas con presencia de mosquito aumenta al 4,2% (0,8% la semana pasada). Continúa siendo Las Arenas la zona biológica más afectada con 0,12 mosquitos por hoja y un 6,7% de hojas con presencia de mosquito.

El **adulto** es de forma alargada de 2 a 3 mm de longitud y de color verde claro. Sus alas posteriores son translúcidas y las anteriores con coloraciones variables, generalmente verde amarillentas y más largas que el cuerpo. Los **huevos** son blancos y alargados y los depositan en el interior de los tejidos de las venas de las hojas y peciolo, por lo que no se ven.



Mosquito verde

Tiene varios estadios larvales. Las **larvas** son semejantes al adulto, de color blanco y tegumentos blandos en su primer estadio, evolucionando rápidamente a una tonalidad amarilla o amarilla-verdosa en los estadios siguientes, conservando siempre su forma alargada. Con el primer estadio ninfal el color se hace más intenso y se hacen notar las alas. En el segundo estadio ninfal llega a alcanzar el tamaño del adulto.

Invernan como adultos en otras plantas cultivadas y espontáneas sobre todo en sitios abrigados. En primavera emigran a las cepas donde se alimentan. Tienen entre 4 o 5 generaciones al año con una duración media de 40 días, siendo la más importante la que corresponden a los meses de verano.



Daños por mosquito verde

Los síntomas se aprecian principalmente en los bordes de las hojas con decoloraciones verde pálidas o amarillas en las variedades blancas y rojizas en las tintas, avanzan hacia el centro del limbo causando desecación y caída de hojas. Si el ataque es en las primeras fases de desarrollo afecta a las hojas terminales con decoloraciones, desecaciones marginales, crispación del borde y abarquillamiento. Sobre los brotes aparecen brotaciones anticipadas y entrenudos cortos. Si el ataque es importante pueden provocar defoliación prematura dificultando el normal agostamiento de los sarmientos y la maduración del racimo. En el siguiente ciclo vegetativo después de un daño grave se hace perceptible una disminución del vigor en la brotación y merma de cosecha.

Al tratarse de un insecto sensible a la radiación solar, con preferencia a altas temperaturas, humedad y zonas de poca aireación se aconseja evitar un exceso de vigor en las plantaciones.

POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*)



No se obtienen capturas en polilleros en las 11 parcelas muestreadas (al igual que la semana anterior); tampoco se detecta la presencia de puestas y/o larvas en racimos.

Teniendo en cuenta las actuales temperaturas, así como el estado fenológico del cultivo, se aconseja vigilar la evolución de esta plaga. Cuando la polilla se asocia a la vid, la primera generación (marzo-abril) daña las inflorescencias, la segunda (junio) las bayas verdes y la tercera (julio-agosto) las bayas en envero y maduración.

Inverna como crisálida, con la diapausa inducida, desde septiembre-octubre hasta la primavera siguiente. Se ubica preferentemente bajo la corteza de las cepas, y en las grietas de los rodrigones cuando la vid se conduce en espaldera, en el interior de un capullo de textura más recia y consistente que cuando la crisálida es no diapausante. Las larvas de la 1ª generación destruyen botones florales, flores e incluso frutos recién cuajados que se reúnen en (glomérulos) o nidos en donde viven. Las larvas de las siguientes generaciones producen pérdida de cosecha y calidad, sobre todo en las variedades de uvas de mesa, debido a que se alimentan de las bayas y penetran en ellas. En la 2ª y 3ª generación las larvas realizan galerías en las bayas, siendo estas vía de entrada de infecciones de podredumbres, y su desarrollo dependerá de las condiciones climatológicas.



Adulto de Polilla

PIRAL (*Sparganothis pilleriana*)



Larva de Piral

Al igual que la semana anterior, continúa sin observarse daños provocados por este agente en el total de las 11 parcelas observadas.

La larva de este Lepidóptero, una vez finalizada su etapa invernal en forma de larva, suele ocasionar lesiones a la parte terminal de las yemas recién brotadas.

Generalmente se suelen detectar más daño en cepas viejas y rugosas porque en ellas encuentra mejores refugios debajo de las cortezas. Como medida cultural se puede eliminar la vegetación espontánea en el cultivo que puede ser hospedante de la plaga.

MILDIU (*Plasmopara viticola*)



Los datos obtenidos esta semana se mantienen igual que la semana anterior, detectándose la presencia de este hongo en el 100% de las parcelas muestreadas (sobre 11 estaciones de control), tanto en hojas como en racimos.

Baja ligeramente la media provincial de hojas con síntomas a 18,1 %, (la pasada semana fue 19,3%). Manteniéndose las zonas biológicas de la Sierra con un 24% y Las Arenas con un 20% como las zonas biológicas más afectadas.

Desciende la media provincial de racimos con síntomas al 17,1 %, (18,2% la semana anterior) Continuando la zona biológica más afectada Las Arenas, con un 20 % de racimos con síntomas.

Se aconseja estar atentos a las previsiones meteorológicas, con objeto de tomar las medidas oportunas de protección fitosanitaria en caso de ser necesario. Las altas temperaturas de estos días, y las previstas para la semana que viene van a seguir frenado el avance de esta enfermedad; no obstante, se recomienda el monitoreo semanal de nuestros viñedos, siendo este fundamental y necesario para determinar la evolución de la enfermedad.



Mildiu en hoja

Este hongo sobrevive principalmente como oosporas invernantes en restos de cosecha (hojas y sarmientos), aunque también puede sobrevivir como micelio en las yemas y en hojas persistentes.



Mildiu en racimo

Cabe recordar que la temperatura a partir de la cual se desarrolla esta enfermedad debe ser superior a 10° C, y que las **contaminaciones primarias** se producen con lluvias de al menos 10 mm, y siempre en brotes de más de 10 cm de longitud. Para que se produzcan las contaminaciones posteriores (**contaminaciones secundarias**) basta solo con la presencia de agua libre (rocío, niebla, condensación, etc) en las hojas. Los primeros síntomas en las hojas se manifiestan por las típicas "manchas de aceite" en el haz, que se corresponde en el envés con una pelusilla blanquecina, si el tiempo es húmedo.

Al final de la vegetación estas manchas adquieren la forma de mosaico. Si los ataques son fuertes producen una desecación parcial o total de las hojas e incluso una defoliación prematura, que repercute en la cantidad y calidad de la cosecha, así como en el buen agostamiento de los sarmientos. En los racimos, los síntomas en las proximidades de la floración se manifiestan por curvaturas y oscurecimientos del raquis o raspajo y su posterior recubrimiento de una pelusilla blanquecina si el tiempo es húmedo, ocurriendo lo mismo en flores y granos recién cuajados.

OÍDIO (*Uncinula necator*)



Continua la estabilidad en los datos recogidos en las observaciones de esta semana, coincidiendo plenamente con los de la semana anterior. La presencia de daños ocasionados por este hongo aparece en el 36% de las parcelas muestreadas, de un total de 11, con una media provincial del **1,5 % de hojas con síntomas**. La zona biológica Las Arenas sigue siendo la más afectada, con un 4 % de hojas con síntomas de oídio. Por el momento, no se han observado racimos dañados por este hongo.

Este hongo infecta todos los órganos verdes con un polvillo característico; atacando células epidérmicas del haz o del envés de hojas de cualquier edad abarquillando las más jóvenes. En los sarmientos produce manchas marrones-negras. Los peciolos y pedicelos del racimo se vuelven quebradizos. Puede provocar un agrietamiento en las bayas.



Oídio en hoja

La temperatura, la humedad y, en menor medida la insolación, son los factores climáticos que condicionan el desarrollo del hongo. Alrededor de 15°C la temperatura comienza a ser favorable estando su óptimo en los 25-28°C. El desarrollo de la enfermedad se ve favorecido por humedades altas, pero las lluvias abundantes frenan su desarrollo. El oídio puede atacar todos los órganos verdes de la vid. En hojas, los síntomas pueden aparecer tanto en el haz como en el envés; en ambos casos suele observarse un polvillo blanco ceniciento, que puede limitarse a algunas zonas o bien ocupar toda la superficie de la hoja.

A veces los comienzos del ataque suelen manifestarse con manchas aceitosas con punteaduras pardas. En los casos de ataque intenso de las hojas aparecen abarquilladas y recubiertas de polvillo por el haz y el envés. En brotes y sarmientos, los síntomas se manifiestan por manchas difusas de color verde oscuro, que van creciendo, definiéndose y pasando a tonos achocolatados al avanzar la vegetación, y a negruzcos al endurecerse el brote. En racimos, al principio los granitos aparecen con un cierto tinte plomizo, recubriéndose en poco tiempo de polvillo ceniciento, que si se limpia deja ver puntitos pardos sobre el hollejo.

ENLACES DE INTERÉS



- Conozca nuestra [Revista digital RAIF](#), trimestral, con artículos muy interesantes sobre las plagas y enfermedades que afectan a los distintos cultivos agrícolas de nuestra comunidad, así como otros aspectos de interés en la sanidad vegetal.
- Consultar [informes fitosanitarios anteriores](#).
- Consultar el [Manual de campo RAIF](#) del cultivo de vid.
- **Real Decreto 1054/2022**, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. **El presente R.D. tiene como objeto:** establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (**SIEX**) conforme al artículo 5 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (**REA**) y el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (**CUE**), así como **facilitar un seguimiento de las prácticas de agricultores y ganaderos**. ([Ampliar información](#)).
- Las personas que desarrollan actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios precisan de una formación, que asegure los máximos niveles de protección del medio ambiente, la seguridad de las producciones y la salud del agricultor. El **Real Decreto 1311/2012 (texto consolidado)** por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios determina los requisitos de formación que deben poseer los usuarios profesionales a nivel nacional. En Andalucía este Real Decreto ha sido desarrollado por el **Decreto**

96/2016, de 3 de mayo, que regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Con la intención de mejorar la gestión del proceso de obtención de dicha tarjeta identificativa, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha desarrollado una aplicación que incluye la tramitación electrónica por parte de las personas interesadas. ([Ampliar información](#))

- Para consultar información sobre la [Producción Integrada en Andalucía](#) y acceder al [programa de gestión TRIANA](#) acceda a través de este apartado.
- Para obtener información, en el marco de la producción integrada, sobre aquellas **prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas**, así como de la estrategia de control a seguir, consulte **Reglamento Específico de Producción Integrada de vid**. (Descargar [aquí](#)).
- Acceda al [VISOR RAIF](#) si desea consultar la situación fitosanitaria por Provincia y/o Zona Biológica.
- Consultar la relación de materias activas de [Insecticidas, Fungicidas y Acaricidas](#) autorizadas en Producción Integrada de vid. La [Orden de 04 de abril de 2023](#) modifica los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Andalucía para **autorizar el uso de todas las sustancias inscritas en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA con las restricciones que se detallan en su ANEXO**.
- Consultar en el [Registro de Productos Fitosanitarios](#) del MAPA las materias activas autorizadas en el cultivo de vid.
- Aquí puede consultar todo lo relativo a la [Gestión Integrada de Plagas](#) y las [Guías de Cultivos disponibles](#).