

Aguililla calzada

NA

Hieraetus pennatus (Gmelin, 1788)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundante



Abundante



Escaso

TAMAÑO



45-53 cm.



100-121 cm



510-1250 g.

Identificación:

Especie con dos fases claramente diferenciadas, una clara con las infracoberteras alares y el cuerpo blanco y las plumas de vuelo oscuras y otra fase oscura, de color oscuro uniforme por debajo. Por encima es marrón grisáceo uniforme con las alas algo más oscuras y la cola algo más pálida. La hembra es de mayor tamaño que el macho.

Especies parecidas:

La fase oscura puede ser confundida con el Milano negro, si bien la cola no ahorquillada y más rectangular puede facilitar la identificación.

Suele cazar aves, aunque también atrapa otros vertebrados. En el parque se alimenta mayormente de Tórtolas turcas y de alguna Perdiz común. Nidifica en árboles a gran altura.

Hábitat:

Zonas arboladas con algunos claros donde poder cazar. Suele ser menos frecuente donde escasea la cobertura arbórea.

Distribución:

Especie de distribución paleártica meridional y surafricana.

El parque es el área de campeo de algunos individuos, en donde encuentran gran cantidad de presas.

Comportamiento:

De vuelo más grácil que el Ratonero común.

Fenología:

Estival. Las pocas aves observadas se ven desde marzo hasta septiembre. Sólo se han observado sobrevolando el parque y cazando en él, no habiendo encontrado ninguna evidencia de nidificación. Esporádicamente se ven algunos individuos invernantes cazando en el parque.

