

Ánade azulón

NA

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundante



Abundante



Raro



75-90 cm.



147-180 cm



750-1450 g.

TAMAÑO

Identificación:

De esta especie han surgido la mayor parte de los patos domésticos. Espejuelo alar de color verdoso con bordes blancos. Existe un claro dimorfismo sexual. Machos con la cabeza verde y el pico amarillo, mientras que las hembras tienen la cabeza grisácea y el pico de color más apagado. Cuerpo y alas de color parduzco, el macho tiene el obispillo y el cuello de color verdoso. Los jóvenes son similares a las hembras.

Especies parecidas:

Ninguna. Las hembras son similares a las de otras especies de patos, si bien ninguna de estas especies se ha observado en el parque.

Hábitat:

Se observa en cualquier zona con agua, incluso se puede ver en pequeños riachuelos o incluso en la costa.

Comportamiento:

Especie de muy fácil observación en nuestra provincia. Nidifica entre la vegetación cerca del agua, aunque también cría en dehesas o campos de cereal siempre que exista algún riachuelo en la zona. Durante la época de nidificación varias hembras pueden poner los huevos en un mismo nido, pudiendo

encontrar nidos con más de una veintena de huevos.

Distribución:

Las aves de la zona pertenecen a la subespecie nominal, con una distribución paleártica y norteamericana. En el parque se ven en ambos lagos, sobre todo en el de mayor tamaño.

Fenología:

Sedentario. Durante el inicio del periodo de nidificación algunas parejas llegan al parque para criar, aunque debido a la competencia con los patos domésticos, más grandes y con menos miedo hacia las personas, pocas de ellas llegan a hacerlo. Los pocos nidos de esta especie que se han encontrado son bastante sensibles a la depredación por parte de perros.

