

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

Pequeño halcón, con alas puntiagudas y cola alargada. Marcado dimorfismo sexual. Machos con cabeza, obispillo y cola grisáceos. Partes superiores marrón rojizas moteadas en oscuro, partes inferiores amarillentas. Hembra de color general pardo rojizo más profusamente moteada que los machos. Uñas negras. Jóvenes similares a las hembras. Hembra de mayor tamaño que el macho.

Especies parecidas:

Cernícalo primilla (ver esta especie).

Hábitat:

Áreas de cultivo, zonas de matorral. Algunos individuos usan las ciudades como zonas de caza.

Comportamiento:







Suele observarse acechando sus presas, insectos y pequeños vertebrados, posado en los postes de los tendidos eléctricos o bien cerniéndose frecuentemente entre planeo y planeo antes de arrojarse sobre sus presas. Nidifica en nidos de otras aves así como en cortados rocosos e incluso en edificios monumentos de nuestras ciudades.

Distribución:

Los individuos de esta especie que nos visitan pertenecen a la subespecie nominal de distribución paleártica occidental. En el parque se observa posado en el tendido eléctrico que lo cruza y cazando en el límite del naranjal con la ribera del río.

Fenología:

Sedentario. Una pareja lleva nidificando de forma regular en el vecino parque de San Jerónimo, utilizando el nuestro como una de las principales zonas de campeo. Durante el invierno el número de efectivos de esta especie aumenta con las aves procedentes del norte.

	Abundante	ESTATUS
	Abundante	
	Escaso	
	32-35 cm.	TAMANO
	71-80 cm.	
	125- 300 g.	

