

Codorniz común

NA

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundante



Abundante



Accidental

TAMAÑO



16-18 cm.



32-35 cm.



70-155 g.

Identificación:

De menor tamaño que una paloma doméstica y formas redondeadas. Se desplazan rápidamente por el suelo. Partes superiores de color marronáceo con listas tanto de color marrón oscuro como marrón claro. Pecho marronáceo. Partes inferiores grisáceas. Cabeza de color blanco con líneas negras en los machos y marrones en las hembras que forman una especie de antifaz.

Especies parecidas:

Perdiz común (ver esta especie).

Hábitat:

Cultivos de cereales, prados y pastizales, durante la migración se puede escuchar en casi todas las zonas abiertas.

Comportamiento:

No suele levantar el vuelo a no ser que sea acosada, prefiere huir a peón siempre que pueda. Es más fácil escuchar su canto que verla. Cuando vuela lo hace siempre a baja altura, al ras de la vegetación, con rápidos aleteos. Nidifica en el suelo allí donde la altura de

la vegetación les permite pasar desapercibidas.

Distribución:

En nuestra zona se observa la especie nominal, de distribución paleártica, llegando hasta Mongolia. En el parque se ve en los claros existentes dentro de los naranjales que bordean el río.

Fenología:

Estival. Es más frecuente observarla durante los pasos migratorios, durante los cuales se puede observar en la zona de naranjal que circunda el parque. Como nidificante sólo se ha observado una vez, cinco pollos acompañados por adultos fueron vistos comiendo en los claros existentes en el naranjal a finales de mayo.

