

# Curruca cabecinegra

*Sylvia melanocephala* (Gmelin, 1789)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

## Identificación:

El macho tiene la cabeza negra hasta por debajo del ojo. Garganta blanca, dorso, espalda y vientre gris, anillo ocular rojo intenso, sobre todo en verano, cola larga y negra con las punta de las plumas blancas. Pico negro y delgado. La hembra y los jóvenes tienen un diseño similar pero con tonos más claro y sin negro en la cabeza.

## Especies parecidas:

Quizás se pueda confundir con el macho de la Curruca capirotada.

## Hábitat:

Típica de matorral mediterráneo, encinares, alcornoques, pinares, etc. Además es muy común en zarzas, carrascas, lentiscos, huertos, jardines y parques, bosques de rivera, olivos e incluso en el medio suburbano.

## Comportamiento:

Tiene vuelos cortos, moviéndose sin cesar entre los matorrales con la cola abierta y escondiéndose rápidamente al menor peligro. El macho suele cantar desde un posadero en alto o en el interior de una

## Distribución:

Circunmediterránea, ocupa todas las penínsulas e islas del mediterráneo y norte de África. En España se distribuye principalmente por las zonas del levante y sur, desde Gerona hasta Huelva, también las zonas de Extremadura, las dos Castillas y Galicia, en el resto las poblaciones son muy aisladas. Evita los sistemas montañosos. En el parque, es más frecuente las zonas donde abunda el lentisco.

## Fenología:

Sedentaria en casi toda su área de distribución, aunque tiene algunos desplazamientos de trashumancia invernal. La mayor parte de las

ESTATUS		Abundante
		Abundante
		Escaso
TAMANO		13.5 cm.
		15-18 cm.
		9-15 g.



mata.

Se alimenta de insectos y pequeños invertebrados, en invierno come también algunos frutos y bayas.

aves del parque son invernantes, sin que hasta ahora se haya detectado la cría de la especie en el mismo.