

Focha común

NA

Fulica atra (Linnaeus, 1758)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundante



Abundante



Escaso

TAMAÑO



32-35 cm.



90-100 cm.



575-1100 g.

Identificación:

Ave acuática de formas redondeadas y color negro. Escudete frontal y pico de color blanco. En vuelo tiene un estrecho borde blanco en las secundarias. Patas con los dedos lobulados. Macho ligeramente mayor que la hembra. Joven de coloración general gris pardusca.

Especies parecidas:

El joven se diferencia del de la Polla de agua por no tener las infracoberteras caudales blancas.

Hábitat:

Láminas de agua, aunque también se las puede observar alimentándose en los prados inundados de las orillas.

Comportamiento:

Bucea frecuentemente en busca de alimento. En invierno se agrupa, pudiendo llegar a contarse miles de individuos de esta especie. Si es molestada suele huir buceando. Construye el nido en carrizales inundados

Distribución:

Los individuos presentes en la zona pertenecen a la subespecie nominal de distribución paleártica.

En el parque se observa en ambos lagos y en el río.

Macho ligeramente mayor que la hembra.

Fenología:

Sedentario. Dos o tres parejas de fochas permanecen en los lagos del parque durante todo el año. La nidificación en el parque ha sido comprobada, si bien no de forma regular todos los años debido a la enorme presión que al igual que para el resto de las acuáticas ejercen los patos domésticos que existen en el parque.

