

Gaviota reidora

Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

La Gaviota más pequeña que se puede observar en el parque. Pico y patas rojizas. Cabeza blanca con auriculares oscuras, algunas aves se pueden ver en el parque con la cabeza casi totalmente marrón oscuro. Cola blanca. Partes inferiores blancas y las superiores color gris ceniza. Sexos similares. Jóvenes con partes superiores y pileo gris parduzco.

Especies parecidas:

Gaviota sombría, de mucho mayor tamaño y partes superiores más oscuras.

Hábitat:

La gaviota que se observa más fácilmente en el interior en basureros, embalses y zonas húmedas en general.

Comportamiento:






La población de esta especie ha aumentado espectacularmente en los últimos años debido al uso que hace de los vertederos, donde encuentra alimento fácil. Nidifica en colonias, haciendo el nido en el suelo, a veces lo hace en tejados, acantilados, etc..

Distribución:

Especie monotípica de distribución paleártica. En el parque se ven en el mayor de los lagos.

Fenología:

Invernante. De noviembre a enero se pueden ver sobrevolando el parque con bastante frecuencia, algunos de estos individuos bajan al mayor de los lagos donde nadan y se alimentan cuando la presión humana no es excesiva.

 Escaso	ESTATUS
 Abundante	
 Escaso	
 34-37 cm.	TAMANO
 100-110 cm.	
 170-340 g.	

