

Gorrion molinero

NA

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundante



Abundante



Abundante

TAMANO



14-16 cm.



20-23 cm.



22-35 g.

Identificación:

Como un Gorrion común, pero mucho mas pequeño, dorso marrón listado de negro, banda alar blanca muy visible, pileo completamente pardorrojizo, pequeño babero negro, manchas negras en las mejillas, collar blanco estrecho sin extenderse por la nuca. Sexos y jóvenes muy semejntes.

Especies parecidas:

De lejos puede parecer un Gorrion común o Moruno, pero estos son mas grandes.

Hábitat:

Menos dependiente del hombre que el Gorrion común. Habita en sotos, márgenes de bosques, jardines, huertos, etc., no se suele encontrar dentro de ciudades o pueblos.

Comportamiento:

Menos sociable que el Gorrion común, cría en agujeros de paredes, árboles, etc., quizás sea el ave que mejor acepta para nidificar las cajas

nido. Tiene la tendencia a criar en pequeñas colonias. Incuban los dos sexos durante unos 12 días, pueden tener hasta tres puestas al año.

Distribución:

Paleártico, Nidifica en casi toda Europa, desde el mediterráneo hasta el sur de Noruega y Suecia. Falta en Finlandia. Se localiza en las zonas ajardinadas del parque, siempre que haya árboles.

Fenología:

Sedentario. Nidifica en huecos de árboles y ocupan regularmente las cajas nido. Se le ve todo el año, aunque durante la época de reproducción es más fácil su observación ya que ocupa la práctica totalidad de los agujeros existentes en el interior del parque.

