

Herrerillo común

NA

Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundante

Abundante

Escaso

TAMAÑO



11,5 cm.

17,5-20 cm.

9-12 g.

Identificación:

Sexos similares. Celeste vivo en cabeza, alas y cola, pecho y vientre amarillos, cara blanca enmarcada por un collar negro azulado y una lista negra que le cruza los ojos y se une con el azul de la nuca. Pico negro, pequeño y puntiagudo, patas azuladas y fuertes. Los jóvenes se parecen mucho a los adultos pero sin mancha blanca en las cara y con tonos más apagados.

Especies parecidas:

Carbonero común, aunque este es mucho más grande.

Hábitat:

Bosques caducifolios o mixtos, parques, jardines, etc., menos común en pinares, donde es sustituida por otra especie de párido.

Comportamiento:

Muy acrobático como todos los páridos, utiliza sus patas para colgarse de las ramas mientras caza insectos o come frutas y t a m -

bién para llevarse las presas al pico Acude muy confiado a comederos artificiales instalados en jardines y utiliza muy bien las cajas-nido.

Distribución:

Se circunscribe al Paleártico occidental, desde la península ibérica hasta los Urales. En la Península crían dos subespecies, *caeruleus* y *ogliastrae*. En el parque se distribuye sobre todo en la zona del río.

Fenología:

Sedentario. Si bien es más escaso que el Carbonero común, esta especie ha aumentando ligeramente sus efectivos en el parque debido a la colocación de cajas nido.

