

Mirlo común

Turdus merula (Linnaeus, 1758)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

Inconfundible. Macho totalmente negro, excepto pico y anillo ocular amarillo. Cola bastante larga. Las hembras son menos negras, con un plumaje más marronáceo y listado al igual que los jóvenes.

Especies parecidas:

El Estornino negro, aunque éste es más pequeño y tiene la cola corta.

Hábitat:

Terrenos más o menos arbolados, incluidos los urbanos, dehesas, huertos de frutales, parques y jardines.

Comportamiento:

Se alimenta con frecuencia en el suelo, donde, a saltos, busca insectos, lombrices, gusanos y frutos. También come fruta de los árboles, Moreras, Higueras, Cerezos, etc., por lo que ha

sido y aún en ciertos lugares es perseguido por los agricultores.

Distribución:

Vive en toda Europa, excepto en Islandia y en el norte de Escandinavia, sólo las poblaciones más norteñas son migradoras. En el parte se le puede ver por todo el recinto, zonas de césped, pinares, acebuchales, naranjales, etc.

Fenología:

Sedentario. Entre los meses de Octubre a Enero se produce un aumento considerable de efectivos, llegando aves en migración o invernantes más norteñas.

	Abundante	ESTATUS
	Abundante	
	Abundante	
	24-25 cm.	TAMANO
	34-38.5 cm.	
	70-150 g.	

