

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

NA

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Identificación:

Sexos similares. Macho blanco y negro muy contrastado. Partes superiores negro uniforme y blanco en las inferiores. Todos con mancha alar blanca muy llamativa, aunque los machos la mancha es mucho mayor. Pico corto y negro. En las hembras el color negro es sustituido por un gris pardo al igual que los jóvenes y también algunos machos.

Especies parecidas:

Ninguna.

Hábitat:

Bosques maduros para poder criar en huecos, dehesas de encinares, acebuchales viejos, ocasionalmente en pinares con nidos artificiales.

Comportamiento:

Tiene la costumbre de cazar insectos al vuelo, de la misma forma que el Papamosca gris, pero sin volver al mismo posadero y con paradas mas frecuentes en el suelo. Cría en agujeros de árboles, a veces en nidos abandonados de los Picos carpinteros. También utiliza muy a menudo las cajas nidos.

Distribución:

Del Paleártico occidental, las poblaciones ibéricas tienen una subespecie *F.h.iberiae* (Wtherby, 1928). En el parque sobre todo es visible en zonas arboladas con claros.

Fenología:

Especie estival en la Península Ibérica. En el parque sólo se ha observado en los pasos migratorios, tanto el prenupcial como el nupcial. No cría en el parque.

 Abundante	ESTATUS
 Abundante	
 Abundante	
 13 cm.	TAMANO
 21.5-24 cm.	
 11-18 g.	

