

# Pinzón vulgar

*Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

## Identificación:

El macho en plumaje nupcial, tiene partes inferiores pardo rojizo, espalda marrón y obispillo verde. Cogote y nuca gris azulado. Alas negras con una banda blanca, que les hace muy característicos. La hembra es mucho más apagada, con tonos más verdosos y blanquecinos en las partes inferiores, jóvenes igual que las hembras.

## Especies parecidas:

Se le puede confundir con el Pinzón real.

## Hábitat:

Setos y zonas arboladas. Después de la cría se agrupa en bandos ocupando cultivos baldíos, sotos fluviales, pastizales, jardines, etc.

## Comportamiento:

Tienen la costumbre en época de migración de separarse los sexos, e incluso jóvenes de adultos, de esta manera de comportarse le viene el nombre científico que le dio Linneo, "*coelebs*" que significa célibe o soltero.

## Distribución:

Palaearctica. Vive por toda Europa, Oriente Medio, Macaronesia y norte de África. Es una de las especies de paseriformes más

abundantes. En España y Baleares la subespecie es la *balearica*. En el parque siempre se le observa en zonas arboladas con árboles de mayor porte.

## Fenología:

Invernante en el parque, los individuos en la Península Ibérica son sedentarios, viéndose incrementada las poblaciones con aves de Europa, donde es un migrador parcial.

	Abundante	ESTATUS
	Abundante	
	Escaso	
	14,5 cm.	TAMANO
	24,5-28,5 cm.	
	17-23 grs.	

