

# Reyezuelo listado

*Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

## Identificación:

Sexos similares. Muy pequeño, de colores verdosos por encima y blanquecinos por debajo, tienen unos tonos amarillentos en los lados de la cabeza, franja alar blanca. Lo más característico sea su cabeza con lista ocular negra, ceja blanca muy visible y pileo con listas laterales negras y una central amarillo anaranjado.

## Especies parecidas:

De lejos puede parecer un Mosquitero Común.

## Hábitat:

Zonas densamente arboladas, dehesas de encinas o alcornoques, pinares y otras coníferas, también en bosques de rivera. Poco selectiva aparentemente.

## Comportamiento:

Suele reunirse en pequeños grupos con otras especies de Páridos y con Mosquiteros, moviéndose siempre entre los árboles, captura insectos e invertebrados entre las hojas y ramas en las que se mueve con rápidos y cortos vuelos.







## Distribución:

Especie paleártica, de distribución casi exclusivamente europea, desde el norte de Marruecos hasta Bielorrusia. Ocupa casi toda la Península Ibérica, aunque con carácter discontinuo, y su rango altitudinal va desde el ni-

vel del mar hasta los 2000 metros. Dentro del recinto del parque, se observa en las cercanías del río o el borde de los lagos.

## Fenología:

Invernante. Los escasos individuos que invernán en el parque llegan a él bastante tarde, permaneciendo muy poco tiempo en el mismo.

 Abundante	ESTATUS
 Escaso	
 Accidental	
 9 cm.	TAMANO
 13-16 cm.	
 4,5-6,5 g.	

