

# Ruiseñor bastardo

NA

*Cettia cetti* (Temminck, 1820)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



TAMAÑO



## Identificación:

Sexos iguales. Por arriba muy oscuro, pardo rojizo uniforme. lista superciliar clara, bridas y lista oscura. Tonos grises en auriculares, lados del cuello y pecho. Partes inferiores blanco sucio. Cola muy redondeada, el único passeriforme con diez rectrices, patas de color carne.

## Especies parecidas:

Por su plumaje pueda parecer un Ruiseñor común, pero éste es mas grande y con tonos mas rojizos.

## Hábitat:

Sotos y bosques de rivera. Siempre cerca del agua, mucho más asociado a éste medio que el Ruiseñor Común.

## Comportamiento:

Pocas veces se puede observar a ésta ave, de costumbre sumamente escondediza y muy bien camuflada en el medio. Canta casi todo el año, aunque en la época de

celo, es cuando se oye más al macho con un canto explosivo, muy breve pero potente.. Especie insectívora.

## Distribución:

Mediterránea. Ocupa casi toda Europa Mediterránea, llegando hasta el sur de Inglaterra, Holanda y Bélgica. Se encuentra ampliamente distribuido por toda España. Dentro del recinto del parque, en cualquier zona con buena cobertura arbustiva.

## Fenología:

Mayoritariamente sedentario. Parece que algunos individuos pueden tener desplazamientos cortos sobre todo en primavera y otoño. Aunque no hay noticias de aves procedentes del extranjero.

