

# Verderón común

NA

*Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESTATUS



Abundate



Abundate



Abundate

TAMAÑO



15 cm.



24,5-27,5 cm.



22-31 g.

## Identificación:

Del tamaño de un Gorrión Común, de color verde oliváceo en las partes superiores y verde amarillento en el pecho y vientre, parte del ala y la cola amarillo intenso. La hembra es de tonos más apagados, más grisáceas y con muy poco amarillo. Los jóvenes tienen los flancos listados. Pico robusto.

## Especies parecidas:

Dentro del parque no se le puede confundir con ninguna otra.

## Hábitat:

Preferentemente en medios forestales de llanura, sotos fluviales, huertas, dehesas de encinas o alcornoques, pinares, etc. También en bordes de caminos y campos de labor. En invierno baja a zonas de pastizales y rastrojeras.

## Comportamiento:

Son aves muy sociables, sobre todo fuera de la época de cría, cuando se reúnen en pequeños bandos con otros fringílidos y escribanos.

Nidificante, ambos sexos construyen el nido con hierba, musgo y raicillas. La incubación correa

cargo sólo de la hembra. Se alimentan casi enteramente de semillas, algunos frutos y bayas. Tienen un agradable canto.

## Distribución:

Euroturquestana. Ocupa toda Europa y gran parte del norte de África. Se reparte por todo el recinto del parque, ocupando todas las zonas arboladas.

## Fenología:

Sedentario. Se le puede observar todos los meses del año. Durante la época de reproducción se pueden agrupar miles de aves de esta especie, junto a verdicillos y jilgueros en las zonas con cardos. Durante el invierno la población del parque se desplaza hacia el sur, dos aves anilladas en el parque se han recuperado en la zona del Estrecho de Gibraltar.

