



Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD

Encuesta Andaluza de Salud

La Salud en Andalucía: Adultos

V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016

Febrero 2017

Autores:

José Juan Sánchez-Cruz (Coordinador V EAS 2015-2016)

Llenalia García Fernández

José M^a Mayoral Cortés

TELÉFONO

WEB

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	4
METODOLOGÍA	5
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO	5
TIPO DE MUESTREO Y UNIDADES MUESTRALES	6
ESTRATIFICACIÓN Y AFIJACIÓN MUESTRAL	6
SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES.....	8
ANÁLISIS DE LOS DATOS	9
RESUMEN DE RESULTADOS	11
NIVEL DE SALUD	11
DETERMINANTES DE LA SALUD.....	12
PRÁCTICAS PREVENTIVAS	13
PRÁCTICAS DEL MEDIO AMBIENTE	14
SERVICIOS SANITARIOS	16
BLOQUE I: NIVEL DE SALUD	17
SALUD GENERAL: PERCEPCIÓN DE MALA SALUD	17
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	17
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	17
SALUD GENERAL: PUNTUACIÓN FÍSICA DE LA ESCALA SF-12.....	22
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	22
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	22
SALUD GENERAL: PUNTUACIÓN MENTAL DE LA ESCALA SF-12	27
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	27
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	27
LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS: DOLOR QUE DIFICULTA EL TRABAJO HABITUAL	32
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	32
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	32
LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS: PROBLEMAS DE SALUD FÍSICA O EMOCIONALES QUE DIFICULTAN LAS ACTIVIDADES SOCIALES.	38

Tabla de Contenidos

<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	38
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	38
ENFERMEDADES CRÓNICAS	43
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	43
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	44
LIMITACIONES FÍSICAS, SENSORIALES O PSÍQUICAS	71
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	71
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	71
AUTONOMÍA PERSONAL	84
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	84
<i>Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	84
ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES	92
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	92
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	92
BLOQUE II: DETERMINANTES DE LA SALUD	98
CONSUMO DE ALCOHOL: FRECUENCIA DE CONSUMO	98
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	98
<i>Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	98
CONSUMO DE ALCOHOL: EDAD DE INICIO AL CONSUMO DE ALCOHOL	103
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	103
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	103
CONSUMO DE ALCOHOL: SOSPECHA DE ALCOHOLISMO.....	107
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	107
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	107
CONSUMO DE TABACO: FRECUENCIA DE CONSUMO	112
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	112
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	112
CONSUMO DE TABACO: EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE TABACO.....	117
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	117
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	117

Tabla de Contenidos

<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	121
<i>Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	121
ALIMENTACIÓN:.....	126
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	126
<i>Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	127
PESO CORPORAL: SOBREPESO Y OBESIDAD.....	137
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	137
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	137
ACTIVIDAD FÍSICA.....	142
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	142
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	142
BLOQUE III: PRÁCTICAS PREVENTIVAS	150
VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE.....	150
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	150
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	150
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.....	154
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	154
<i>Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	154
VISITAS MÉDICAS DE GINECOLOGÍA.....	158
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	158
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	158
MAMOGRAFÍAS.....	162
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	162
<i>Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	162
CITOLOGÍAS.....	166
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	166
<i>Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	166
EXPOSICIÓN SOLAR.....	170
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	170
<i>Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	170

Tabla de Contenidos

HIGIENE BUCO-DENTAL: VISITAS ODONTOLÓGICAS	174
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	174
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	174
SEGURIDAD VIAL	178
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015- 2016</i>	178
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	179
CONSEJO MÉDICO PARA DEJAR DE FUMAR	191
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	191
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	191
BLOQUE IV: PRÁCTICAS DE MEDIO AMBIENTE	195
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: PROPIEDAD DE LA VIVIENDA	195
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	195
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	195
EXPOSICIÓN AMBIENTAL AL TABACO: PERSONAS FUMADORAS PASIVAS EN EL HOGAR	201
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	201
<i>Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	201
EXPOSICIÓN AMBIENTAL AL TABACO: PERSONAS FUMADORAS PASIVAS FUERA DE CASA ENTRE SEMANA Y DURANTE EL FIN DE SEMANA	205
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	205
<i>Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	206
CONDICIONES DE TRABAJO:	213
EXPOSICIONES A VAPORES, HUMOS Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	213
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	213
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	213
CONDICIONES DE TRABAJO:	217
EXPOSICIONES A POSICIONES FATIGANTES O DOLOROSAS	217
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	217
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	217
CONDICIONES DE TRABAJO:	221
PERCEPCIÓN DE AFECTACIÓN NEGATIVA DEL TRABAJO EN LA SALUD	221

Tabla de Contenidos

<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	221
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	221
APOYO SOCIAL: APOYO CONFIDENCIAL Y APOYO AFECTIVO.....	225
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	225
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	225
BLOQUE V: SERVICIOS SANITARIOS	233
CONSULTAS MÉDICAS: FRECUENCIA, LUGAR DE CONSULTA, MOTIVOS DE CONSULTA Y PROFESIONAL DE LA MEDICINA VISITADO/A	233
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	233
<i>Evolución desde la I Escuela Andaluza de Salude de 1999</i>	233
INGRESOS HOSPITALARIOS: FRECUENCIA Y NÚMERO MEDIO DE HOSPITALIZACIONES	251
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	251
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	251
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS: FRECUENCIA	259
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	259
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	259
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS: TIPO DE DENTISTA VISITADO	267
<i>V Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016</i>	267
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	267
CONSUMO DE MEDICAMENTOS.....	272
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	272
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	272
COBERTURA SANITARIA	277
<i>V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016</i>	277
<i>Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	277
ANEXO A: CUESTIONARIO 2015	282
ANEXO B: DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES	307

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 1. Prevalencia de mala salud percibida por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	19
<i>Ilustración 2. Prevalencia de mala salud percibida por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	19
<i>Ilustración 3. Prevalencia de mala salud percibida por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	20
<i>Ilustración 4. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	20
<i>Ilustración 5. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	21
<i>Ilustración 6. Prevalencia de mala salud percibida por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	21
<i>Ilustración 7. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	24
<i>Ilustración 8. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	24
<i>Ilustración 9. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2007, 2011 y 2015.</i>	25
<i>Ilustración 10. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	25
<i>Ilustración 11. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	26
<i>Ilustración 12. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	26
<i>Ilustración 13. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	29
<i>Ilustración 14. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	29
<i>Ilustración 15. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	30
<i>Ilustración 16. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	30
<i>Ilustración 17. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	31
<i>Ilustración 18. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	31
<i>Ilustración 19. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	34

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 20. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	34
<i>Ilustración 21. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	35
<i>Ilustración 22. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	35
<i>Ilustración 23. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	36
<i>Ilustración 24. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	36
<i>Ilustración 25. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	40
<i>Ilustración 26. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	40
<i>Ilustración 27. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	41
<i>Ilustración 28. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	41
<i>Ilustración 29. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	42
<i>Ilustración 30. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	42
<i>Ilustración 31. Prevalencia de personas con alergia crónica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	46
<i>Ilustración 32. Prevalencia de personas con alergia crónica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	46
<i>Ilustración 33. Prevalencia de personas con alergia crónica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	47
<i>Ilustración 34. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	47
<i>Ilustración 35. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	48
<i>Ilustración 36. Prevalencia de personas con alergia crónica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	48
<i>Ilustración 37. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	49

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 38. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	49
<i>Ilustración 39. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	50
<i>Ilustración 40. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	50
<i>Ilustración 41. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	51
<i>Ilustración 42. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	51
<i>Ilustración 43. Prevalencia de personas con colesterol alto por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	52
<i>Ilustración 44. Prevalencia de personas con colesterol alto por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	53
<i>Ilustración 45. Prevalencia de personas con colesterol alto por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	53
<i>Ilustración 46. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	54
<i>Ilustración 47. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	55
<i>Ilustración 48. Prevalencia de personas con colesterol alto por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	55
<i>Ilustración 49. Prevalencia de personas diabéticas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	56
<i>Ilustración 50. Prevalencia de personas diabéticas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	56
<i>Ilustración 51. Prevalencia de personas diabéticas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	57
<i>Ilustración 52. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	57
<i>Ilustración 53. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	58
<i>Ilustración 54. Prevalencia de personas diabéticas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	58
<i>Ilustración 55. Prevalencia de personas hipertensas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	59
<i>Ilustración 56. Prevalencia de personas hipertensas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	59
<i>Ilustración 57. Prevalencia de personas hipertensas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	60
<i>Ilustración 58. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	60
<i>Ilustración 59. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	61
<i>Ilustración 60. Prevalencia de personas hipertensas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	61

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 61. Prevalencia de personas con problemas de nervios por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	62
<i>Ilustración 62. Prevalencia de personas con problemas de nervios por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	62
<i>Ilustración 63. Prevalencia de personas con problemas de nervios por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	63
<i>Ilustración 64. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	63
<i>Ilustración 65. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	64
<i>Ilustración 66. Prevalencia de personas con problemas de nervios por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	64
<i>Ilustración 67. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	65
<i>Ilustración 68. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	65
<i>Ilustración 69. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	66
<i>Ilustración 70. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	66
<i>Ilustración 71. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	67
<i>Ilustración 72. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	67
<i>Ilustración 73. Prevalencia de personas con varices en las piernas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	68
<i>Ilustración 74. Prevalencia de personas con varices en las piernas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	68
<i>Ilustración 75. Prevalencia de personas con varices en las piernas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	69
<i>Ilustración 76. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	69
<i>Ilustración 77. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	70

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 78. Prevalencia de personas con varices en las piernas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	70
<i>Ilustración 79. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	73
<i>Ilustración 80. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	73
<i>Ilustración 81. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	74
<i>Ilustración 82. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	75
<i>Ilustración 83. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	75
<i>Ilustración 84. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	76
<i>Ilustración 85. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	77
<i>Ilustración 86. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	77
<i>Ilustración 87. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	78
<i>Ilustración 88. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	78
<i>Ilustración 89. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	79
<i>Ilustración 90. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	79
<i>Ilustración 91. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	80
<i>Ilustración 92. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	80
<i>Ilustración 93. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	81
<i>Ilustración 94. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	81

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 95. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	82
<i>Ilustración 96. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	82
<i>Ilustración 97. Porcentaje de hogares con algún miembro que padezca alguna limitación física, sensorial o psíquica. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	83
<i>Ilustración 98. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	86
<i>Ilustración 99. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	86
<i>Ilustración 100. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	87
<i>Ilustración 101. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	87
<i>Ilustración 102. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	88
<i>Ilustración 103. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	88
<i>Ilustración 104. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	89
<i>Ilustración 105. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	89
<i>Ilustración 106. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	90
<i>Ilustración 107. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	90
<i>Ilustración 108. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	91
<i>Ilustración 109. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	91
<i>Ilustración 110. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	94
<i>Ilustración 111. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	94

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 112. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	95
<i>Ilustración 113. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	95
<i>Ilustración 114. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	96
<i>Ilustración 115. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	96
<i>Ilustración 116. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en casa, en el centro de trabajo o de tráfico. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	97
<i>Ilustración 117. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	100
<i>Ilustración 118. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	100
<i>Ilustración 119. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	101
<i>Ilustración 120. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	101
<i>Ilustración 121. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.</i>	102
<i>Ilustración 122. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.</i>	102
<i>Ilustración 123. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	104
<i>Ilustración 124. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	104
<i>Ilustración 125. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	105
<i>Ilustración 126. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	105
<i>Ilustración 127. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	106
<i>Ilustración 128. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	106

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 129. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	109
<i>Ilustración 130. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	109
<i>Ilustración 131. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	110
<i>Ilustración 132. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	110
<i>Ilustración 133. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	111
<i>Ilustración 134. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	111
<i>Ilustración 135. Prevalencia de personas que fuman a diario por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	114
<i>Ilustración 136. Prevalencia de personas que fuman a diario por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	114
<i>Ilustración 137. Prevalencia de personas que fuman a diario por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	115
<i>Ilustración 138. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	115
<i>Ilustración 139. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	116
<i>Ilustración 140. Prevalencia de personas que fuman a diario por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	116
<i>Ilustración 141. Edad media de inicio al consumo de tabaco por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	118
<i>Ilustración 142. Edad media de inicio al consumo de tabaco por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	118
<i>Ilustración 143. Edad media de inicio al consumo de tabaco por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	119
<i>Ilustración 144. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	119
<i>Ilustración 145. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	120

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 146. Edad media de inicio al consumo de tabaco por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015</i>	120
<i>Ilustración 147. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	123
<i>Ilustración 148. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	123
<i>Ilustración 149. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	124
<i>Ilustración 150. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	124
<i>Ilustración 151. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	125
<i>Ilustración 152. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	125
<i>Ilustración 153. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.</i>	128
<i>Ilustración 154. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	128
<i>Ilustración 155. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	129
<i>Ilustración 156. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	129
<i>Ilustración 157. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	130
<i>Ilustración 158. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	130
<i>Ilustración 159. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	131
<i>Ilustración 160. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	131
<i>Ilustración 161. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	132
<i>Ilustración 162. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	132

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 163. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	133
<i>Ilustración 164. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	133
<i>Ilustración 165. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.</i>	134
<i>Ilustración 166. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	134
<i>Ilustración 167. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	135
<i>Ilustración 168. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	135
<i>Ilustración 169. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	136
<i>Ilustración 170. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	136
<i>Ilustración 171. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	139
<i>Ilustración 172. Porcentaje de trabajadoras con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	139
<i>Ilustración 173. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	140
<i>Ilustración 174. Porcentaje de con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	140
<i>Ilustración 175. Porcentaje de con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	141
<i>Ilustración 176. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	141
<i>Ilustración 177. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	144
<i>Ilustración 178. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	144
<i>Ilustración 179. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	145

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 180. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	145
<i>Ilustración 181. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	146
<i>Ilustración 182. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	146
<i>Ilustración 183. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	147
<i>Ilustración 184. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	147
<i>Ilustración 185. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	148
<i>Ilustración 186. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	148
<i>Ilustración 187. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	149
<i>Ilustración 188. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	149
<i>Ilustración 189. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	151
<i>Ilustración 190. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	151
<i>Ilustración 191. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	152
<i>Ilustración 192. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	152
<i>Ilustración 193. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	153
<i>Ilustración 194. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	153
<i>Ilustración 195. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	155
<i>Ilustración 196. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	155

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 197. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	156
<i>Ilustración 198. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	156
<i>Ilustración 199. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	157
<i>Ilustración 200. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	157
<i>Ilustración 201. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	159
<i>Ilustración 202. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	159
<i>Ilustración 203. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	160
<i>Ilustración 204. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	160
<i>Ilustración 205. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	161
<i>Ilustración 206. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	161
<i>Ilustración 207. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	163
<i>Ilustración 208. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	163
<i>Ilustración 209. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	164
<i>Ilustración 210. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	164
<i>Ilustración 211. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	165
<i>Ilustración 212. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	167
<i>Ilustración 213. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	167

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 214. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	168
<i>Ilustración 215. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	168
<i>Ilustración 216. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	169
<i>Ilustración 217. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	171
<i>Ilustración 218. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	171
<i>Ilustración 219. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	172
<i>Ilustración 220. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	172
<i>Ilustración 221. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	173
<i>Ilustración 222. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	173
<i>Ilustración 223. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	175
<i>Ilustración 224. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	175
<i>Ilustración 225. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	176
<i>Ilustración 226. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	176
<i>Ilustración 227. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	177
<i>Ilustración 228. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	177
<i>Ilustración 229. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	180
<i>Ilustración 230. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	180

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 231. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	181
<i>Ilustración 232. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	181
<i>Ilustración 233. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	182
<i>Ilustración 234. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	182
<i>Ilustración 235. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	183
<i>Ilustración 236. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	184
<i>Ilustración 237. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	184
<i>Ilustración 238. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	185
<i>Ilustración 239. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	185
<i>Ilustración 240. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	186
<i>Ilustración 241. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	186
<i>Ilustración 242. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	187
<i>Ilustración 243. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	188
<i>Ilustración 244. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	188
<i>Ilustración 245. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	189
<i>Ilustración 246. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	189
<i>Ilustración 247. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	190

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 248. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	190
<i>Ilustración 249. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	192
<i>Ilustración 250. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	192
<i>Ilustración 251. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	193
<i>Ilustración 252. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	193
<i>Ilustración 253. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	194
<i>Ilustración 254. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	194
<i>Ilustración 255. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	197
<i>Ilustración 256. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	197
<i>Ilustración 257. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	198
<i>Ilustración 258. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	198
<i>Ilustración 259. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	199
<i>Ilustración 260. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	199
<i>Ilustración 261. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	200
<i>Ilustración 268. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	202
<i>Ilustración 269. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	202
<i>Ilustración 270. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	203

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 271. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	203
<i>Ilustración 272. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	204
<i>Ilustración 273. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	204
<i>Ilustración 274. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	207
<i>Ilustración 275. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	207
<i>Ilustración 276. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	208
<i>Ilustración 277. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	208
<i>Ilustración 278. Porcentaje personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	209
<i>Ilustración 279. Porcentaje personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	209
<i>Ilustración 280. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	210
<i>Ilustración 281. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	210
<i>Ilustración 282. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	211
<i>Ilustración 283. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	211
<i>Ilustración 284. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	212
<i>Ilustración 285. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.</i>	212
<i>Ilustración 286. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	214

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 287. Porcentaje de trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>214</i>
<i>Ilustración 288. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>215</i>
<i>Ilustración 289. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>215</i>
<i>Ilustración 290. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>216</i>
<i>Ilustración 291. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>216</i>
<i>Ilustración 292. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>218</i>
<i>Ilustración 293. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>218</i>
<i>Ilustración 294. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>219</i>
<i>Ilustración 295. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>219</i>
<i>Ilustración 296. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>220</i>
<i>Ilustración 297. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>220</i>
<i>Ilustración 298. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>222</i>
<i>Ilustración 299. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>222</i>
<i>Ilustración 300. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>223</i>
<i>Ilustración 301. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	<i>223</i>

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 302. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	224
<i>Ilustración 303. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	224
<i>Ilustración 304. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	227
<i>Ilustración 305. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	227
<i>Ilustración 306. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	228
<i>Ilustración 307. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	228
<i>Ilustración 308. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	229
<i>Ilustración 309. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	229
<i>Ilustración 310. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	230
<i>Ilustración 311. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	230
<i>Ilustración 312. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	231
<i>Ilustración 313. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	231
<i>Ilustración 314. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	232
<i>Ilustración 315. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	232
<i>Ilustración 316. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.</i>	235
<i>Ilustración 317. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	235
<i>Ilustración 318. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	236

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 319. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	236
<i>Ilustración 320. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	237
<i>Ilustración 321. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	237
<i>Ilustración 322. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	238
<i>Ilustración 323. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	238
<i>Ilustración 324. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	239
<i>Ilustración 325. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	239
<i>Ilustración 326. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	240
<i>Ilustración 327. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	240
<i>Ilustración 328. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	241
<i>Ilustración 329. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	241
<i>Ilustración 330. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	242
<i>Ilustración 331. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	242
<i>Ilustración 332. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	243
<i>Ilustración 333. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	243
<i>Ilustración 334. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	244

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 335. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	244
<i>Ilustración 336. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	245
<i>Ilustración 337. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	245
<i>Ilustración 338. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	246
<i>Ilustración 339. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	246
<i>Ilustración 340. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	247
<i>Ilustración 341. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	247
<i>Ilustración 342. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	248
<i>Ilustración 343. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	248
<i>Ilustración 344. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	249
<i>Ilustración 345. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	249
<i>Ilustración 346. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	250
<i>Ilustración 347. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	250
<i>Ilustración 348. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	253
<i>Ilustración 349. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	253
<i>Ilustración 350. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	254
<i>Ilustración 351. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	254

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 352. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	255
<i>Ilustración 353. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	255
<i>Ilustración 354. Número medio de hospitalizaciones en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	256
<i>Ilustración 355. Número medio de hospitalizaciones en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	256
<i>Ilustración 356. Número medio de hospitalizaciones en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	257
<i>Ilustración 357. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	257
<i>Ilustración 358. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	258
<i>Ilustración 359. Número medio de hospitalizaciones en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	258
<i>Ilustración 360. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	261
<i>Ilustración 361. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	261
<i>Ilustración 362. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	262
<i>Ilustración 363. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	262
<i>Ilustración 364. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	263
<i>Ilustración 365. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	263
<i>Ilustración 366. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	264
<i>Ilustración 367. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	264
<i>Ilustración 368. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	265

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 369. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	265
<i>Ilustración 370. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	266
<i>Ilustración 371. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	266
<i>Ilustración 372. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	268
<i>Ilustración 373. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	268
<i>Ilustración 374. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	269
<i>Ilustración 375. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	269
<i>Ilustración 376. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	270
<i>Ilustración 377. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	270
<i>Ilustración 378. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	271
<i>Ilustración 379. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	271
<i>Ilustración 380. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	274
<i>Ilustración 381. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	274
<i>Ilustración 382. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	275
<i>Ilustración 383. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	275
<i>Ilustración 384. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	276
<i>Ilustración 385. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	276

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 386. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	278
<i>Ilustración 387. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	278
<i>Ilustración 388. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	279
<i>Ilustración 389. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	279
<i>Ilustración 390. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	280
<i>Ilustración 391. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.</i>	280

Introducción, Objetivos y Metodología

Introducción

Este documento –al igual que los anteriores sobre este tema, con el propósito de facilitar su comprensión y comparabilidad con las anteriores Encuestas Andaluzas- contiene un informe descriptivo de un conjunto de variables seleccionadas por la Secretaría General de Salud Pública de la Junta de Andalucía a partir de los cuestionarios de adultos (personas mayores de 16 años de edad) de las cinco Encuestas Andaluzas de Salud (EAS) realizadas hasta el momento: en 1999 (I EAS-1999), en 2003 (II EAS-2003), en 2007 (III EAS-2007), en 2011-2012 (IV EAS 2011-2012) y en 2015-2016 (V EAS 2015-2016).

Su objetivo consiste en describir, de forma básica, los principales aspectos o dimensiones concernientes al estado de salud y a la utilización de los servicios sanitarios de la población adulta (mayores de 16 años de edad) residente en Andalucía, a partir de los datos procedentes de las cinco encuestas mencionadas, y compararlos gráficamente, cuando sea posible, a través de su evolución en el tiempo, desde 1999 hasta 2015-2016. La visión global del estado de salud de la población andaluza y de determinados aspectos de los servicios sanitarios que ofrece este documento puede ser un buen punto de partida para futuras investigaciones sobre temas específicos.

El lector debe ser consciente de que el análisis estadístico contenido en este documento es meramente descriptivo, con el único propósito de ofrecer una primera y elemental aproximación a la información derivada de estos instrumentos de medida, pero que, para finalidades de estimación o comparación estadística, deberá acudir a las técnicas inferenciales adecuadas (intervalos de confianza, tests de hipótesis). Y, por supuesto, no olvidar que la verificación de hipótesis de investigación requiere un tratamiento estadístico, y metodológico en general, adecuado para tal propósito.

La última de las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS) realizada la denominamos propiamente como “V Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016” o, abreviadamente, “V EAS 2015-2016”. Y ello en atención a que el trabajo de campo correspondiente se ha realizado entre abril de 2015 y febrero de 2016, ambos inclusive. Sin embargo, por razones de economía del lenguaje, a veces aparecerá referida como “V EAS” o “EAS-2015”.

Introducción, Objetivos y Metodología

La información se presenta atendiendo a cinco grandes bloques temáticos:

- BLOQUE I: Nivel de Salud
- BLOQUE II: Determinantes de Salud
- BLOQUE III: Prácticas Preventivas
- BLOQUE IV: Medio Ambiente
- BLOQUE V: Servicios Sanitarios

La V Encuesta Andaluza de salud 2015-2016 debe citarse de la misma forma que las anteriores, entre otras finalidades con la de preservar los derechos de propiedad intelectual:

“ Sánchez-Cruz JJ., García LI. y Mayoral JM. 2016. V Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016 de Adultos. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. “

Objetivos

El objetivo de este informe es describir los resultados obtenidos en la V Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016 de adultos y compararlos con los de las cuatro encuestas andaluzas de salud anteriores (I EAS-1999, II EAS 2003, III EAS 2007, IV EAS 2011-2012).

La descripción de los resultados será de modo global y desagregado según las siguientes variables sociodemográficas:

- Sexo
- Grupo de edad
- Provincia de residencia
- Nivel de estudios
- Nivel de ingresos
- Clase social.

Metodología

Población objeto de estudio

La población de estudio está conformada por las personas mayores de 16 años de edad, residentes en Andalucía en los años 1.999, 2.003, 2.007 y 2011-2012 (entre febrero de 2011 y febrero de 2012) y 2015-2016 (entre abril de 2015 y febrero de 2016), no institucionalizadas.

Se han considerado “viviendas principales” y “alojamientos fijos” aquellas viviendas utilizadas todo el año o la mayor parte del mismo como residencia habitual o permanente. Se excluyen del marco poblacional las residencias colectivas que comprenden: hoteles, hospitales, orfanatos, cuarteles, cárceles, conventos, etcétera, aunque sí se incluyen las viviendas ubicadas en estos establecimientos cuando existe un núcleo familiar independiente como, por ejemplo, la vivienda de los directivos o conserjes.

A efectos del diseño de la encuesta y la explotación posterior de resultados se ha diferenciado entre dos subpoblaciones: “población adulta” o, simplemente, “adultos” (conformada por personas de 16 o más años) y “población de menores” o “población infantil” (aquellas personas con edad inferior a 16 años).

En la elaboración de este informe se consideró únicamente la muestra de adultos.

Introducción, Objetivos y Metodología

Tipo de muestreo y unidades muestrales

El tipo de muestreo utilizado ha sido el muestreo probabilístico, por conglomerados, polietápico y estratificado. Las unidades muestrales fueron:

1ª etapa:	Municipios
2ª etapa:	Secciones censales
3ª etapa:	Viviendas familiares/hogares
4ª etapa:	Individuos (unidades muestrales finales)

Entendemos como “secciones censales” la subdivisión que hace el I.N.E. junto con los Ayuntamientos de los municipios y distritos municipales.

Estratificación y afijación muestral

La Encuesta ha utilizado dos criterios básicos de estratificación atendiendo al área geográfica: la provincia y el tamaño del hábitat de residencia. De esta forma, la provincia da lugar a 8 estratos. Respecto al hábitat, resultan cinco estratos:

- Estrato 1. Municipios de hasta 2.000 habitantes.
- Estrato 2. Municipios de 2.001 a 10.000 habitantes.
- Estrato 3. Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes.
- Estrato 4. Otros municipios con más de 50.000 habitantes.
- Estrato 5. Capitales de provincia.

Introducción, Objetivos y Metodología

La afijación muestral por cada estrato resultante del cruce de hábitat y provincia se ha realizado de forma proporcional a la población existente en los mismos (en las dos muestras de adultos y menores).

Existe además un tercer criterio de estratificación definido por el periodo temporal de realización de entrevistas. Así, en cada una de las dos subpoblaciones, adultos y menores, se determinaron dos muestras independientes distribuidas uniformemente a lo largo del año 2015-2016 en cuatro fases (oleadas), submuestras mensuales, que se aplicaron trimestralmente.

El grupo de edad y el sexo se consideraron como principales variables para controlar en cada oleada las desviaciones de la muestra obtenida respecto a tamaños muestrales prefijados: es decir, fueron considerados como “dominios”. Los estratos de edad en la muestra de adultos fueron: 16 – 24 años, 25 – 44 años, 45 – 54 años, 55 – 64 años, 65 – 74 años y 75 y más años.

La distribución muestral fue proporcional a la población de los estratos correspondientes.

La estructuración de la muestra de adultos fue, en general, la siguiente:

a) Muestra de adultos: En cuatro oleadas, submuestras mensuales, que se aplicaron trimestralmente.

Muestra base:

- Periodo de referencia o de aplicación del trabajo de campo: 1 año.
- Entrevistas: 6.484
- Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos.
- Número de submuestras: 4

Las submuestras:

- Periodo de referencia o de aplicación del trabajo de campo: 1 mes
- Entrevistas: 1.621
- Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos.
- Número de bloques: 4

Introducción, Objetivos y Metodología

Selección de las unidades muestrales

La selección de los municipios (unidades muestrales de primera etapa) incluidos en la muestra se realizó con probabilidad proporcional al tamaño en cada estrato: un total de 118 municipios (A partir de aquí, la selección de la muestra se llevó a cabo de forma que cualquier vivienda familiar tuviera la misma probabilidad de ser seleccionada en cada estrato. En este sentido, puesto que las muestras de población adulta y población infantil se consideran independientes en el diseño muestral, la selección de la muestra de adultos y la muestra de menores fue también independiente).

La selección de las secciones censales (unidades muestrales de segunda etapa) en cada municipio se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (a partir de la población de cada sección) y la de las viviendas (unidades muestrales de tercera etapa) en cada sección con probabilidad igual.

La selección de la vivienda determina la selección del individuo, considerando una única entrevista a adultos o una única encuesta a menores por vivienda. Atendiendo a los tamaños muestrales propuestos, se realizó una asignación prácticamente constante por sección. El tamaño fue en la mayoría de los casos de 9 adultos aunque se realizaron ajustes en función de la asignación muestral. La asignación varía en el rango de 7 a 10 adultos.

La selección de la vivienda se realizó mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio a partir del callejero disponible para cada sección, estableciendo el punto de arranque y la cadencia de selección de forma que garantizaran probabilidad igual de selección para cada vivienda.

La selección de las unidades muestrales últimas (personas a entrevistar) se desarrolló mediante aplicación de cuotas de sexo y edad por provincia y hábitat.

Para un nivel de confianza del 95%, un porcentaje poblacional esperado del 50% ($P=Q$), un error muestral para estimaciones globales de $\pm 1,413$, un efecto de diseño de 1.35, se prefijó un tamaño muestral de 6.496 personas para cada una de las EAS. Tras el trabajo de campo, estas muestras fueron de 6.484, 6.708, 6.511, 6507 y 6570 individuos para las EAS99, EAS03, EAS07, 2011-2012 y 2015-2016, respectivamente.

Introducción, Objetivos y Metodología

Análisis de los datos

En este documento la información se presenta con resúmenes gráficos de los resultados y el resumen descriptivo en el texto. Las variables cualitativas fueron analizadas mediante las distribuciones de porcentajes y para las cuantitativas se calculó la media.

Los resultados están desglosados por sexo, edad, provincia, nivel de estudios, nivel de ingresos y clase social, además de aportar la información de forma global.

Resultados

Resumen de Resultados

Nivel de Salud

En el año 2015, el 3,6% de la población andaluza percibió su estado de salud como malo o muy malo, siendo las mujeres la que en mayor el porcentaje percibían tener mala salud (4,5%). Dichos porcentajes aumentaron a medida que se incrementaba la edad del entrevistado. La provincia de Almería fue en la que un mayor porcentaje de adultos consideró su estado de salud como malo (6,1%). En los grupos de adultos con menor nivel de estudios, menor nivel de ingresos y clase social más desfavorecida fue mayor el porcentaje de aquellos que percibían su salud como mala.

La puntuación media de salud física de la escala SF-12 fue de 51,7, siendo un poco mayor en los hombres (52,6), observándose una disminución de casi 15 puntos entre la población más joven y la de mayor edad. La misma tendencia se observa para la puntuación mental de la escala SF-12, cuya media fue de 51,6. A mayor nivel de estudios, ingresos y clase social, mejor fue la salud física y mental de los andaluces.

Un 6,4% de la población andaluza declaró haber tenido algún tipo de dolor que les dificultaba el desarrollo normal de las actividades cotidianas, siendo este porcentaje el doble para las mujeres (8,4%) que para los hombres. La misma tendencia se observó para los andaluces que habían tenido problemas de salud física o emocional que limitaron sus actividades sociales. En Granada (13,4%) se observó el mayor porcentaje de personas con algún problema de salud que limitaba su trabajo, y Almería (7,7%) fue donde un mayor porcentaje de personas tuvieron dificultades en sus actividades sociales. A menor nivel de estudios, ingresos e inferior clase social, mayores fueron los porcentajes de adultos con problemas de salud que limitaban sus actividades.

Las dos enfermedades crónicas más frecuentes fueron la hipertensión (15,9%) y el colesterol (12,1%). Las mujeres presentaron mayores porcentajes que los hombres. El porcentaje aumentaba en las personas de mayor edad. A menor nivel de estudios, ingresos e inferior clase social, mayores fueron los porcentajes de adultos que padecen alguna enfermedad crónica.

Las limitaciones más frecuentes fueron las de tipo físico (3,6% de los andaluces con limitación física), resultando minoritarias las limitaciones sensoriales y psíquicas. En el caso de la limitación física se observó un mayor porcentaje entre las mujeres, mientras que en la limitación sensorial el porcentaje fue mayor en los hombres: no hubo apenas diferencias entre hombres y mujeres en el caso de limitación psíquica. Las personas con mayor edad fueron las más propensas a presentar algún tipo de limitación. De igual modo, un mayor porcentaje de limitaciones se observaron en los grupos de menor nivel de estudio e ingresos y de inferior clase social.

Resultados

En cuanto a la autonomía personal, las limitaciones de tipo instrumental fueron más frecuentes que las de tipo básico. En ambos casos la limitación fue superior en las mujeres, en los grupos de mayor edad, con menor nivel de estudios, ingresos y clase social más desfavorecida. La provincia donde se observó un mayor porcentaje de personas con limitaciones instrumentales o básicas fue Almería (un 37,6% en dificultad tipo instrumental y un 34,1% en el tipo básico), mientras que fue Córdoba la provincia andaluza con menor porcentaje de personas con limitaciones (un 22,7% en instrumental y un 11,3% en básica).

Un 44,9% de los andaluces declaró haber sufrido un accidente en los 3 meses previos a la encuesta, observándose un mayor porcentaje entre los adultos de 75 años o más (55,1%), con una tendencia decreciente según va disminuyendo la edad. En la provincia donde se produjeron accidentes en mayor porcentaje fue Jaén (62,3%). Los andaluces con menor nivel de estudios, ingresos y clase social baja fueron los que presentaron el mayor porcentaje de accidentes en los 3 meses previos a la entrevista. Estos accidentes se produjeron con mayor frecuencia en el hogar.

Determinantes de la salud

En el periodo 2015-2016, el 45,7% de la población andaluza mayor de 16 años consumió alcohol al menos una vez al mes, siendo el porcentaje de hombres (58,8%) casi el doble que el de mujeres. En la población joven fue donde mayor porcentaje de personas consumió alcohol, disminuyendo dicho porcentaje a medida que aumentaba la edad. En la provincia de Jaén se obtuvo el mayor porcentaje de adultos que consumió alcohol (55,7%). Entre los andaluces con mayor nivel de estudios, ingresos y clase social elevada se observó un mayor porcentaje que declaró que consumió alcohol al menos una vez al mes.

La edad media de inicio al consumo de alcohol fue de 17,5 años: más tardía para las mujeres (18,4 años) y más elevada entre las personas de mayor edad.

En Andalucía, el 2,8% de la población andaluza mayor de 16 años presentó sospecha de alcoholismo, siendo más elevado el porcentaje para los hombres y los más jóvenes (16 a 24 años), y reduciéndose según aumenta la edad. El porcentaje más alto de sospecha de alcoholismo se encontró en Almería (7%) y el más bajo en Sevilla (1,7%).

El 27,9% de la población andaluza mayor de 16 años manifestó consumir tabaco a diario, siendo superior el porcentaje en hombres (31,4%), en personas de entre 45 y 54 años (37,1%) y cuando la situación socioeconómica fue la más desfavorecida (menor nivel de estudios, ingresos y clase social baja). La edad media de inicio al consumo de tabaco fue de 17 años.

En 2015-2016, el 43,5% de los andaluces fumadores declaró haber intentado dejar de fumar en alguna ocasión, siendo más frecuente en las personas de mayor edad. Se destaca Almería (60,7%) por haber sido la provincia donde el porcentaje de personas que ha intentado dejar de fumar alguna vez fue más elevado. El perfil socioeconómico de los

Resultados

andaluces que intentaron dejar de fumar fue principalmente aquellos con estudios universitarios, ingresos superiores a los 2.500€ y clase social más favorecida.

El 93% de las personas mayores de 16 años declaró consumir productos lácteos y sus derivados al menos tres veces por semana. El 81,8% consumió fruta fresca y el 77% verduras y hortalizas al menos tres veces por semana, siendo más habitual en personas con edades superiores.

Según el Índice de Masa Corporal (IMC), el 56,1% de los andaluces tuvo sobrepeso u obesidad en el periodo de estudio 2015-2016, siendo más acusado en edades elevadas y con nivel socioeconómico más desfavorecido.

En 2015-2016, el 89% de la población andaluza tuvo un trabajo o actividad habitual sedentaria y el 38% declaró no practicar ejercicio físico en su tiempo libre; siendo más elevados estos porcentajes en las personas de mayor edad. En las personas con un nivel socioeconómico más desfavorecido fue más frecuente el sedentarismo en su tiempo libre.

Prácticas preventivas

En el periodo 2015-2016, el 16,2% de la población andaluza se vacunó contra la gripe. Mayoritariamente la vacuna fue aplicada en las personas mayores de 74 años (62,7%). Los andaluces con estudios primarios y rentas mensuales más bajas son los que principalmente se vacunaron.

Más de la mitad de la población andaluza admitió no usar ningún método anticonceptivo. Los andaluces mayores de 55 años empiezan a dejar de utilizar métodos anticonceptivos; los que tenían entre 25 y 44 años los usaron en mayor proporción. Un mayor porcentaje de andaluces que no utilizan ningún método anticonceptivo pertenecían a grupos con nivel socioeconómico desfavorecido.

En el periodo abril 2015- febrero 2016, el 86,3% de las mujeres andaluzas acudió alguna vez al ginecólogo, el 48,1% se ha realizado alguna vez una mamografía, y el 64,3% se ha realizado una citología vaginal alguna vez. Más del 90% de las mujeres con edades intermedias, de 25 a 64 años, han visitado alguna vez al ginecólogo. Entre el 85% y el 91% de las mujeres con edades comprendidas entre 55 y 74 años se hizo alguna vez una mamografía. Más del 70% de las mujeres con edades entre los 25 y los 44 años se realizó alguna vez una citología vaginal. Un mayor porcentaje de mujeres que visitaron el ginecólogo pertenecían a un nivel socioeconómico más desfavorecido: también fueron las que en mayor porcentaje se hicieron una mamografía; mientras que las que tenían un mejor nivel socioeconómico fueron las que, en mayor porcentaje, se realizaron una citología. Se observa una tendencia creciente -a lo largo de los años- del porcentaje de mujeres que visitan al ginecólogo, se realizan mamografías y citologías vaginales.

Un 13,7% de la población andaluza se expuso al sol en las horas centrales del día el verano anterior. El mayor porcentaje de personas expuestas al sol en esas horas fueron los más jóvenes.

Resultados

En Andalucía un 31,8% de la población acudió al dentista en los últimos 6 meses. Las personas con edades inferiores fueron quienes más se preocuparon de su higiene bucodental. Se puede observar que hay una tendencia creciente en las visitas al dentista según mejora la situación socioeconómica de los andaluces.

En relación a la seguridad vial, más del 95% de los andaluces siempre usó el casco y el cinturón de seguridad tanto en ciudad como en carretera, siendo un poco más elevado el uso del cinturón. En cuanto a los asientos especiales infantiles, lo usó un 97% de la población andaluza, siendo los mayores de 65 años los que menos lo usaron. Atendiendo al nivel socioeconómico, los porcentajes más bajos observados en cuestiones de seguridad vial se observó entre los andaluces con menor nivel de estudios, ingresos y clases sociales más desfavorecidas.

En el periodo 2015-2016, al 37% de los andaluces le fue aconsejado por su médico el dejar de fumar, siendo mayor este porcentaje a medida que aumenta la edad. En la provincia de Almería (55,4%) fue donde se observó el mayor porcentaje de personas a las que su médico le aconsejó dejar de fumar. Según el nivel de estudios e ingresos, el mayor porcentaje de andaluces aconsejados por su médico para que dejaran de fumar se dio en los grupos con estudios primarios e ingresos mensuales inferiores a 1.000€ o de 2.500€ o más. Respecto a la clase social, las clases medias o bajas fueron a los que en mayor porcentaje su médico les aconsejó dejar de fumar. Desde 2007 se observa un aumento de más de 15% en el porcentaje de personas cuyos médicos les aconsejaron dejar de fumar.

Prácticas del medio ambiente

En el periodo 2015-2016 el 84,6% de la población andaluza era propietaria de una vivienda, mientras que el 14,2% vivía de alquiler. Las personas con edades avanzadas (más de 55 años) fueron quienes tenían una vivienda en propiedad en mayor porcentaje (más del 90%). Por el contrario, más del 20% de los que vivían de alquiler fueron los menores de 55 años. Cuanto mayor es el poder adquisitivo, mayor es el porcentaje de personas con viviendas en propiedad. Sin embargo, respecto al nivel de estudios, las personas con estudios primarios fueron quienes en mayor porcentaje tenían vivienda de propiedad, y los universitarios los que vivían en mayor porcentaje de alquiler. En general la vivienda en propiedad tiende a disminuir a lo largo de los años analizados, y la vivienda de alquiler tiende a aumentar.

En Andalucía, el promedio de habitaciones por vivienda fue de 3,2, siendo menor este promedio entre los andaluces menores de 44 años. Según el nivel socioeconómico de la población andaluza, las viviendas con mayor número de habitaciones pertenecían a aquellos que tenían más ingresos mensuales (2.500€ mensuales o más).

En el periodo estudiado, el 26% de la población andaluza fue fumadora pasiva en el hogar, siendo los más jóvenes los que estuvieron más expuestos al humo del tabaco, disminuyendo el porcentaje a medida que aumentaba la edad. Destacamos Almería por tener un 36,7% de personas fumadoras pasivas en el hogar. Los andaluces con estudios

Resultados

secundarios, con rentas más bajas y con clases sociales más desfavorecidas fueron fumadores pasivos en mayor porcentaje.

En relación a las personas fumadoras pasivas entre semana fuera del hogar, un 6,3% de éstas permaneció en ambientes cargados de humo de 1 a 4 horas diarias, y un 2,4% pasó más de 4 horas. Las personas más jóvenes fueron las que permanecieron en este tipo de ambiente en mayor porcentaje, disminuyendo este a medida que aumentaba la edad. En Cádiz es donde se observaron los valores más altos: un 14,2% de personas estuvieron entre 1 y 4 horas diarias en ambientes cargados de humo y un 6,3% estuvo más de 4 horas diarias. En general, los andaluces estuvieron más expuestos a ambientes cargados de humo en fin de semana que durante la semana (de 1 a 4 horas: un 7,9% en fin de semana y más de 4 horas : un 3,6% en fin de semana). De nuevo el mayor porcentaje de fumadores pasivos en fin de semana se observó entre los más jóvenes. Málaga fue la provincia con los valores más altos durante el fin de semana (14,8% de personas expuestas de 1 a 4 horas y 9% más de 4 horas). Los andaluces con nivel socioeconómico más desfavorable estuvieron expuestos al humo del tabaco entre semana en mayor porcentaje, mientras que aquellos que tenían una situación socioeconómica más favorable lo estuvieron más en el fin de semana.

Un 13,7% de la población residente en Andalucía en el periodo de estudio estuvo muy expuesto a vapores, humos y otro tipo de sustancias peligrosas en su puesto de trabajo: los hombres son los que están más expuestos. Por edad, los andaluces de 45 a 54 años fueron los que estuvieron más expuestos a este tipo de sustancias. La provincia de Huelva fue donde se observó que más del 20% de los trabajadores respiraron o manejaron sustancia nocivas para la salud en su trabajo. Las más expuestas a sustancias peligrosas en su puesto de trabajo fueron las personas pertenecientes a un nivel socioeconómico desfavorable.

El 34% de los residentes andaluces estuvo muy expuesto a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo. En las personas con nivel socioeconómico muy favorable fue donde se observó el menor porcentaje.

El 22,8% de los andaluces indicó que su trabajo le afectaba negativamente en la salud. Las personas con edades más avanzadas (55 a 64 años) fueron las que más percibieron una influencia negativa del trabajo en su salud. Sevilla (10,5%) fue la que presentó el menor porcentaje de personas que indicaron que su trabajo afectaba negativamente su salud; Cádiz (44,7%) donde se observó el mayor porcentaje. Los andaluces con una posición socioeconómica menos favorable fueron los que en mayor porcentaje declararon que el trabajo afectaba negativamente su salud.

En Andalucía, el 3% de los residentes tuvieron un escaso apoyo confidencial y el 5,3% un escaso apoyo afectivo. A medida que aumentaba la edad, se incrementaba el porcentaje de personas con escaso apoyo social. En general, los porcentajes de personas con escaso apoyo confidencial y afectivo ha disminuido en los últimos años.

Resultados

Servicios sanitarios

En el periodo estudiado, el 28,8% de la población andaluza consultó el médico en las dos semanas previas a la encuesta. Más del 70% lo había hecho en un centro de salud o consultorio, independientemente del sexo, edad, provincia y nivel socioeconómico. El principal motivo de la visita fue para diagnóstico o tratamiento, en más del 50%. Y más del 80% visitó a un profesional de medicina general. En la provincia de Jaén (43,9%) fue donde más se acudió al médico. Las personas mayores, aquellas con menor nivel de estudios, ingresos o de clase social más desfavorecida son las que más acudieron a las consultas médicas.

Durante el año 2015, el 6,6% de los residentes andaluces estuvo ingresado al menos una noche en el último año, observándose un mayor porcentaje entre las mujeres (7,5%) y siendo el número medio de hospitalizaciones de 1,3 veces al año. Entre las personas de 75 años o más, se observó un mayor porcentaje de hospitalización y un mayor número medio de hospitalizaciones. Los andaluces con estudios primarios o universitarios, con ingresos mensuales inferiores a 1.500€ o de clase media fueron los más hospitalizados en el último año.

En el año previo a la entrevista, el 18,9% de la población residente en Andalucía acudió alguna vez a urgencias. El 92,8% fue al servicio de urgencias de la seguridad social. Las mujeres fueron casi un 5% más que los hombres. Las personas que más demandaron el servicio se encontraban en las edades extremas (16 a 24 años o 75 o más años). Los andaluces que más acudieron a los servicios de urgencias fueron aquellos con estudios secundarios, con ingresos inferiores a 1.000€ o de clase social baja.

El 88% de la población andaluza que acudió al dentista lo hizo en una consulta privada: los más jóvenes (16 a 24 años) y los mayores de 65 años fueron los que más visitaron al dentista. Más del 80% de la población de cada provincia acudió al dentista privado, seguido del dentista de la seguridad social. No se encontraron diferencias notables según la situación socioeconómica entre las personas que acudieron al dentista privado.

En 2015 (estrictamente, entre abril de 2015 y febrero de 2016), más de la mitad de la población andaluza (56,8%) consumió algún tipo de medicamento durante las dos semanas previas a la encuesta: el porcentaje de mujeres fue un 13% superior al de los hombres. Con respecto a la edad, se observa una tendencia creciente del consumo de medicamentos según aumenta esta. Los andaluces con el perfil socioeconómico más desfavorecido fueron los que consumieron más medicamentos en las dos semanas previas a la encuesta.

El 4% de los residentes en Andalucía declaró tener doble cobertura sanitaria. La franja de edad donde se observó el mayor porcentaje fue de 25 a 44 años (5,3%). En lo referente al perfil socioeconómico, se observa la tendencia creciente de doble cobertura sanitaria según mejora éste.

Bloque I: Nivel de Salud

Salud general: Percepción de mala salud

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio (abril 2015 – febrero 2016), el 3,6% de la población andaluza declaró tener una mala salud, siendo en las mujeres donde se percibió la mala salud en mayor porcentaje (4,5% frente al 2,6% de los hombres). Se encontró que la percepción de la mala salud y la edad del encuestado están directamente relacionadas, así pues, los porcentajes aumentan progresivamente desde un 0,5% en edades más tempranas hasta un 15,4% en mayores de 75 años.

Según los datos provinciales, los residentes en Almería (un 6,1%) son los que en mayor porcentaje perciben su salud como mala, en contraste con los de Córdoba, donde se observa el menor porcentaje (2%) con mala salud.

Los residentes andaluces con estudios primarios, con ingresos inferiores a 1.000€ o de clases sociales más desfavorecidas presentaban una mayor percepción de mala salud (6,1% estudios primarios, 6,1% ingresos inferiores a 1.000€ y 3,6% clases sociales desfavorecidas), siendo menor dicha percepción cuanto mayor es el nivel de estudios, los ingresos o la clase social.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En el año 2011 se produjo un leve descenso en los porcentajes de personas residentes en Andalucía que tuvieron una percepción de mala salud con respecto a años anteriores (4,2% en 1999, 4,8% en 2003, 4,1% en 2007), manteniéndose similar en 2015 el porcentaje con respecto a 2011 (3,4 en 2011 vs. 3,6% en 2015). La percepción de mala salud es ligeramente superior en mujeres que en hombres a lo largo de los años. En cuanto a la edad del encuestado, los porcentajes fueron mayores en personas con mayor edad a lo largo de los años. Entre los mayores de 75 años se produjo la mayor disminución de personas con mala percepción de salud desde 2011 hasta 2015.

Por provincias, la percepción de mala salud en los últimos años fue muy similar, descendiendo hasta 2011 el porcentaje de personas que perciben su salud como mala y elevándose ligeramente hasta 2015, exceptuando las provincias de Córdoba, Granada y Cádiz, donde disminuyó con respecto a 2011. Cabe destacar la provincia de Almería donde el aumento de personas con mala salud percibida con respecto a 2011 fue el mayor observado (4,6% en 2011 y 6,1% en 2015). Para el resto de las provincias los resultados con respecto a 2011 se mantuvieron similares.

Resultados

En relación al nivel de estudio, la mayor diferenciación en la evolución de los porcentajes de personas con mala salud percibida fue en el grupo con estudios primarios, observándose un aumento en 2015 con respecto a 2011. Entre las que tenían un nivel de estudio secundario o superior se mantuvieron los porcentajes con mala salud percibida con respecto a 2011.

Según el nivel socioeconómico, no se observaron diferencias en los porcentajes de personas cuya percepción de salud fue mala a lo largo de los años de realización de las encuestas en los grupos con nivel económico medio, sin embargo, en aquellos con ingresos superiores a 2.500€ el porcentaje pasaron de un 2,5% en 2011 a prácticamente un 0% en 2015. Por otro lado, con respecto a la clase social, donde mayor aumento se observó fue en el grupo con clase social nivel III: de un 1,7% en 2011 a un 3% en 2015, siendo similar los porcentaje en el resto de las clases sociales.

Resultados




Ilustración 1. Prevalencia de mala salud percibida por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 2. Prevalencia de mala salud percibida por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Salud general: Percepción de mala salud




Ilustración 3. Prevalencia de mala salud percibida por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Salud general: Percepción de mala salud



Ilustración 4. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Salud general: Percepción de mala salud



Ilustración 5. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Salud general: Percepción de mala salud




Ilustración 6. Prevalencia de mala salud percibida por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Salud general: Puntuación física de la escala SF-12

En el cuestionario SF-12 las personas entrevistadas contestaron a una serie de preguntas relacionadas con su estado de salud. Una vez codificadas las respuestas aportadas, los valores se trasladaron a una escala de 0 (el peor estado de salud) a 100 (el mejor estado de salud), en la que, por tanto, valores mayores indican mejores resultados. Dicho cuestionario es el que se utilizó para medir la dimensión física de la salud general de la población andaluza.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el año 2015, el valor medio en la escala física SF-12 para la población andaluza fue 51,7. Estos valores fueron superiores en los hombres (52,6) que en las mujeres (50,9). Se observó que los valores medios de la escala física disminuyen cuando la edad del encuestado aumenta (desde 55,9 en personas de 16 a 24 años, hasta 40,5 en personas de 75 años o más).

Las provincias con personas que tenían un mayor valor medio fueron Córdoba (52,9), Sevilla (52,9) y Huelva (52,4). No se observaron diferencias considerables en cuanto al estado físico del encuestado con respecto a la provincia donde vivía.

Según el nivel socioeconómico de los andaluces, se constata una relación directa en función del nivel de estudios, los ingresos o la clase social: a mayor nivel de estudios, ingresos o clase social más elevada, mayor es el valor medio en la escala de salud física de la persona.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde el año 1999, se han observado unos valores medios similares del estado de salud física, pasando de un 52,2 en 1999 a un 51,7 en 2015. Un poco más acusado fue el descenso de los hombres hasta 2011 (53,3 en 1999 a 51,8 en 2011), encontrándose en 2015 una ligera mejora con respecto a 2011 (52,6 en 2015), mientras que en las mujeres prácticamente se mantiene igual el nivel de salud física (51,1 en 1999 y 50,9 en 2015). Además durante todo el período de estudio los hombres tuvieron mejor estado de salud física que las mujeres: esta diferencia en toda la evolución se mantiene prácticamente constante alrededor de un punto.

Con respecto a la edad del encuestado, en general los valores medios de salud física han descendido en algo menos de un punto hasta 2011, pero se han recuperado en 2015 levemente en casi todos los grupos de edad. Estos cambios son más acusados entre los adultos de 16 a 24 años y los de 75 o más años (pasan de 54,8 en 2011 a 55,9 en 2015; y de 37,9 en 2011 a 40,5 en 2015, respectivamente).

Resultados

En general, en todas las provincias, desde 1999 la puntuación media de la salud física ha descendido alrededor de un punto, exceptuando en las provincias de Jaén y Málaga, donde el descenso es de casi tres puntos (de 53,1 en 1999 a 50,6 en 2015; y de 53,2 en 1999 a 51,4 en 2015, respectivamente).

Según el nivel socioeconómico, hubo un pequeño descenso hasta 2011, recuperándose ligeramente en 2015. En relación al nivel de estudios, aquellos con estudios primarios revelaron una salud física peor que aquellas personas con estudios secundarios o universitarios. Con respecto a los ingresos, las personas con ingresos superiores a los 2.500€ indicaron una mejoría de su salud física con un aumento de la puntuación media de la salud física en dos puntos respecto a 1999, y las personas con menos ingresos económicos gozan de peor nivel de salud. En relación a las clases sociales, apenas se observa cambio en la evolución en los grupos y se mantiene la pauta según la cual las personas con clase social más alta perciben un mejor estado de salud físico.

Resultados

Indicadores de salud física




Ilustración 7. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Indicadores de salud física




Ilustración 8. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Indicadores de salud física




Ilustración 9. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2007, 2011 y 2015.

Indicadores de salud física




Ilustración 10. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 11. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 12. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Salud general: Puntuación mental de la escala SF-12

De nuevo, en este apartado se utilizó el cuestionario de salud SF-12 para medir la dimensión mental de la salud general de la población andaluza. Los valores obtenidos en las preguntas de dicho cuestionario se cuantificaron en un rango que va del 0 hasta el 100, que indica que cuanto mayor es la puntuación obtenida mejor es el estado de salud en la ciudadanía en la dimensión analizada.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En 2015 se obtuvo un valor medio de salud mental de 51,6 para el total de la población encuestada, encontrándose los hombres en mejor estado de salud mental que las mujeres (obtuvieron una puntuación mayor: 52,4 en hombres versus 50,7 en mujeres). Por edad, se observó una mejor salud mental en personas más jóvenes: los valores medios descienden desde el 53,9 en personas de entre 16 y 24 años hasta el 49,1 en personas con 75 años o más.

Según la zona geográfica, en casi todas las provincias se obtuvieron valores medios entre 50 a 53 puntos, excepto en Almería y Huelva, con menor puntuación (48,2) y Cádiz, con una puntuación mayor (54,5).

Considerando el nivel socioeconómico, a mayor nivel de estudios, de ingresos o clase social más elevada, mejor es la salud mental de los andaluces.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un aumento general en el valor medio de la escala de salud mental (de 48,7 en 1999 a 51,6 en 2011), siendo los varones los que obtuvieron una mejor salud mental en todos los años del estudio. Sin embargo, el aumento no fue progresivo hasta 2015: aumentó hasta 2003, luego disminuyó en 2007 y continuó disminuyendo en 2011, volviéndose a recuperar en el 2015 (alcanzando valores similares a los del 2007).

En cuanto a la edad del encuestado, se produjo un aumento general de los valores medios de la puntuación mental de la escala SF-12 desde 1999 en todos los grupos etarios. Respecto a 2011, se constata que la mejora de la salud mental se produjo principalmente en los grupos de edad superior a 55 años.

En general, se produjeron mejorías en los niveles de salud mental en comparación con 2011 en algunas provincias y en otras se mantuvieron prácticamente iguales, excepto en Huelva, que ha empeorado en estos últimos 4 años aproximadamente 3 puntos. Todas las provincias mejoran su nivel de salud mental respecto a 1999, excepto Almería y Huelva: destaca Cádiz con una subida de más de 6 puntos (de 48,1 en 1999 a 54,5 en 2015).

Resultados

Según el nivel de estudios, la salud mental entre las personas con estudios universitarios se mantuvo similar desde 2003, mientras que en el caso de las personas con estudios primarios y secundarios se observó una mejora en la salud mental desde 2011 a 2015, sin embargo no llegaron a alcanzar la mejora de salud mental observada en el 2003. Una tendencia similar se observa en las clases sociales, donde las clases más altas tuvieron una salud mental similar desde 2003, mientras que en las clases más bajas se observó una mejora con respecto a 2011, aunque dicha mejora no llegó a alcanzar la salud mental que estos tuvieron en 2003. Las personas con ingresos inferiores 999€ mensuales fueron las que peor salud mental evidenciaron; las de ingresos superiores a 1.500€ se asociaron con una mejor salud mental. Desde el año 2011-2012 (4ª Encuesta Andaluza de Salud) hasta el año 2015-2016 (5ª Encuesta Andaluza de Salud) todos los grupos económicos muestran una ligerísima tendencia a mejorar su salud mental.

Resultados

Indicadores de salud mental




Ilustración 13. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Indicadores de salud mental




Ilustración 14. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 15. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 16. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 17. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 18. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual

Este estudio de la limitación para la realización de las actividades cotidianas se realizó preguntando a las personas encuestadas si en las cuatro semanas previas a la encuesta tuvieron algún dolor que les dificultara el trabajo habitual. Dicho trabajo incluía tanto el trabajo fuera de casa y como las tareas domésticas.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo estudiado 2015-2016 un 6,4% de los residentes andaluces declaró haber tenido algún tipo de dolor que les dificultaba el desarrollo normal de las actividades cotidianas: el porcentaje en las mujeres fue el doble que en los hombres (8,4% en mujeres y 4,2% en hombres).

La prevalencia fue menor en la población más joven y se incrementó de manera progresiva con el aumento de la edad (de un 0,6% de personas entre 16 y 24 años a 21,7% de personas de 75 años o más).

En Granada (13,4%) se observó el mayor porcentaje de personas con algún dolor que limitaba su actividad cotidiana, mientras que el porcentaje más bajo se dio en Córdoba y Sevilla (2,9% y 2,8%, respectivamente).

Los andaluces con menor nivel de estudios, menores ingresos y clases sociales más desfavorecidas declararon tener, en mayor porcentaje, algún dolor que limitaba su actividad cotidiana, disminuyendo dicho porcentaje según aumentaba el nivel socioeconómico de estos. El porcentaje de personas con dolencias en los grupos con niveles más bajos de estudios, ingresos y clase social son considerablemente superior que en los grupos de nivel socioeconómico más alto (pasando de un 10,2% en estudios primarios a 2,9% en estudios secundarios y un 2,8% en estudios universitarios; de un 10% ingresos inferiores a los 1.000€ a 4,1% en ingresos entre 1.000€-1.499€, a un 3,2% en ingresos entre 1.500€-2.499€ y a un 1,5% en ingresos superiores a 2.500€. Se pasó de un 6,7% en las clases sociales más desfavorecidas a un 3,3% en las clase sociales más elevadas).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se produjo un descenso en los porcentajes de personas con limitaciones para el trabajo habitual hasta el año 2007. Sin embargo, se experimentó un aumento general en los porcentajes correspondientes a 2011, sin llegar a alcanzar los valores de 1999, para posteriormente en 2015 comenzar a descender de nuevo (descenso desde el 8,2% en 1999 al 4,4% en 2007, incrementándose al 7,4% en 2011, para descender nuevamente al 6,4% en 2015). En todo este tiempo, las mujeres tuvieron más dificultades que los hombres para realizar con normalidad actividades cotidianas.

Resultados

En líneas generales, el porcentaje de andaluces que vieron limitada su actividad cotidiana por alguna molestia ha disminuido en 2015 respecto a 2011 en todos los grupos de edad, siendo más acusado este descenso en los adultos de 16 a 24 años y en los mayores de 75 o más años.

Según la provincia de residencia, se observa una disminución en los porcentajes de personas con limitación desde 2011, excepto en las provincias de Granada y Málaga, en las que aumentó en 2015.

En lo referente al nivel de estudios del encuestado, se observa una disminución del porcentaje de limitados entre personas con nivel de estudios primarios y secundarios a lo largo de los años. Para el caso del nivel de estudios universitarios, el porcentaje de personas con la limitación de las actividades cotidianas aumentó de 2011 a 2015.

En cuanto al nivel de ingresos mensuales del encuestado, se observa que el porcentaje de personas con alguna limitación en las últimas cuatro semanas ha disminuido en estos últimos 4 años, siendo más acusado el descenso a mayor nivel de ingresos.

Por último, en relación con la clase social a la que pertenece el encuestado, del año 2011 al 2015 ha aumentado el porcentaje de personas con limitación en las clases sociales más elevadas, mientras que en las demás clases sociales el porcentaje ha descendido (del 2,4% en 2011 al 3,3% en 2015 en las clases sociales I y II; del 5,6% en 2011 al 4,3% en 2015 en la clase social III, y del 7,8% en 2011 al 6,7% en 2015 en las clases sociales más desfavorecidas).

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Ilustración 19. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Ilustración 20. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Ilustración 21. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual



Ilustración 22. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Ilustración 23. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Ilustración 24. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Resultados

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

Durante el periodo de estudio, un 4,3% de las personas residentes en Andalucía tuvieron algún problema de salud física o emocional durante el mes previo a la realización de la encuesta, problemas que les dificultó la realización de actividades sociales. Se observaron diferencias apreciables entre hombres y mujeres (3,5% de hombres versus 5,2% de mujeres).

La prevalencia de personas en las que algún problema de salud física o emocional limitó sus actividades sociales fue superior en la población de mayor edad: un 0,9% en personas de 16 a 24 años y un 12,1% en personas de 75 o más años.

Según la provincia de residencia del encuestado, Almería fue en la que mayor porcentaje de personas tuvieron dificultades en sus actividades sociales (7,7%), en contraste con Córdoba, que fue donde menor porcentaje se observó (1,1%).

En cuanto al nivel socioeconómico, los andaluces con menor nivel de estudios, de ingresos y pertenecientes a clases sociales más desfavorecidas tuvieron en mayor porcentaje alguna limitación en las actividades sociales por problemas de salud física y emocional. A medida que aumenta el nivel socioeconómico el porcentaje disminuyó.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En general, observamos la misma tendencia descrita para la limitación en el trabajo habitual mostrado en la sección anterior: se produjo un descenso de personas con dificultades en sus actividades sociales desde 1999 hasta 2007, aumentó en 2011 (éste porcentaje fue superior al de 1999), y finalmente en 2015 vuelve a descender (en este año el porcentaje fue inferior al de 1999). Las mujeres fueron las que más dificultades encontraron, aunque se observa que a lo largo de los años las diferencias entre hombres y mujeres en relación a la limitación en el entorno social disminuyeron.

Respecto a la edad, las personas entre 65 y 74 años pasaron de casi duplicar el porcentaje en el periodo 2007-2011 a reducirse a más de la mitad en 2015 (7,3% en 2007, 12,8% en 2011 y 5,2% en 2015).

En cuanto a la zona geográfica, Cádiz y Huelva mantuvieron valores similares en 2003 y 2007; en el resto de provincias descendió el porcentaje de personas con limitaciones en sus actividades sociales hasta 2007, volviendo a ser superior en 2011, y posteriormente disminuyó en 2015. Se puede destacar la excepción de Málaga y Sevilla, donde este porcentaje

Resultados

aumenta hasta 2003, descendiendo en años sucesivos en el caso de Sevilla y aumentando de nuevo desde 2011 a 2015 en la provincia de Málaga.

Según el nivel de estudios del entrevistado, en el grupo de personas con estudios primarios fue donde se produjo un mayor aumento de 2007 a 2011 y un mayor descenso de 2011 a 2015 (5,1% en 2007, 9,5% en 2011 y 6,3% en 2015).

Por nivel de ingresos mensuales del entrevistado, los mayores cambios en los porcentajes de personas que declararon haber tenido algún deterioro de la salud física o emocional que les dificultara sus actividades sociales se dio en los grupos con ingresos inferiores a 1.500€, aumentando hasta 2011 y posteriormente descendiendo en 2015.

De nuevo se produce un descenso hasta el 2007 en el porcentaje de personas con limitaciones en su vida social según la clase social a la que pertenece, con un posterior aumento en 2011, para volver a decrecer en 2015, equiparándose estos resultados a los obtenidos en 2007 y siendo más acentuado en la clase social más desfavorecida.

Resultados

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Ilustración 25. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Ilustración 26. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Ilustración 27. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Ilustración 28. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Ilustración 29. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Ilustración 30. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Enfermedades crónicas

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 las dos enfermedades crónicas más frecuentes fueron la hipertensión (15,9%) y el colesterol alto (12,1%). Por otro lado, las menos frecuentes fueron las varices en la piernas (3,6%) y los problemas cardiacos (4%). En cada una de ellas, las mujeres presentaron, en general, mayores porcentajes que los hombres: 15,7% de hombres en contraste con el 16,1% de mujeres en el caso de la hipertensión; 11,8% de hombres frente al 12,3% de mujeres que tenían colesterol alto; 1,5% de hombres versus el 5,6% de mujeres que tenían varices en las piernas. Sin embargo, el 4% de hombres y el 4,1% de mujeres tuvieron problemas cardiacos.

La prevalencia de diabetes es del 9,2% en hombres y del 7,7% en mujeres (en estas ha disminuido alrededor de un punto porcentual respecto a 2011-2012, mientras que en los hombres ha aumentado casi 2 puntos porcentuales en el mismo periodo).

Para todas las enfermedades los porcentajes de personas que las padecen aumentan a medida que aumenta la edad de estas, excepto en el caso de alergias crónicas, que ocurrió lo contrario (10% en personas de 16 a 24 años y 4,3% en personas de 75 años o más).

Según la provincia en la que residía el encuestado, en Cádiz (18,7%) apareció el mayor porcentaje de personas con hipertensión y en Almería (11,4%) el menor. En el caso del colesterol alto, en Granada y Huelva (13,8%) se registró el mayor porcentaje mientras que en Málaga y Jaén el menor (10,4% y 10,5%). En Granada, Almería y Sevilla en torno al 4% de las personas declararon tener varices en las piernas frente al 1% de Cádiz. En cuanto a las alergias crónicas, en Sevilla se registró el mayor porcentaje (7,9%) mientras que en Córdoba se observó el menor porcentaje (4,5%).

Respecto al nivel de estudios de los andaluces, se cumple para todas las enfermedades crónicas (excepto alergias) que las personas con estudios primarios fueron las que en mayor porcentaje las padecieron. Destacamos las dos enfermedades más comunes. Hipertensión: un 25,6% de personas con estudios primarios, un 6,9% con estudios secundarios y un 7,2% con estudios universitarios. Colesterol alto: un 18,8% de personas con estudios primarios, un 5,4% con estudios secundarios y un 6,6% con estudios universitarios. Respecto a las enfermedades menos comunes, las varices en las piernas: un 5,6% de personas con estudios primarios, un 1,8% con estudios secundarios y universitarios; los problemas cardiacos: un 6,5% con estudios primarios, un 1,8% con estudios secundarios y universitarios.

Por nivel de ingresos, en general se observa que para todas las enfermedades (excepto alergias crónicas) la tendencia es que a mayor nivel de ingresos menor porcentaje de personas con enfermedades crónicas, excepto en la artrosis o reumatismo, donde el porcentaje de personas con ingresos superiores a los 2.500€ es igual al de personas con ingresos

Resultados

entre 1.500€-2.499€, y en la hipertensión, donde el porcentaje con ingresos superiores a los 2.500€ es ligeramente superior. En el caso de alergias crónicas se registró un 5,8% entre las personas con hasta 999€ mensuales, que fue aumentando hasta llegar al 8,8% de personas con 2.500€ mensuales o más. En cuanto a las dos enfermedades más comunes, hipertensión registró un 21,9% de personas con ingresos mensuales inferiores a 1.000€, frente al 10,4% de aquellas con ingresos entre 1.500€-2.499€ y un 11,2% con ingresos superiores a los 2.500€; respecto al colesterol alto, se encontró un 16,6% en personas con ingresos inferiores a 1.000€, en contraste con un 6,8% con ingresos superiores a los 2.500€.

Según la clase social, en las más desfavorecidas se observaron los porcentajes más altos de ciudadanos con enfermedades crónicas (a excepción de alergias crónicas). Se evidenció una diferencia de un 5,5% en hipertensión, un 2,4% en colesterol alto entre las clases más favorecidas y más desfavorecidas (enfermedades más comunes). En cuanto a varices en las piernas la diferencia es de un 1,1%, superior en las clases sociales más desfavorecidas, mientras que los problemas cardiacos son muy similares en las distintas clases sociales.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se registró un descenso en el porcentaje de personas con alergias crónicas, aunque desde 2011 no existen apenas cambios: este descenso fue superior en hombres que en mujeres (un 8,1% en 1999 y un 5% en 2015 de hombres frente a un 9,1% en 1999 y un 8% en 2015 de mujeres). Con respecto a las enfermedades más comunes en 2015 la tendencia fue la siguiente: hipertensión y colesterol alto aumentaron el porcentaje de personas que la padecían hasta 2011, descendiendo en 2015, aunque dichos valores siguen siendo superiores a 1999. Este cambio ha sido más acusado en mujeres que en hombres. En cuanto a las enfermedades menos comunes, los problemas cardiacos y las varices en las piernas, sus porcentajes de mantienen estables a lo largo de los años.

En cuanto a la edad del encuestado, se manifestaron las mismas tendencias que en el total, destacando algunas enfermedades: la artrosis o reumatismo descendió notablemente (se pasó de un 50,8% en 1999 a un 16,6% en 2015 en personas de 65 a 74 años y de un 57,6% en 1999 a un 20,7% en el grupo etario de 75 años o más); la hipertensión disminuyó notablemente de 2011 a 2015, aunque estos valores siguen siendo superiores a los del año 1999 (de 26,9% en 1999 a un 37% en 2011 y a un 27,7% en 2015 de personas de 55 a 64 años; de un 30% en 1999 a un 55% en 2011 y a un 43,9% en 2015 de personas de 65 a 74 años, y de un 33,2% en 1999 a un 63,4% en 2011 y a un 55,1% en los mayores de 75 o más años).

Según la zona geográfica de residencia, en líneas generales se observa la misma tendencia para cada enfermedad crónica. Destaca el descenso de personas con artrosis o reumatismo, padeciéndola más del 15% de las personas en las distintas provincias y disminuyendo hasta valores inferiores al 10% en 2015.

Resultados

Las personas con un nivel de estudios primarios fueron las que presentaron mayores cambios en ciertas enfermedades, como por ejemplo, la hipertensión (aumento del 10,7% respecto al año 1999) o el colesterol alto (aumento de un 8% respecto a 1999).

Se puede observar que para cada enfermedad crónica la tendencia en los porcentajes según el nivel de ingresos o clase social es similar a los porcentajes globales observados. Destacar el porcentaje de personas diabéticas o con colesterol, ya que para todos los niveles, excepto para personas con 2.500€ mensuales o más, el porcentaje en 2015 fue superior al del año 1999.

Resultados

Alergias crónicas




Ilustración 31. Prevalencia de personas con alergia crónica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 32. Prevalencia de personas con alergia crónica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Alergias crónicas




Ilustración 33. Prevalencia de personas con alergia crónica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Alergias crónicas



Ilustración 34. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 35. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 36. Prevalencia de personas con alergia crónica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Artrosis o reumatismo




Ilustración 37. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 38. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Artrosis o reumatismo




Ilustración 39. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Artrosis o reumatismo




Ilustración 40. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 41. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 42. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Colesterol




Ilustración 43. Prevalencia de personas con colesterol alto por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 44. Prevalencia de personas con colesterol alto por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 45. Prevalencia de personas con colesterol alto por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 46. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 47. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 48. Prevalencia de personas con colesterol alto por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Diabetes




Ilustración 49. Prevalencia de personas diabéticas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 50. Prevalencia de personas diabéticas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Diabetes




Ilustración 51. Prevalencia de personas diabéticas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Diabetes




Ilustración 52. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 53. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 54. Prevalencia de personas diabéticas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Hipertensión




Ilustración 55. Prevalencia de personas hipertensas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 56. Prevalencia de personas hipertensas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Hipertensión




Ilustración 57. Prevalencia de personas hipertensas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Hipertensión




Ilustración 58. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 59. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 60. Prevalencia de personas hipertensas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Problemas de nervios




Ilustración 61. Prevalencia de personas con problemas de nervios por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 62. Prevalencia de personas con problemas de nervios por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Problemas de nervios




Ilustración 63. Prevalencia de personas con problemas de nervios por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Problemas de nervios




Ilustración 64. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 65. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 66. Prevalencia de personas con problemas de nervios por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Problemas cardíacos




Ilustración 67. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 68. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Problemas cardíacos




Ilustración 69. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Problemas cardíacos




Ilustración 70. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Problemas cardíacos




Ilustración 71. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Problemas cardíacos




Ilustración 72. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Varices en las piernas




Ilustración 73. Prevalencia de personas con varices en las piernas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 74. Prevalencia de personas con varices en las piernas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Varices en las piernas




Ilustración 75. Prevalencia de personas con varices en las piernas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Varices en las piernas




Ilustración 76. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Varices en las piernas



Ilustración 77. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Varices en las piernas




Ilustración 78. Prevalencia de personas con varices en las piernas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas

El estudio de las limitaciones de la población residente en Andalucía se ha orientado tanto a las personas que tienen cualquier limitación física como a aquellas en las que dicha limitación es de tipo sensorial o psíquica.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el año 2015 las limitaciones más frecuentes fueron las de tipo físico (3,6% de los residentes andaluces), mientras que el porcentaje de personas con limitaciones sensoriales o psíquicas resultó ser pequeño (0,5% y 0,3%, respectivamente). En el caso de limitación física, las mujeres (3,7%) tuvieron un porcentaje similar a los hombres (3,5%), mientras que en la sensorial esa diferencia fue, en términos relativos, superior (0,6% de hombres y 0,3% de mujeres), aunque los porcentajes en términos absolutos fueron pequeños, y apenas se observaron diferencias por sexo en la limitación psíquica.

En relación con la edad del encuestado, se observó un aumento general progresivo en las limitaciones a medida que aumentaba la edad. Aunque en el caso de las limitaciones físicas o psíquicas, entre los 65 y 74 años, el porcentaje de personas es algo menor que en los grupos de edad anterior y posterior a éste.

Por provincias, se observa un 5,1% de personas con limitación física en Granada, donde se encontró el mayor porcentaje, mientras que en Córdoba fue del 1,6%, con el menor porcentaje de personas con limitación física. Huelva y Almería fueron las provincias con mayor frecuencia relativa de personas con limitación psíquica (0,7% en ambas provincias), y en Cádiz donde menos con un 0,0%. Por último, en la provincia de Málaga (0,7%) se observó el mayor porcentaje de personas con limitación sensorial, obteniéndose el menor porcentaje en las provincias de Cádiz y Córdoba, con un 0,3%.

Según el nivel social, económico y cultural de los andaluces se constató que a mayor nivel de estudios, de ingresos y de clase social, menor fue el porcentaje de personas en las distintas limitaciones.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la prevalencia de personas con limitaciones física, sensorial y psíquica se muestra de forma diferente según el tipo de limitación.

Resultados

El número de personas con limitación física decreció hasta 2007, aumentando en 2011 y alcanzando valores en 2015 inferiores a los del año 1999, comportándose de forma muy similar en ambos sexos. En los almerienses y en los mayores de 65 años se observó el mayor descenso en el porcentaje de personas con limitación física. Según el nivel socioeconómico, entre las personas con el nivel inferior se siguen observando los mayores porcentajes de limitación, aunque sobresale el hecho de que el porcentaje sigue siendo inferior al observado en 1999.

Respecto a los ciudadanos que tenían alguna limitación psíquica, en 2003 se registraron porcentajes inferiores a 1999 y se mantuvo prácticamente constante desde entonces hasta 2015, cuando se volvió a incrementar hasta alcanzar los mismos porcentajes que en 1999. No se encontraron apenas diferencias entre hombres y mujeres. Por edad, en los andaluces menores de 55 años y en los de 75 o más años se apreció un descenso en los últimos años, mientras que en el resto de grupos de edad ocurre lo contrario. En cuanto a la zona geográfica, Almería y Córdoba experimentaron mayores cambios (aumento y disminución de los porcentajes) a lo largo de los años. Según el nivel de estudios, en las personas con estudios primarios disminuyó el porcentaje en 2015, pero seguía siendo superior al de 1999. Tendencia similar ocurrió entre las personas con estudios secundarios. Por nivel de ingresos, tendieron a descender con los años, descenso más acusado entre las personas con ingresos inferiores a 1.000€ y en las clases sociales más desfavorecidas.

Por último, el porcentaje de personas con limitación sensorial fue menor en 2003, aumentando en el año 2007, a partir del cual se mantuvo constante hasta 2011, donde comenzó a descender hasta 2015 (con valores inferiores a los del año 1999). La tendencia entre las mujeres fue similar a la tendencia general descrita, mientras que entre los hombres se mantuvo una tendencia decreciente a lo largo de los años hasta el año 2015. En los diferentes rangos de edad, el porcentaje de personas con limitación sensorial desciende, siendo mayor el cambio en los extremos (16 a 24 años y 75 o más años). Según la provincia de procedencia, en general, desciende en el porcentaje de personas con limitación sensorial, exceptuando Málaga, que desde 2011 (0,7%) se mantiene constante, y Granada, donde se ha duplicado desde 2011 (0,3% en 2011 y 0,6% en 2015). Según el nivel socioeconómico, se produjo la misma tendencia general, experimentando mayores cambios las personas con menor nivel sociocultural (menor nivel de estudios, de ingresos y clases sociales más desfavorecidas).

Resultados

Limitaciones físicas



Ilustración 79. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 80. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 81. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.



Ilustración 82. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 83. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados



Ilustración 84. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Limitaciones sensoriales




Ilustración 85. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 86. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Limitaciones sensoriales




Ilustración 87. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitaciones sensoriales




Ilustración 88. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Limitaciones sensoriales




Ilustración 89. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Limitaciones sensoriales




Ilustración 90. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Limitaciones psíquicas



Ilustración 91. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 92. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 93. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.



Ilustración 94. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados



Ilustración 95. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 96. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Hogares con personas con alguna limitación física, sensorial o psíquica




Ilustración 97. Porcentaje de hogares con algún miembro que padezca alguna limitación física, sensorial o psíquica. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Autonomía personal

La autonomía de la población residente en Andalucía se estudió mediante la identificación del porcentaje de personas que tenía alguna dificultad para realizar actividades cotidianas tanto de tipo básico como instrumental. Para ello, a las personas entrevistadas se les preguntó si en ese momento su salud les limitaba para el desempeño de actividades que conllevaran esfuerzos físicos moderados y otras actividades cotidianas.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 las limitaciones de tipo instrumental fueron las más frecuentes en cuanto a la reducción de la autonomía individual de la población (el 28,2% frente al 18,3% de personas con limitaciones de tipo básico). En ambos casos la limitación fue mayor en las mujeres que en los hombres. Para los dos tipos de limitaciones, la edad es un factor determinante, pues al avanzar la edad del entrevistado los porcentajes fueron incrementándose (del 16,3% de personas entre 65 y 74 años al 41,6% en las de 75 o más años, en el tipo instrumental; 9,6% de personas entre 65 y 74 años a 28,2% en las de 75 o más años, en el tipo básico).

Por provincia de residencia del encuestado, también hubo un mayor porcentaje de personas con limitaciones de tipo instrumental que con limitaciones de tipo básico. La provincia con mayor porcentaje de ambas limitaciones fue Almería, con un 37,6% en dificultad tipo instrumental y un 34,1% en el tipo básico. El menor porcentaje de ambos tipos se dio en Córdoba (22,7% en instrumental y 11,3% en básico).

Un mayor porcentaje de personas con menor nivel de estudios, ingresos inferiores a los 1.000€ y clases sociales más desfavorecidas tienen dificultades tanto de tipo instrumental como básicas (porcentajes también superiores en el caso de las dificultades de tipo instrumental). Las personas con ingresos superiores a los 2.500€ tuvieron el segundo porcentaje más alto en limitaciones instrumentales, seguidos de las personas con ingresos entre 1.000€ y 1.499€, y por último las personas con ingresos entre 1.500€ y 2.499€. Sin embargo, en las limitaciones básicas existía una tendencia decreciente en relación al aumento de los ingresos. Por clase social, en las clases más favorecidas se registró el menor porcentaje de personas con dificultades de tipo instrumental o básicas.

Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003

Desde el año 2003 se observa aumentos y disminuciones en el porcentaje de personas con limitación de la autonomía personal: en líneas generales se registraron los valores más bajos en el año 2015, de forma más acusada en el caso de limitaciones instrumentales, tanto en hombres como en mujeres, exceptuando el caso de limitación básica en mujeres, donde es ligeramente superior al de 2007. Con respecto a la edad el comportamiento es similar al comportamiento general de la población.

Resultados

En las distintas provincias, los residentes con limitación básica o instrumental registraron, en general, sus valores máximos en 2011. Aunque en 2015 los porcentajes suelen ser menores respecto a 2011, son superiores a los porcentajes de 2003. En el caso de limitaciones de tipo básico, las provincias de Málaga y Jaén obtienen sus valores más altos en 2015, y la provincia de Granada, donde en 2015 ha aumentado el porcentaje de personas con limitación básica respecto a 2011 aunque es inferior al porcentaje de 2003. Respecto a las limitaciones instrumentales, las provincias de Jaén, Málaga y Sevilla mantienen constantes sus porcentajes a lo largo de los años.

Según el nivel de estudios del entrevistado, la evolución del porcentaje de ciudadanos con limitaciones de tipo instrumental siguió un patrón variable. Para los que tenían estudios primarios se produjo un descenso de los porcentajes en 2007, aumentó en 2011 y descendió en 2015, obteniéndose en este último año los valores más altos. Para la población con estudios universitarios ocurrió al contrario, y para las personas con nivel de estudios secundarios aumentó el porcentaje de personas con este tipo de limitaciones hasta 2011, descendiendo posteriormente en 2015. En cuanto a las limitaciones de tipo básico, se produjo en todos los niveles un descenso en 2007, un aumento en 2011 y volvió a descender en 2015 (resultado superior al observado el año 2003).

En lo referente al nivel de ingresos, el número de personas con dificultades de tipo instrumental o básico registraron sus valores máximos en 2011, descendiendo en 2015, aunque fueron superiores a los años anteriores a 2011. En las personas con ingresos entre 1.500€ y 2.499€ aumentó el porcentaje en las limitaciones básicas.

En cuanto a la clase social del entrevistado, se vuelve a repetir la tendencia descrita en el nivel de ingresos, excepto en el caso de la clase social III, donde la tendencia a aumentar el porcentaje con limitaciones básicas ocurre desde el año 2007.

Resultados

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental




Ilustración 98. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 99. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental




Ilustración 100. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental




Ilustración 101. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental




Ilustración 102. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental




Ilustración 103. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico




Ilustración 104. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 105. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico




Ilustración 106. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico




Ilustración 107. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico




Ilustración 108. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico




Ilustración 109. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Accidentes en los últimos tres meses

Entre las personas que declararon haber sufrido en el último año algún accidente que les causara heridas o lesiones suficientes que limitaran la actividad normal o que requiriesen asistencia sanitaria se identificó cuál era el porcentaje que correspondía a accidentes en los tres meses previos a la realización de la entrevista.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 44,9% de la población residente en Andalucía tuvo un accidente en los tres meses previos a la encuesta, que se produjeron principalmente en el hogar. Dichos accidentes fueron similares en frecuencia en los hombres (45,1%) y en las mujeres (44,8%). En cuanto a la edad del entrevistado, la tendencia observada era que conforme aumentaba la edad mayor era el porcentaje de accidentes (35% de personas entre 16 y 24 años frente al 55,1% de personas de 75 años o más).

Según la provincia de residencia del encuestado, Jaén (62,3%) fue la provincia en la que se produjeron más accidentes en los últimos tres meses, en contraste con la provincia de Málaga (24,5%), que registró el menor porcentaje de accidentes de Andalucía.

Las personas con nivel de estudios primarios fueron las que sufrieron más accidentes (51,6%), y las que tenían estudios secundarios fueron las que presentaron menor porcentaje de accidentes en los tres meses previos a la realización de la entrevista (34,2%).

Los andaluces con un nivel de ingresos inferior a 1.000€ mensuales y clases sociales más desfavorecidas son los que sufrieron más accidentes (53,2%); los que tuvieron menos accidentes fueron los de clase social III e ingresos entre 1.000€ y 1.499€ .

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 2007 el porcentaje de accidentes fue disminuyendo hasta llegar a un 35,6% en 2011, volviendo a aumentar en 2015 (44,9%). En los últimos años los hombres tienen cada vez más accidentes, mientras que en las mujeres ocurre lo contrario. Con respecto a la edad del entrevistado, la tendencia es igual a la anteriormente descrita de carácter general en todos los grupos de edades. Destaca el gran aumento en el grupo etario de 75 o más años, que tiene un 20% más de accidentes en 2015 respecto al año 2011.

En el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2011, se observó un descenso en el porcentaje de accidentes en Andalucía, a partir del cual aumentó en todas las provincias, excepto en Málaga y Almería, donde disminuyó.

Resultados

En todos los niveles de estudios hubo un descenso del porcentaje de accidentados en los tres meses previos a la realización de la entrevista, excepto en aquellos con estudios primarios o secundarios, en los que se dio un mayor porcentaje desde 2011: el cambio es más acentuado en los que solo tenían estudios primarios (36,4% en 2011 y 51,6% en 2015).

En lo referente al nivel de ingresos, las personas con ingresos mensuales entre 1.000€ y 1.499€ o con ingresos superiores a los 2.500€ tuvieron en menor porcentaje accidentes en el año 2015, con respecto al 2011, reduciéndose un 26%. Por el contrario en personas con ingresos inferiores a los 1.000€ o entre 1.500€ y 2.499€ aumentó el porcentaje de accidentes: aumento superior en el grupo con ingresos inferiores a 1.000€ (30,5% en 2011 y 53,2% en 2015).

En todas las clases sociales hubo una disminución en el periodo 2007-2011. Entre 2011 y 2015, aumentó el porcentaje de personas con accidentes en las clases sociales media y más desfavorecidas (aumento en torno al 12%), y disminuyó casi un 4% en las clases sociales más elevadas.

Desde 1999 se produjo un descenso de accidentes en casa hasta 2007. En 2011 se registró el porcentaje más alto de accidentes ocurridos en casa, descendiendo de nuevo en 2015. En cuanto a los accidentes en el trabajo han experimentado tanto aumentos como disminuciones a lo largo de los años: en 2003 fue el año donde se registró el mayor porcentaje de accidentes laborales y en 2015 el menor (24,3% y 11,6%, respectivamente). Finalmente los accidentes de tráfico tendieron a aumentar hasta el año 2007, cuando comenzaron a descender hasta la actualidad.

Resultados

Accidentes en los últimos tres meses




Ilustración 110. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Accidentes en los últimos tres meses




Ilustración 111. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 112. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 113. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 114. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 115. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Accidentes en los últimos tres meses: Lugar del accidente




Ilustración 116. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en casa, en el centro de trabajo o de tráfico. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Bloque II: DETERMINANTES DE LA SALUD

Consumo de alcohol: Frecuencia de consumo

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 45,7% de los residentes andaluces mayores de 16 años consumió alcohol al menos una vez al mes: superior el porcentaje de hombres (58,8%) al de mujeres (33,1%).

A medida que aumentaba el grupo etario disminuía el porcentaje de personas que consumía alcohol (52,8% para los jóvenes de 16 a 24 años, decreciendo hasta el 22,6% para mayores de 75 años).

Según la provincia, Jaén (55,7%) obtuvo el mayor porcentaje que consumió bebidas alcohólicas al menos una vez al mes y Huelva (30,1%) el menor porcentaje.

Cuanto mayor es el nivel de estudios, el nivel de ingresos y la clase social de los residentes andaluces más elevado es el porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas al menos una vez al mes.

Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003

En líneas generales, ha aumentado la población residente en Andalucía que consume alcohol al menos una vez al mes (38,8% en 2003 y 45,7% en 2015). El aumento de consumo de bebidas alcohólicas al menos una vez al mes se produce en las mujeres (29,4% en 2003 y 33,1% en 2015), ya que en los hombres se reduce (un 1,1%).

Todas las edades experimentan un aumento en el porcentaje de personas que consumieron al menos una vez al mes alcohol en los últimos años. Éste crecimiento es más acusado en personas mayores de 55 años, donde aumenta en torno al 6%.

Desde 2003, se observan en las distintas provincias aumentos y disminuciones de los porcentajes de personas que consumieron alcohol al menos una vez al mes, exceptuando Córdoba, donde dichos porcentajes han ido en aumento desde entonces. En Almería, Cádiz y Huelva los porcentajes disminuyeron en 2007 pero aumentaron a partir de 2011. Granada, Jaén y Sevilla tuvieron un comportamiento similar entre sí, donde hasta 2007 fue cada vez mayor el porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes; en 2011 se redujo dicho porcentaje, volviendo a subir en

Resultados

2015. En Málaga se redujo hasta 2007 el porcentaje de personas que declararon consumir alcohol al menos una vez al mes, y después hasta 2015 el porcentaje se incrementó.

Según el nivel socioeconómico, se encuentran porcentajes muy similares a 2011, excepto en personas con ingresos superiores a 1.500€, donde el consumo de alcohol (al menos una vez al mes) se ha elevado alrededor del 6% y en torno al 3% en clases sociales media y más altas.

Resultados

Consumo de alcohol al menos una vez al mes




Ilustración 117. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Consumo de alcohol al menos una vez al mes




Ilustración 118. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Consumo de alcohol al menos una vez al mes




Ilustración 119. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Consumo de alcohol al menos una vez al mes



Ilustración 120. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Consumo de alcohol al menos una vez al mes




Ilustración 121. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.

Consumo de alcohol al menos una vez al mes




Ilustración 122. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Consumo de alcohol: Edad de inicio al consumo de alcohol

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, la edad media de inicio al consumo de alcohol fue de 17,5 años: más tardía para las mujeres (18,4 años) que para los hombres (17 años). Los jóvenes de 16 a 24 años comenzaron a beber a una edad más precoz (16,3 años) que los de edad superior (18,6 años de media para mayores de 75 años).

En la provincia de Huelva (16,5 años de media) es donde se declaró que se comenzaba a beber más prematuramente, y en Granada más tardíamente, con una edad media de comienzo de 19,4 años.

En el marco socioeconómico, no se encontraron diferencias importantes según el nivel de estudios, ingresos o clase social.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la edad media de inicio al consumo de alcohol desde 1999 ha sufrido un pequeño descenso: la edad media en 1999 fue de 18,3 años y en 2015 de 17,5 años. Éste leve descenso se ha producido por igual en todos los grupos de edad, provincias, nivel de estudios y clase social, aunque de 2007 a 2011 hubo un pequeño aumento.

Los granadinos empiezan a beber un año más tarde, mientras que en el resto de las provincias se mantiene o se reduce la edad media de comienzo a beber.

Resultados




Ilustración 123. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 124. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Edad media a la que empezó a beber




Ilustración 125. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Edad media a la que empezó a beber



Ilustración 126. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Edad media a la que empezó a beber



Ilustración 127. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Edad media a la que empezó a beber




Ilustración 128. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Consumo de alcohol: Sospecha de alcoholismo

Una vez que se preguntó si la persona bebía alcohol de manera habitual, la edad de inicio y la frecuencia y las cantidades consumidas, se realizaron otra serie de preguntas relacionadas con la actitud ante el consumo de alcohol, pertenecientes al test CAGE. Se consideró sospecha de alcoholismo los casos en los que al menos una de las cuatro preguntas realizadas tenía respuesta afirmativa.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 2,8% de la población residente en Andalucía mayor de 16 años se consideraba que era sospechoso de alcoholismo: los hombres (4,3%) presentaban un mayor porcentaje respecto a las mujeres (1,4%).

Los más jóvenes (16 a 24 años) obtuvieron el porcentaje más alto en sospecha de alcoholismo, reduciéndose dicho porcentaje cuanto mayor era la edad (grupo etario).

En Almería (7%) fue donde se encontró el porcentaje más alto de sospecha de alcoholismo, y en Sevilla el menor (1,7%).

Las personas con mayor nivel de estudios (estudios universitarios), ingresos y clase social superior obtuvieron el mayor porcentaje de sospecha de alcoholismo.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En los últimos años, en general, el porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo se ha reducido (5% en 1999 y 2,8% en 2015). En el caso de las mujeres desde 2007 el porcentaje ha aumentado (0,6% en 2007 y 1,4% en 2015) aunque es menor que en 1999 (1,8%).

En los últimos cuatro años el porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo ha aumentado para las personas con edades comprendidas entre los 55 y 64 años y para mayores de 75 años (aunque estos porcentajes son inferiores a los de 1999).

Almería destaca por haber reducido un 4,3% el porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo, mientras que Málaga y Jaén experimentaron un aumento del 2,7% y del 0,8%, respectivamente (porcentajes, asimismo, inferiores a los de 1999).

Los porcentajes de personas con sospecha de alcoholismo con nivel de estudios primarios y secundarios con ingresos inferiores a los 1.000€ tienen un comportamiento similar (disminuyó el porcentaje hasta 2007, aumentó hasta 2011 y volvió a disminuir en 2015). En las personas con estudios universitarios, con ingresos entre 1.000€ y 1.499€ o superiores

Resultados

a los 2.500€, y en aquellos pertenecientes a las clases media y alta, el porcentaje con sospecha de alcoholismo disminuyó hasta 2007 y aumentó ligeramente hasta 2015.

Sospecha de alcoholismo



Ilustración 129. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Sospecha de alcoholismo




Ilustración 130. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Sospecha de alcoholismo




Ilustración 131. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Sospecha de alcoholismo



Ilustración 132. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Sospecha de alcoholismo




Ilustración 133. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Sospecha de alcoholismo




Ilustración 134. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Consumo de tabaco: Frecuencia de consumo

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015.2016, el 27,9% de la población andaluza mayor de 16 años manifestó consumir tabaco a diario: mayor para los hombres (31,4%) que para las mujeres (24,6%). Por edad, el 37,1% de la población entre 45 y 54 años fumaba tabaco a diario, seguidos de la población entre 25 y 44 años (35,3%) y el 27,4 de entre 16 y 24 años. Los porcentajes disminuyeron a partir de los 55 años, hasta alcanzar el 4,5% de la población mayor de 75 años.

En la provincia de Cádiz se encuentra el porcentaje más alto que declaró fumar a diario (32,4%), y en Málaga el porcentaje mínimo (24,4%).

Según el nivel de estudios, el 32,2% de la población con estudios secundarios afirmó consumir tabaco a diario, seguidos de las personas con estudios primarios (27,3%) y, en última posición, las personas con estudios universitarios (19,8%).

Por nivel de ingresos, el 30,7% de la población con renta inferior a 1.000€ declaró consumir tabaco a diario, seguidos de la población con renta entre 1.000€ y 1.499€ (29,1%). Los porcentajes menores (26%) se dieron en las rentas superiores a 1.500€.

Las personas que más fuman a diario pertenecían a la clase social más desfavorecida (33,3%), frente al 18,3% en las clases sociales superiores.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 a 2007, la población residente en Andalucía que consumió tabaco a diario mantuvo los valores en torno al 31%; en 2015 este porcentaje ha disminuido (27,9%).

Ha descendido el porcentaje de hombres que fuma a diario desde 1999, mientras y destacar que ha habido un aumento progresivo de mujeres que fumaban a diario, aunque a partir de 2011 empezó a disminuir (25,2% en 2011 y 24,6% en 2015). Según la edad, encontramos un descenso en el porcentaje de personas que fumaban a diario en los menores de 65 años: en el grupo de edad de 25 a 44 años se ha producido el mayor descenso (45,1% en 1999 y 35,3% en 2015).

En Málaga, Almería, Córdoba, Sevilla y Huelva ha descendido notablemente el porcentaje de personas que consumían tabaco a diario. En el resto de provincias ha aumentado el consumo de tabaco a diario.

Por el nivel de estudios, en los últimos años descendieron los porcentajes de las personas que declararon fumar a diario en los diferentes grupos. El mayor descenso se ha producido en el de estudios universitarios (32,1% en 1999 y 19,8% en 2015) y el menor en personas con estudios primarios.

Las personas con rentas menores de 999€ son las que fumaban a diario con mayor frecuencia (30,7%), disminuyendo este porcentaje en los últimos años para las personas con nivel de ingresos superiores a 1.000€. En los últimos 4 años

Resultados

en todas las clases sociales se ha constatado una disminución del porcentaje de fumadores a diario, aunque el mayor descenso se ha dado en las clases superiores.

Resultados




Ilustración 135. Prevalencia de personas que fuman a diario por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 136. Prevalencia de personas que fuman a diario por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 137. Prevalencia de personas que fuman a diario por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 138. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 139. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 140. Prevalencia de personas que fuman a diario por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Consumo de tabaco: Edad media de inicio al consumo de tabaco

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, la edad media de inicio al consumo de tabaco fue de 17 años: un poco más elevada para las mujeres (17,6 años) que para los hombres (16,4 años). La media asciende según aumenta el grupo etario: 15,6 años de media para los jóvenes de 16 a 24 años y en torno a los 17 años de media para las personas de 65 a 74 años.

Jaén (17,5 años) es donde más tarde se comienza a fumar, y Cádiz, Almería y Málaga (16,7 años) las provincias donde antes se comienza a fumar.

Los que más prematuramente se inician en el consumo de tabaco son aquellos ciudadanos con estudios primarios o secundarios (16,9 años), con ingresos inferiores a 1.500€ (16,9 años) y de clase social más desfavorecida (16,8 años).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la edad media de inicio al consumo desde 1999 ha sufrido un pequeño descenso hasta 2011: en 1999 fue de 17,1 años pero en 2015 vuelve a tener valores similares a 1999. Estos cambios se han producido por igual en hombres y mujeres.

Los menores de 25 años siguen siendo los más precoces para empezar a fumar (15,6 años): ha disminuido la edad media de comienzo a fumar.

En Granada y Almería se aprecia un descenso de la edad de inicio a consumir tabaco, mientras que en el resto de provincias ha habido un ligero aumento. Córdoba, Granada y Sevilla fueron las provincias con la media más alta.

Según el nivel socioeconómico, hasta 2011 no hubo muchos cambios, excepto en personas con ingresos superiores a 1.500€ y de clase media, donde la edad de inicio a fumar aumentó ligeramente. En cambio, en los últimos cuatro años se aprecia un descenso de la edad media de inicio a fumar en personas con ingresos superiores a 2.500€, con estudios universitarios y pertenecientes a las clases sociales más altas, siendo muy similares los porcentajes a años anteriores.

Resultados




Ilustración 141. Edad media de inicio al consumo de tabaco por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 142. Edad media de inicio al consumo de tabaco por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Edad media a la que empezó a fumar




Ilustración 143. Edad media de inicio al consumo de tabaco por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Edad media a la que empezó a fumar



Ilustración 144. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Edad media a la que empezó a fumar



Ilustración 145. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Edad media a la que empezó a fumar




Ilustración 146. Edad media de inicio al consumo de tabaco por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015

Resultados

Consumo de tabaco: Actitud ante el tabaquismo

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 43,5% de la población residente en Andalucía mayor de 16 años indicó haber intentado dejar de fumar en alguna ocasión: el 44,2% de las mujeres y el 43% de los hombres. Este porcentaje fue superior para las personas mayores de 75 años (54,3%) y con edades comprendidas entre 55 y 64 años (52,2%); los más jóvenes fueron los que menos lo intentaron (30% de 16 a 24 años).

Almería (60,7%) fue la provincia donde existió un mayor porcentaje de personas que habían intentado dejar de fumar alguna vez; en Cádiz el menor porcentaje.

Por nivel de estudios, el 44,1% de las personas con estudios universitarios se habían planteado dejar el tabaco en alguna ocasión, seguidos de las personas con estudios secundarios (43,8%) y estudios primarios (43,1%).

Según el nivel de ingresos, las personas con ingresos superiores a 2.500€ mensuales fueron quienes intentaron dejar el consumo de tabaco en alguna ocasión en mayor proporción (58,3%). Le siguen las personas con ingresos entre 1.500€ y 2.499€ mensuales (47,6%). Los que menos fueron aquellos con ingresos inferiores a 1.499€ (alrededor del 40%).

Los andaluces de clases sociales más altas obtuvieron el porcentaje mayor que intentó dejar de fumar (57,3%), seguidos de la clase social III (47,7%) y las clases sociales más desfavorecidas (43,5%).

Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003

Desde 2003 hubo un descenso del porcentaje de personas que se plantearon dejar de fumar en alguna ocasión hasta el 2007; luego aumentó un 15% hasta 2011, y en los últimos cuatro años de nuevo desciende en torno al 5. Entre 2007 y 2011 las mujeres fueron las que experimentaron un mayor aumento. En 2015 la tendencia a intentar dejar de fumar es menor tanto para hombres como para mujeres, destacando las mujeres con un descenso alrededor del 7%, frente al 2,4% que experimentan los hombres.

En los menores de 64 años se ha observado que el porcentaje que intenta dejar de fumar es menor, excepto en el intervalo de 2007 a 2011, donde es superior. Entre los 55 y 64 años se mantiene dicho porcentaje.

Almería fue en donde más aumentó, llegando a triplicarse hasta 2011, aunque ha descendido en estos últimos años. En el resto de provincias el comportamiento es muy similar, destacando Cádiz: en los últimos cuatro años dicho porcentaje se ha reducido a la mitad.

Según el nivel socioeconómico, el porcentaje que se planteó dejar de fumar aumentó considerablemente entre 2007 y 2011, sin que se encontraran diferencias respecto al nivel de estudios, ingresos o clase social. En los últimos cuatro

Resultados

años, en personas con estudios secundarios o inferiores, con ingresos inferiores a 1.499€ y pertenecientes a la clases sociales media y más desfavorecidas ha descendido el porcentaje de los que han intentado dejar de fumar. El porcentaje de personas que intentan dejar de fumar sigue aumentando desde 2007 en aquellas con estudios universitarios, con ingresos superiores a 1.500€ y pertenecientes a las clases sociales superiores.

Resultados




Ilustración 147. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 148. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 149. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 150. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados




Ilustración 151. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 152. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Alimentación:

Para estudiar los hábitos alimenticios se les pidió a las personas encuestadas que dijeran la frecuencia con la que consumían una serie de alimentos, recogidos en una tarjeta que los encuestadores les mostraba. La información que a continuación se expone se refiere al porcentaje de personas que en el año 2015 declararon tomar –al menos tres veces por semana- lácteos, fruta fresca y verdura.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, un 93% de las personas mayores de 16 años declaró consumir productos lácteos, un 81,8% que consumió fruta fresca y un 72,6% que tomó verduras y hortalizas, al menos tres veces por semana. Este porcentaje fue superior para las mujeres (93,9% productos lácteos, 83% fruta fresca y 77% verduras y hortalizas) que para los hombres (92% productos lácteos, 80,6% fruta fresca y 70,6% verduras y hortalizas).

En el consumo de productos lácteos, las personas mayores de 65 años fueron quienes los consumieron en mayor proporción (95,3% de 65 a 74 años y 96,2% mayores de 75 años). Este porcentaje se encontraba entre el 91% y 93% para el resto de las edades. A medida que aumentaba el grupo etario el consumo de fruta fresca, hortalizas y verduras fue mayor.

Según la provincia, la leche y sus derivados son consumidos en una proporción mayor del 97% en Córdoba, Huelva y Sevilla: el resto de las provincias oscilan entre el 87% y 92%. En la provincia de Huelva (92,9%) se consume más fruta fresca y en Almería mayor proporción de verduras y hortalizas; en Jaén se encontró el porcentaje menor de consumo de fruta, verduras y hortalizas (63,5% fruta fresca y 56,9% verduras y hortalizas).

En función del nivel de estudios, en los porcentajes de personas que consumieron productos lácteos no se encontraron diferencias (en torno al 93%), pero sí en el consumo de fruta fresca, donde aquellos con estudios primarios (84,8%) la consumieron en mayor cantidad, y los de estudios secundarios (77,5%) en menor cantidad. El mayor porcentaje de personas que consumen verduras y hortalizas se dio en los universitarios (80%). Considerando el nivel de ingresos, los residentes en Andalucía con ingresos superiores a 2.500€ (94,1%) son los mayores consumidores de leche y sus derivados, aunque no muy alejados del resto, que se situaron entre un 92% y 93%. A mayor nivel de ingresos, menor consumo de fruta fresca, verduras y hortalizas. En las distintas clases sociales no se encontraron diferencias respecto al consumo de productos lácteos, fruta fresca, verduras y hortalizas, exceptuando a las clases sociales más desfavorecidas (81,1% fruta fresca y 74,2% verduras y hortalizas), que consumieron en menor proporción fruta fresca, verduras y hortalizas.

Resultados

Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En líneas generales, la proporción de personas que consumen verdura, hortalizas y fruta fresca al menos tres veces por semana aumentó hasta 2011, donde empieza a descender ligeramente. Estos cambios se dieron tanto en hombres como en mujeres, exceptuando el consumo de verduras en los hombres, que se elevó ligeramente. Por el contrario, el consumo de leche y derivados mantuvo sus valores sin apenas cambios desde 2007, tanto para hombres como para mujeres.

Con respecto a la edad (grupo etario), el consumo de leche y sus derivados prácticamente no ha variado desde 2007; sin embargo el porcentaje de residentes en Andalucía que consume fruta, verdura y hortalizas experimentó un aumento hasta el año 2011: después comenzó a descender ligeramente. Estos cambios son más acusados en los menores de 55 años -en el caso de la fruta-, y, como excepción, en el porcentaje de consumo de verdura hay un leve descenso en los grupos de 16 a 24 años y de 55 a 64 años.

Huelva y Sevilla son las provincias donde se mantiene la tendencia de aumento del porcentaje de personas que consumen productos lácteos, fruta, verdura y hortalizas. El consumo de fruta fresca en Málaga aumentó hasta 2011 y en 2015 disminuyó un 12%, al igual que ocurrió en Jaén con el consumo de verduras y hortalizas, que descendió en un 20,6%.

En el ámbito socioeconómico, en el consumo de productos lácteos no hubo cambios notables, exceptuando la clase social media donde se observó un ligero descenso. Hasta 2011 el consumo de fruta fresca se elevó, descendió en 2015: el mayor descenso se produjo en personas con nivel de ingresos superior a los 1.000€. Respecto al consumo de verdura y hortalizas, descendió en mayor proporción en las personas con nivel de estudios secundarios o universitarios, en las de un nivel de ingresos menor de 1.000€ o superior a los 2.500€.

Resultados

Consumo de lácteos




Ilustración 153. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 154. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 155. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 156. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 157. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 158. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consumo de fruta fresca




Ilustración 159. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 160. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 161. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 162. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 163. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 164. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consumo de verdura




Ilustración 165. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 166. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consumo de verduras y hortalizas




Ilustración 167. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Consumo de verduras y hortalizas




Ilustración 168. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consumo de verduras y hortalizas




Ilustración 169. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Consumo de verduras y hortalizas




Ilustración 170. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Peso corporal: Sobrepeso y obesidad

A partir de los datos declarados por las personas encuestadas sobre su altura y peso se calculó el Índice de Masa Corporal, el cual posibilita identificar a las personas que tienen peso insuficiente, normal, sobrepeso u obesidad. Los datos que a continuación se presentan corresponden al conjunto de población identificado con sobrepeso y obesidad.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 56,1% de la población mayor de 16 años tenía un peso superior al normal (exceso de peso: sobrepeso u obesidad): superior en los hombres (60,9%) que en las mujeres (51,4%).

A medida que aumenta la edad (grupo etario), aumentaba el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad (exceso de peso). El 24,3% de los jóvenes de 16 a 24 años tenía sobrepeso u obesidad. La población de 65 a 74 años registró un 77,9% de personas con un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad), y un 75,8% de las personas mayores de 75 años.

La provincia de Huelva (62,9%) fue donde hubo mayor porcentaje de personas con exceso de peso en Andalucía y Málaga (49%) donde se registró menor proporción de personas con un peso superior al normal.

En el ámbito socioeconómico, a medida que aumentaba el nivel de estudios, de ingresos o de clase social, disminuía la prevalencia de personas con sobrepeso u obesidad. Concretamente, hubo un 68,1% de personas con estudios primarios, 61,9% rentas inferiores a 999€ y 59,1% de personas pertenecientes a la clase social más desfavorecida con un peso superior al normal, es decir, con sobrepeso u obesidad.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, hasta 2011 se incrementó el porcentaje de la población residente en Andalucía mayor de 16 años con un peso superior al normal (exceso de peso: sobrepeso u obesidad) pero en los últimos cuatro años este porcentaje ha disminuido. Estos cambios se produjeron se produce en la misma medida para hombres y mujeres.

Según la edad, hasta el años 2011 el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad aumentó en menores de 25 años (y mayores de 16 años) y mayores de 75 años, siendo este porcentaje más bajo en 2015. En los grupos de edad comprendidos entre los 25 y 75 años, de 1999 a 2015 se han experimentado altibajos en los porcentajes de exceso de peso. Sin embargo, en estos últimos años se ha reducido.

En los últimos años el porcentaje de personas con peso superior al normal (sobrepeso u obesidad) ha disminuido en la mayoría de las provincias, donde destacan Jaén y Málaga, con un descenso de entre el 11% y 13%. Mientras que en Sevilla, Huelva y Cádiz aumentó dicho porcentaje.

Resultados

Según el nivel socioeconómico, el porcentaje de personas con obesidad o sobrepeso ha disminuido principalmente en personas con estudios secundarios o universitarios, con ingresos superiores a 1.000€ y pertenecientes a la clase social media o alta.

Resultados

Sobrepeso y obesidad




Ilustración 171. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Sobrepeso y obesidad




Ilustración 172. Porcentaje de trabajadoras con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 173. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 174. Porcentaje de con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 175. Porcentaje de con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 176. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior al normal (sobrepeso más obesidad) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Actividad física

Para estudiar la actividad física de las personas encuestadas se les pidió que dijeran qué tipo de ejercicio físico implicaba su trabajo o actividad habitual y cuál era el ejercicio que practicaban en el tiempo libre.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo 2015-2016, el 89% de la población estudiada indicó tener una actividad física habitual o trabajo sedentario, entendiendo éste como aquel que se realiza sentado o de pie sin realizar esfuerzos; siendo más frecuente esta actividad sedentaria en las mujeres (91,8%) que en los hombres (86,2%).

El 38% de la población residente en Andalucía mayor de 16 años declaró no practicar ejercicio físico en su tiempo libre, manteniendo las mujeres (41,8%) una vida más sedentaria que los hombres (34%).

A medida que aumentaba el grupo etario aumenta la proporción de personas con trabajos o actividades habituales sedentarias (89,3% de los jóvenes de 16 a 24 años y 97,8% de personas mayores de 75 años), al igual que en la vida sedentaria en el tiempo libre (28,4% en jóvenes de 16 a 24 años y 59,7% en mayores de 75 años).

Almería (75%) fue la provincia donde se registró el menor porcentaje de personas que ejercen un trabajo habitual o actividad frecuente sedentaria, mientras que en Sevilla y Córdoba, con un 92,6%, fueron las provincias con una mayor proporción de personas cuyo trabajo o actividad habitual fue sedentaria. En las provincias de Málaga, Sevilla y Huelva se encontró que más del 40% de sus ciudadanos tuvieron una vida sedentaria en su tiempo libre, siendo Granada (28,1%) la provincia con un menor porcentaje.

Las personas con estudios secundarios, ingresos entre 1.000€ y 2.499€, de clase media o baja tuvieron una vida menos sedentaria en el trabajo. Por otro lado, las personas que realizan más ejercicio físico en su tiempo libre son aquellas que tenían estudios universitarios, ingresos superiores a 2.500€ y de clase superior: el sedentarismo en el tiempo libre aumenta conforme empeora su situación socioeconómica.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En Andalucía, ha aumentado la proporción de personas con trabajo o actividad habitual sedentaria y que no realizan ejercicio físico en su tiempo libre desde 2007: el aumento es mayor en hombres que en mujeres.

En cuanto a la edad del encuestado, desde 2007 en las edades comprendidas entre los 45 a 64 años es donde fue mayor el aumento de personas que no realizaron ningún ejercicio físico en su vida habitual, trabajo o tiempo libre. En el resto de grupos etarios este crecimiento fue más leve.

Por provincia, aumentó ligeramente el porcentaje de personas con vida sedentaria en su entorno laboral o actividad habitual, en los últimos años, en todas las provincias, exceptuando Almería, donde disminuyó.

Resultados

Con respecto al ejercicio realizado en el tiempo libre, disminuyó el sedentarismo en el tiempo libre hasta 2011, y aumentó en 2015-2016, tanto para hombres como para mujeres, y en todos los grupos etarios en general.

El sedentarismo en el trabajo o actividad habitual evidenció un aumento en los últimos años en todos los niveles de estudio. Desde el año 2007 se ha ido incrementando el porcentaje en todas las categorías de ingresos, siendo más acusado este aumento cuanto mayor era el nivel de ingresos. Respecto a las clases sociales, hasta 2007 se reduce el porcentaje que personas que declararon tener una vida sedentaria en el trabajo o en su vida habitual; a partir de este año la clase media se mantiene estable, mientras que las clases sociales más desfavorecidas y las más altas experimentaron un aumento en dicho porcentaje, superior en las clases más favorecidas.

En líneas generales, según el nivel socioeconómico, en los últimos años el porcentaje de residentes en Andalucía que no realizaron ejercicio físico en su tiempo libre se elevó. El mayor incremento se dio en los residentes con estudios primarios y universitarios, con rentas más bajas (inferior a 999€).

Resultados

Sedentarismo en el trabajo o actividad habitual




Ilustración 177. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 178. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Sedentarismo en el trabajo o actividad habitual




Ilustración 179. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Sedentarismo en el trabajo o actividad habitual




Ilustración 180. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Sedentarismo en el trabajo o actividad habitual




Ilustración 181. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Sedentarismo en el trabajo o actividad habitual



Ilustración 182. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Sedentarismo en el tiempo libre




Ilustración 183. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 184. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Sedentarismo en el tiempo libre




Ilustración 185. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Sedentarismo en el tiempo libre




Ilustración 186. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Sedentarismo en el tiempo libre




Ilustración 187. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Sedentarismo en el tiempo libre




Ilustración 188. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Bloque III: PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Vacunación contra la gripe

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 16,2% de la población andaluza se vacunó contra la gripe en la última campaña (16,6% de los hombres y 15,8% de las mujeres). Cuanta más edad se tiene mayor es el porcentaje de vacunación de la gripe: se vacunaron el 44,6% de las personas de 65 a 74 años y el 62,7% de los mayores de 75 años.

Por provincias se encontraron pocas diferencias en el porcentaje de vacunación en la última campaña: Jaén tuvo el mayor porcentaje (21,3%) y Sevilla el menor (12,6%).

Los residentes en Andalucía con estudios primarios (24,5%) o con las rentas mensuales más bajas (22,6%) fueron los que se vacunaron en mayor porcentaje.

En relación a la clase social a que pertenecían, no se dieron diferencias apreciables.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, desde 1999 se ha incrementado el porcentaje de personas que se vacunaron de la gripe, aunque en 2015 ha descendido: el descenso ha sido mayor en las mujeres que en los hombres (de un 18,3% en 2011 a un 15,8% de mujeres en 2015, y de un 17,1% en 2011 a un 16,6% de hombres en 2015). Por edad ha descendido el número de personas que se vacunaron de la gripe desde 1999, excepto en el grupo etario de los mayores de 75 años, donde se vacunaron casi un 15% más.

En la mayoría de las provincias se observaron porcentajes similares de vacunación de la gripe respecto a años anteriores (aunque se aprecia un leve descenso en algunas de ellas). Sin embargo, en la provincia de Jaén se produjo un aumento de casi un 10% de vacunados.

En relación a los estudios y clase social, se mantuvieron los valores, exceptuando los que tenían estudios primarios o pertenecían a las clases sociales más desfavorecidas, que experimentaron un aumento en las vacunaciones desde 1999. Aquellos con ingresos mensuales inferiores a 1.000€ o con ingresos superiores a los 2.500€ se vacunaron de la gripe cada vez menos, mientras que el resto se mantuvo en porcentajes parecidos.

Resultados

Vacunación contra la gripe




Ilustración 189. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Vacunación contra la gripe




Ilustración 190. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Vacunación contra la gripe




Ilustración 191. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Vacunación contra la gripe




Ilustración 192. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Vacunación contra la gripe



Ilustración 193. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Vacunación contra la gripe




Ilustración 194. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Métodos anticonceptivos

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, el 56,6% de la población residente en Andalucía afirmó no utilizar métodos anticonceptivos en sus relaciones de pareja (no usan ni ellos ni ellas), siendo las mujeres las que más los solían utilizar (58,8%): los hombres un 54,3%. Respecto a la edad, las personas mayores de 45 años empiezan a dejar de utilizar métodos anticonceptivos: pasan de un 55,6% en el grupo de 45 a 54 años hasta el 100% para los mayores de 75 o más años. Los que utilizaron más los métodos anticonceptivos fueron los comprendidos entre los 25 y 44 años (el 28,3% perteneciente a este grupo etario no utilizó anticonceptivos). El 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años no utilizó ningún método anticonceptivo.

Según provincia, la población menos precavida en esta materia se encontró en Cádiz y Granada. Donde más se utilizaron métodos anticonceptivos fue en Sevilla, Málaga y Huelva.

En cuanto al nivel socioeconómico, se observa que los andaluces con una situación más favorable (nivel de estudios y de ingresos mensuales elevados y clases sociales altas) utilizan en mayor porcentaje los métodos anticonceptivos.

Evolución desde la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003

En líneas generales, la población andaluza que no utiliza métodos anticonceptivos ha aumentado ligeramente desde 2003: los hombres utilizan cada vez menos los métodos anticonceptivos y las mujeres más. Por edad los valores fueron muy similares.

Las provincias donde fue más acusado el aumento de personas que no utilizaron métodos anticonceptivos (en torno al 11%), fueron Cádiz y Córdoba. Sevilla donde ha descendido en casi un 10% el número de personas que no usaron métodos anticonceptivos.

Los residentes en Andalucía con menos estudios tendieron a utilizar cada vez menos los métodos anticonceptivos que los que tenían más estudios. Respecto a los ingresos mensuales, los que utilizaron cada vez menos los métodos anticonceptivos fueron los que tenían ingresos de 1.500€ a 2.499€ (aumenta un 10% desde 2003) y los que los utilizaron cada vez más tenían ingresos superiores a los 2.500€. Las clases sociales superiores aumentaron un 8% en la no utilización de anticonceptivos.

Resultados

Métodos anticonceptivos




Ilustración 195. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Métodos anticonceptivos




Ilustración 196. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por edad. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Métodos anticonceptivos




Ilustración 197. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Métodos anticonceptivos




Ilustración 198. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Métodos anticonceptivos



Ilustración 199. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Métodos anticonceptivos




Ilustración 200. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Visitas médicas de ginecología

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 86,3% de las mujeres residentes en Andalucía mayores de 16 años acudió en alguna ocasión al ginecólogo. Los porcentajes fueron menores entre las mujeres pertenecientes a los grupos etarios extremos (59,1% en mujeres de 16 a 24 años y 76,8% en mujeres con más de 75 años).

Las mujeres de Sevilla y Huelva son las que más acudieron al ginecólogo (89,2% en ambos casos) y las de Jaén (77,9%) las que menos fueron.

Las mujeres visitaron en mayor proporción al ginecólogo en alguna ocasión conforme mejor era su situación socioeconómica (estudios universitarios 92,2%, rentas más altas (91%) y clase social más acomodada (96,1%)).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa una tendencia creciente en las visitas al ginecólogo (del 68,3% en 1999 al 86,3% en 2015). Éste comportamiento se repite en todas las variables estudiadas (edad, provincias, estudios, ingresos y clase social). Cabe destacar que en las edades de los extremos (menores de 25 años y mayores de 74 años) el crecimiento fue más acusado aunque sigan siendo las que en menor proporción acudieron al ginecólogo alguna vez.

Resultados



Ilustración 201. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 202. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 203. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 204. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 205. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 206. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Mamografías

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 48,1% de las mujeres residentes en Andalucía con más de 16 años se hizo una mamografía. Las mujeres con edades comprendidas entre 55 y 74 años se hicieron alguna vez una mamografía (entre el 9,5% y el 85,8% de las mujeres de 55 a 64 y de 65 a 74 años, respectivamente). Cuanto menor fue el grupo etario, menor el porcentaje de mujeres que se realizaron una mamografía.

La provincia con mayor porcentaje de mujeres que se realizaron mamografías fue Córdoba, con un 55%, y Málaga la de menor porcentaje (40,3%).

Las mujeres con estudios primarios o de ingresos inferiores fueron las que se realizaron alguna vez una mamografía en mayor porcentaje (61,7% y 51,2%, respectivamente).

Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007

A lo largo de los años, el porcentaje de mujeres que se ha realizado una mamografía alguna vez ha aumentado. Éste hecho se repite en todos los grupos de edad, provincias, estudios, ingresos y clase social. El crecimiento ha sido más acusado en mujeres de 75 o más años, con nivel socioeconómico más desfavorecido (menos estudios, menor renta y clase social más baja).

Resultados

Mamografías




Ilustración 207. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Mamografías




Ilustración 208. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 209. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 210. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 211. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Citologías

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 64,3% de las mujeres residentes en Andalucía mayores de 16 años se habían realizado en alguna ocasión una citología vaginal. Los mayores porcentajes se daban en las mujeres de 25 a 44 años (73,4%) y de 45 a 54 años (76,4%); los porcentajes más bajos se encontraron en las edades extremas, el 42,4% de las mujeres de 16 a 24 años y el 34,6% de 75 o más años.

Córdoba (78%) fue la provincia donde más mujeres acudieron al especialista para realizarse una citología y Jaén (23,8%) donde menos.

En cuanto al nivel socioeconómico, cuanto mejor es este mayor es el porcentaje de mujeres que acudió al especialista para realizarse una citología alguna vez.

Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En líneas generales, la evolución que ha sufrido la realización de citologías vaginales desde 2007 ha sido favorable: ha pasado de 53,6% en 2007 a un 64,3% en 2015. Las mujeres menores de 25 años y las mayores de 54 años tuvieron el mayor aumento.

La evolución fue favorable en todas las provincias, excepto en Jaén –donde se ha reducido a la mitad desde 2007- y en Málaga, que mantiene sus valores.

Las mujeres de Andalucía con nivel socioeconómico más desfavorable (menos estudios, rentas más bajas y clase social baja) experimentaron el mayor aumento en el porcentaje de mujeres que había ido alguna vez a un especialista para realizarse una citología vaginal.

Resultados




Ilustración 212. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 213. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 214. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 215. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 216. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Exposición solar

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el verano de 2015, la población residente en Andalucía mayor de 16 años que se expuso al sol en las horas centrales del día (de 12h a 17h) fue del 13,7%, distinguiéndose un 14,7% hombres y 12,7% mujeres. Por edades podemos observar que los jóvenes de 16 a 24 años, fueron los que más se expusieron al sol en estas horas (20,6%) y a medida que avanza la edad disminuye el porcentaje, obteniéndose el 5,6% en las personas de 75 o más años.

Los residentes en Granada fueron los que más se expusieron al sol de 12h a 17h (22,4%) y los de Jaén los que menos (5,6%).

Los andaluces con mejor situación socioeconómica (estudios universitarios, rentas y clases sociales altas) se expusieron al sol en mayor proporción en las horas centrales del día. El porcentaje disminuye si lo hace la posición socioeconómica.

Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007

Existe una tendencia creciente desde el año 2007 a tomar el sol en las horas centrales del día en las distintas variables estudiadas (sexo, edad, provincias, estudios, ingresos y clase social). En la provincia de Málaga estos valores se duplicaron; en Cádiz y Granada aumentaron en torno al 16%, mientras que en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla se redujo a más de la mitad dicho porcentaje..

Exposición solar en las horas centrales




Ilustración 217. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Exposición solar en las horas centrales




Ilustración 218. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Exposición solar en las horas centrales




Ilustración 219. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Exposición solar en las horas centrales



Ilustración 220. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Exposición solar en las horas centrales




Ilustración 221. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Exposición solar en las horas centrales




Ilustración 222. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Higiene buco-dental: Visitas odontológicas

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo 2015-2016 un 31,8% de la población residente en Andalucía mayor de 16 años acudió al dentista en los últimos 6 meses: fue mayor el porcentaje en las mujeres (34,9%) que en los hombres (28,5%). Las personas con edades comprendidas entre 16 y 24 años tuvieron el porcentaje más elevado de asistencia al dentista (41,4%), reduciéndose este porcentaje según avanza la edad: el mínimo valor se dio para las personas de 75 o más años (15,4%).

Jaén, con un 38,9%, es la provincia donde se registró el mayor porcentaje de personas que habían ido al dentista en los últimos 6 meses y la provincia de Huelva, con un 20,9%, donde menos.

Existe una tendencia creciente en las visitas al dentista según mejoraba la situación socioeconómica (estudios universitarios, ingresos y clases sociales altas).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, se ha dado un aumento paulatino de los porcentajes de personas que habían visitado al dentista en los 6 meses previos a la encuesta, en todas las variables estudiadas (sexo, edad, provincias, estudios, ingresos y clase social). En las distintas provincias de Andalucía el aumento fue del 10%, excepto en Jaén, donde aumentó un 20%, y en Huelva se registró en 2015 el menor porcentaje.

Resultados

Higiene buco-dental




Ilustración 223. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Higiene buco-dental




Ilustración 224. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Higiene buco-dental




Ilustración 225. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Higiene buco-dental




Ilustración 226. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 227. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 228. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Seguridad vial

El estudio de la seguridad vial se realizó preguntando por la adopción de medidas como el uso del casco (en el caso de haber ido en moto), cinturón de seguridad o asientos especiales para menores en los desplazamientos.

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015- 2016

En el periodo 2015-2016, las personas mayores de 16 años adoptaron medidas de seguridad vial con mayor porcentaje en la carretera que en la ciudad (casco o cinturón de seguridad).

Con respecto al uso del casco, en la ciudad un 95,6% de los residentes andaluces lo usan siempre y en carretera un 95,9%. Los hombres fueron más precavidos que las mujeres usando el casco (en el caso de haber ido en moto) tanto en carretera como en ciudad (ciudad: 95,6% hombres y 94,4% mujeres; carretera: 96,7% hombres y 94,6% mujeres). Según la edad, se puede observar que aumenta el porcentaje del uso del casco al aumentar la edad de las personas, tanto en carretera como en ciudad. Podemos destacar el poco uso del casco tanto en ciudad como en carretera de las personas con 75 o más años cuando van en moto (92,3% en ciudad y 83,3% en carretera).

En la provincia de Jaén es donde menos se usó el casco, tanto en ciudad como en carretera (68,3 y 70,2%, respectivamente) y en Málaga donde lo usaron más, tanto en ciudad como en carretera (98,4% en ciudad y 98,4% en carretera).

Respecto al nivel de estudios, ingresos y clase social, aunque los valores fueron muy próximos (superiores al 92%), en las diferentes categorías (estudios, ingresos y clase social), se observó un ligero descenso de los porcentajes de uso del casco cuando se iba en moto en ciudad y carretera, para los niveles más bajos de estudios, renta mensual y clase social.

En cuanto al uso del cinturón de seguridad, un 97,3% de los mayores de 16 años lo usó en ciudad y un 98,9% en carretera. No se encontraron diferencias según el sexo. Cuanto mayores eran las personas aumentaba el porcentaje del uso del cinturón, tanto en carretera como en ciudad.

En todas las distintas provincias más del 94% de las personas utilizó el cinturón de seguridad en ciudad y más del 97% en carretera.

Respecto al nivel socioeconómico, a mejor nivel socioeconómico el porcentaje aumenta, llegando casi al 100% en los andaluces con nivel socioeconómico más favorable (mayor nivel de estudios, ingresos y clase social).

En la utilización de asientos especiales infantiles en los desplazamientos el 97% de los residentes andaluces con edad superior a 16 años los utilizó cuando viajaba con algún menor que lo necesitase.

En Huelva es donde menos usaron asientos especiales infantiles (87%) y en Málaga, Córdoba y Granada donde más (más del 98%).

Resultados

La población andaluza con peor situación socioeconómica usaron en menor proporción los asientos especiales infantiles.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la seguridad vial (uso de casco, cinturón y asientos especiales) desde 1999 ha sido favorable, tanto en ciudad como en carretera, siendo superiores los porcentajes en carretera que en ciudad. Destaca que en las personas de 65 a 74 años descendió el uso del casco en ciudad un 10% y en carretera un 6%. En los residentes en Jaén descendió un 17,8% el uso del casco en ciudad y un 25% en carretera. Por otro lado, en el uso de asientos especiales infantiles desde el año 2011 al año 2015 se apreció un leve descenso.

Resultados

Uso del casco




Ilustración 229. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 230. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Uso del casco




Ilustración 231. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Uso del casco




Ilustración 232. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 233. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 234. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 235. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Uso del cinturón de seguridad




Ilustración 236. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 237. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 238. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 239. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 240. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 241. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 242. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Uso de asientos especiales para menores




Ilustración 243. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 244. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Asientos especiales infantiles




Ilustración 245. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Asientos especiales infantiles




Ilustración 246. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 247. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 248. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consejo médico para dejar de fumar

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 al 37% de los residentes en Andalucía su médico les aconsejó dejar de fumar (al 35,9% de los hombres y al 38,4% de las mujeres). Conforme aumenta el grupo etario se incrementa el porcentaje de personas cuyos médicos les aconsejan dejar de fumar: el mayor porcentaje se dio en los de más de 75 años (64,7%).

En la provincia de Almería (55,4%) se registró el mayor porcentaje de personas a las que su médico le había aconsejado dejar de fumar, y en Jaén (19,4%) el menor.

Según el nivel de estudios e ingresos, el mayor porcentaje se encontró en aquellos con estudios primarios, con ingresos mensuales inferiores a 1.000€ o de 2.500€ o más. Las clases sociales media y baja tuvieron el mayor porcentaje de personas a las que su médico les había recomendado dejar de fumar.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 a 2007 decreció el porcentaje de personas a las que sus médicos aconsejaron dejar de fumar (desde un 28,5% hasta un 19,4%, respectivamente). Sin embargo, desde 2007 a 2015-2016 dicho porcentaje ha aumentado considerablemente (37,0%). Este patrón se produce tanto en mujeres como en hombres.

La tendencia se manifiesta, asimismo, en general, según los grupos etarios, el nivel de estudios, los ingresos y la clase social; aunque en los últimos cuatro años se registró un ligero descenso en personas con estudios primarios e ingresos inferiores a 999€ mensuales (a las que su médico les había aconsejado dejar el tabaco en menor proporción).

Hubo un gran aumento (de más de un 24%), desde 2007 a 2011, en provincias como en Almería, Córdoba y Granada; mientras que en las de Cádiz y Jaén se produjo un apreciable descenso de 2011 a 2015 (del 20,9% y del 12,8%, respectivamente).

Resultados

Consejo médico para dejar de fumar




Ilustración 249. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Consejo médico para dejar de fumar




Ilustración 250. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consejo médico para dejar de fumar




Ilustración 251. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Consejo médico para dejar de fumar




Ilustración 252. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consejo médico para dejar de fumar




Ilustración 253. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Consejo médico para dejar de fumar




Ilustración 254. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Bloque IV: PRÁCTICAS DE MEDIO AMBIENTE

Características de la vivienda: Propiedad de la vivienda

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo 2015-2016 el 84,6% de los andaluces eran propietarios de una vivienda: no hubo diferencias entre hombres y mujeres. El 14,2% vivían de alquiler (14,5% de los hombres y 13,9% de las mujeres). Por edad, los jóvenes de 16 a 24 años (76,5%) y los adultos de 25 a 44 años (76,4%) eran quienes tenían el porcentaje más bajo de viviendas en propiedad. Dicho porcentaje se incrementaba a medida que aumentaba el grupo etario al que se pertenecía: el máximo se dio en las personas de 75 años o más (97,8%). Por el contrario, el mayor porcentaje de personas que viven en viviendas de alquiler son los más jóvenes (22,5%) y los comprendidos entre 25 y 44 años (21,8%): en este caso, el porcentaje desciende a medida que aumenta la edad (grupo etario): el menor porcentaje se produjo en personas de más de 75 años.

En Almería se dio el mayor porcentaje de los que vivían de alquiler (24,8%) y en Jaén de los que vivían en régimen de propiedad (91,6%).

Según el nivel de estudios, los que tenían estudios primarios eran los que vivían con mayor frecuencia en régimen de propiedad (87,9%) y los que tenían estudios universitarios (80,8%) los que menos. Por el contrario, un 18,6% de los que poseían estudios universitarios vivían de alquiler y tan solo un 10,8% de los que tenían estudios primarios.

El porcentaje de personas que tienen vivienda en propiedad tendía a aumentar conforme lo hacían los ingresos mensuales. La tendencia se invierte en las personas que viven de alquiler (a menor renta mensual mayor porcentaje de personas viven de alquiler).

Respecto a la clase social, las personas de clase media vivían en mayor proporción en propiedad, mientras que las clases más elevadas y las más desfavorecidas lo hacían de alquiler.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, el porcentaje de personas que viven en régimen de propiedad desde 1999 tiende a disminuir y aumenta el porcentaje de personas que decidieron vivir de alquiler (no se encontraron diferencias notables entre

Resultados

hombres y mujeres). Esta tendencia se reflejó también en los menores de 54 años: donde cada vez menos tenían una vivienda en propiedad (viven cada vez más de alquiler), mientras que en edades superiores ocurre lo contrario.

Por provincias, las personas que vivían en régimen de propiedad descendió en los últimos años, excepto en las provincias de Jaén y Huelva, donde han aumentado o se han mantenido sus valores. Con respecto a las viviendas en alquiler, aumentaron los porcentajes en los últimos años, excepto en las provincias anteriormente mencionadas.

Los residentes en Andalucía que vivían de alquiler crece desde 1999, independientemente del nivel de estudios y de la clase social que se tuviera. Al contrario ocurre con la vivienda en propiedad, que experimentó un ligero descenso en todos los niveles de estudios o de clase social). Por otro lado, la vivienda en propiedad experimentó un aumento en las rentas mensuales más altas (más de 2.500€), mientras que en el resto decreció. Las personas con ingresos mensuales inferiores a 2.500€ vivieron cada vez más de alquiler.

Resultados




Ilustración 255. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 256. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 257. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 258. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 259. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 260. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 261. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Exposición ambiental al tabaco: Personas fumadoras pasivas en el hogar

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 26% de la población residente en Andalucía fue fumadora pasiva en el hogar: el porcentaje fue superior en las mujeres (27,2%) que en los hombres (24,8%). Las personas jóvenes tuvieron el porcentaje más alto de fumadores pasivos (38,2%), y disminuyó según aumenta la edad, siendo de un 8,7% para las personas de más de 75 años.

Según la provincia, se dio el porcentaje mayor de personas expuestas al humo del tabaco en el hogar en la provincia de Almería (36,7%); en Sevilla, el menor (22,1%).

Los residentes en Andalucía con estudios secundarios (28,6%) fueron los que más expuestos estuvieron al humo del tabaco en sus hogares, seguidos de los que tenían estudios primarios (25,7%) y estudios universitarios (21%).

En cuanto al nivel de ingresos mensuales, se registró el menor porcentaje de personas fumadoras pasivas en las que tenían rentas inferiores a 1.000€ (25,6%). El resto presentó frecuencias ligeramente superior al 26%.

Los valores más elevados se encontraron en las clases sociales más desfavorecidas (26,9%), seguidas de las clases más altas (22,3%) y la clase media (20,9%).

Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2011 se registraron los porcentajes más altos de personas expuestas al humo del tabaco en sus hogares. Dichos porcentajes se redujeron notablemente en 2015, llegando a ser inferiores a los obtenidos en 2007 en las distintas variables estudiadas (sexo, grupos de edad, provincias, estudios, ingresos y clase social). El descenso más acusado desde 2015 se observó en mujeres (decrece un 10%), de 16 a 24 años (decrece un 14%), en la provincia de Córdoba (se reduce más de la mitad), con estudios secundarios (decrece un 10,9%), ingresos mensuales entre 1.500€ y 2.499€ (decrece un 10,6%) y en las clases sociales media o bajas (decrece un 10% y un 8,9%, respectivamente).




Ilustración 262. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 263. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 264. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 265. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 266. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 267. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Exposición ambiental al tabaco: Personas fumadoras pasivas fuera de casa entre semana y durante el fin de semana

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 un 6,3% de la población residente en Andalucía pasó de media entre 1 y 4 horas diarias (entre semana), en ambientes cargados de humo y un 2,4% pasó más de 4 horas en este tipo de ambiente. No se encontraron apenas diferencias entre los porcentajes de hombres (6,5% de 1 a 4 horas y 2,5% más de 4 horas) y mujeres (6% de 1 a 4 horas y 2,4% más de 4 horas).

El porcentaje de personas que pasaban el tiempo en ambientes cargados de humo entre semana disminuyó conforme aumentaba la edad (de 1 a 4 horas diarias: 8,6% de personas entre 16 y 24 años y 2,1% de personas de 75 o más años; más de 4 horas diarias: 2,8% de personas de 16 a 24 años y 0,9% de personas de 75 o más años).

Según la provincia de residencia, en Cádiz se registraron los porcentajes más altos de personas fumadoras pasivas entre semana, donde un 14,2% estuvo expuesta de 1 a 4 horas diarias entre semana y un 6,3% más de 4 horas diarias. Por el contrario, un 1% de los granadinos estuvieron expuestos entre 1 y 4 horas diarias entre semana y un 0,1% lo estuvo más de 4 horas diarias; y los onubenses solo un 0,0%.

La población residente en Andalucía con estudios secundarios estuvo expuesta en mayor proporción a ambientes cargados de humo diariamente (de 1 a 4 horas diarias: 7,2%; más de 4 horas diarias: 3%). Los universitarios los menos expuestos (de 1 a 4 horas diarias: 4,5% y más de 4 horas diarias: 1,3%).

A mayor ingreso y clase social menor es el número de fumadores pasivos entre semana; destacaron aquellos con ingresos superiores a 2.500€ que no fueron fumadores pasivos más de 4 horas: 0,0 %.

En general, los residentes andaluces estuvieron más expuestos a ambientes cargados de humo en fin de semana que durante la semana (de 1 a 4 horas diarias: un 7,9% en fin de semana y un 6,3% durante la semana; más de 4 horas diarias: un 3,6% en fin de semana y un 2,4% durante la semana).

Entre los hombres y las mujeres los porcentajes de fumadores pasivos en fin de semana están igualados (de 1 a 4 horas: un 8,4% de los hombres y un 7,5% de las mujeres; más de 4 horas: un 3,6% para ambos sexos). Por otro lado, los más jóvenes son fumadores pasivos en mayor proporción en fin de semana, descendiendo conforme aumentaba la edad (de 1 a 4 horas: un 13,2% de los jóvenes entre 16 y 24 años y un 2,4% de las personas con 75 o más años; más de 4 horas: un 5% de los jóvenes entre 16 y 24 años y un 1% de las personas con 75 o más años).

Según el provincia, Málaga registró los valores más altos de fumadores pasivos en fin de semana (14,8% de personas expuestas de 1 a 4 horas y 9% de personas expuestas más de 4 horas), y Granada junto con Huelva los más bajos (1%

Resultados

y 2,6% de personas expuestas de 1 a 4 horas respectivamente; 0,4% y 0% de personas expuestas más de 4 horas, respectivamente).

La población residente en Andalucía con estudios secundarios fueron los fumadores pasivos durante los fines de semana en mayor proporción.

Conforme se incrementaba los ingresos y la clase social aumentó el porcentaje de personas fumadoras pasivas de 1 a 4 horas y más de 4 horas en fin de semana.

Evolución desde la III Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En los últimos años, la proporción de fumadores pasivos en días laborables y fines de semana ha sufrido descenso acentuado, más elevado para las personas que pasaron de 1 a 4 horas expuestas al humo del tabaco que para las personas que pasaron más de 4 horas expuestas. En 2015 se registró un leve aumento respecto a 2011, aunque los valores fueron inferiores a los del año 2007.

Entre semana, el descenso que se ha producido desde 2007, mayor para los hombres que para las mujeres y para las personas con edades comprendidas entre 16 y 54 años.

En Cádiz y Málaga el descenso acontecido en 2011 se ha traducido en un importante aumento en 2015 (de personas fumadoras pasivas de 1 a 4 horas o más de 4 horas diarias entre semana).

El marcado descenso en el año 2011 de fumadores pasivos entre semana en el aspecto socioeconómico fue equivalente en los diferentes niveles de estudios, ingresos y clases sociales. El leve aumento experimentado en 2015 fue más acusado para las personas con estudios primarios o de ingresos mensuales inferiores a los 2.500€.

En el fin de semana, la proporción de personas que pasaban el tiempo en ambientes cargados de humo era mayor respecto a los días laborables. Al igual que en el caso de los fumadores pasivos entre semana, en el año 2015 hubo un leve aumento respecto al año 2011 del porcentaje de fumadores pasivos en fin de semana. Estos cambios fueron más acusados en menores de 54 años, en las provincias de Cádiz o Málaga, en aquellos con estudios secundarios o inferiores, o en los pertenecientes a las clases media o baja.

Resultados

Personas fumadoras pasivas fuera de casa entre semana




Ilustración 268. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 269. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Personas fumadoras pasivas entre semana




Ilustración 270. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Personas fumadoras pasivas entre semana




Ilustración 271. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Personas fumadoras pasivas entre semana




Ilustración 272. Porcentaje personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Personas fumadoras pasivas entre semana




Ilustración 273. Porcentaje personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Personas fumadoras pasivas fuera de casa y del trabajo durante el fin de semana




Ilustración 274. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por sexo. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 275. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por edad. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Personas fumadoras pasivas en el fin de semana




Ilustración 276. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por provincias. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Personas fumadoras pasivas en el fin de semana




Ilustración 277. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Personas fumadoras pasivas en el fin de semana




Ilustración 278. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Personas fumadoras pasivas en el fin de semana




Ilustración 279. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por clase social. Andalucía. Años 2007, 2011 Y 2015.

Condiciones de trabajo:

Exposiciones a vapores, humos y otras sustancias peligrosas

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 13,7% de la población trabajadora residente en Andalucía declaró haber estado expuesta a vapores, humos y otro tipo de sustancias peligrosas: más expuestos los hombres (17,7%) que las mujeres (8,4%). Las personas de 45 a 54 años (14,8%) estuvieron más expuestas a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo que las de 55 a 64 años (12%).

Huelva (24,8%) fue donde un mayor porcentaje de personas estuvo expuesto a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo, y Sevilla (9,1%) donde menos.

Según el nivel socioeconómico, aquellos con estudios universitarios (6,5%), con ingresos superiores a 2.500€ (10,1%) y de clase social media o alta (7,9% y 8%, respectivamente), fueron quienes menos estuvieron expuestos a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo, aumentando el porcentaje según descendían estos niveles de estudios, ingresos o clase social.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En los últimos años, ha descendido la proporción de personas trabajadoras que están expuestas a sustancias peligrosas, ya sea a través de la respiración o de su manipulación. El descenso ha sido mayor en los hombres que en la mujeres. Las personas entre los 55 y los 64 años experimentaron el mayor descenso, manteniéndose con valores muy similares el resto de grupos etarios.

Las únicas provincias donde aumentó el porcentaje de personas expuestas a sustancias peligrosas en el ámbito laboral en los últimos años fueron Almería, Huelva y Jaén. La provincia de Sevilla experimentó el mayor descenso (de un 25,4% en 1999 a un 9,1%).

En el ámbito socioeconómico, estos porcentajes descendieron paulatinamente según el nivel de estudios, de ingresos y la clase social. Hubo un gran descenso de las personas expuestas a sustancias peligrosas en su puesto de trabajo en el caso de ingresos inferiores a 1.000€ y en las clases sociales más desfavorecidas.

Resultados

Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas




Ilustración 280. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas




Ilustración 281. Porcentaje de trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas




Ilustración 282. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas




Ilustración 283. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas




Ilustración 284. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas




Ilustración 285. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas y manejar sustancias o productos peligrosos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Condiciones de trabajo:

Exposiciones a posiciones fatigantes o dolorosas

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 34% de los residentes en Andalucía de más de 16 años estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo: los hombres (36,4%) estuvieron más expuestos que las mujeres (30,8%). Según la edad, los jóvenes de 16 a 24 años (35,9%) fueron los más expuestos a estas posiciones.

En Córdoba y Huelva (38,2% y 38%, respectivamente) fue donde se registró el mayor porcentaje de personas que tenían posturas fatigantes o dolorosas en el trabajo; Sevilla (19,7%) donde menos.

En general, los residentes andaluces que estuvieron expuestos a posturas fatigantes o dolorosas en su trabajo en mayor proporción tenían un perfil socioeconómico más desfavorecido.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución desde 1999 ha tenido diferentes etapas: con respecto a 1999, ha aumentado el porcentaje de personas trabajadoras expuestas a posiciones fatigantes o dolorosas este aumento fue ligeramente superior en mujeres que en hombres. Según la edad, los residentes andaluces menores de 44 años fueron quienes estuvieron más expuestos a estas posiciones.

En todas las provincias andaluzas aumentó el porcentaje de personas que tuvieron posiciones fatigantes o dolorosas en el trabajo desde 1999. En la provincia de Cádiz se triplicó dicho porcentaje. En Jaén y Sevilla en 2015 se registraron los menores porcentajes.

Las malas posiciones en el trabajo que provocan situaciones fatigantes o dolorosas tienden a crecer más rápidamente en la población con estudios secundarios o inferiores que en la población con estudios universitarios. El porcentaje aumentó desde 2011 en aquellos que tenían rentas inferiores a 1.499€.

Se constata una tendencia creciente a tener malas posiciones en el trabajo, que provocan situaciones fatigantes o dolorosas, en todas las clases sociales: más acusada en las clases sociales más desfavorecidas.

Resultados

Posiciones dolorosas o fatigantes




Ilustración 286. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Posiciones dolorosas o fatigantes




Ilustración 287. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Posiciones dolorosas o fatigantes




Ilustración 288. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Posiciones dolorosas o fatigantes




Ilustración 289. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 290. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 291. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Condiciones de trabajo:

Percepción de afectación negativa del trabajo en la salud

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 un 22,8% de la población residente en Andalucía trabajadora manifestó que su trabajo le afectaba negativamente en la salud: esta percepción fue un poco más aguda en los hombres (24,5%) que en las mujeres (23,6%). El porcentaje de personas de grupos etarios más avanzados percibieron una influencia negativa sobre la salud que los más jóvenes (28,4% personas de 55 a 64 años y 16,9% personas de 16 a 24 años).

Los trabajadores de Cádiz (44,7%) fueron los que con mayor frecuencia declararon que su trabajo les afectaba negativamente a la salud; los de Sevilla los que menos (10,5%).

En relación al aspecto socioeconómico, cuanto más favorable era este, menos frecuente fue tener la percepción negativa del trabajo en la salud (trabajadores con estudios primarios, con rentas mensuales y de clase social más bajas mostraron peor percepción de la influencia del trabajo en su salud).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, la percepción negativa del trabajo en la salud ha ido disminuyendo con el paso del tiempo: el descenso ha sido mayor en las mujeres que en los hombres.

En el grupo de edad entre 55 y 65 años hubo un aumento en el año 2011 de la percepción negativa del trabajo en la salud, aunque en 2015 volvió a descender, mientras que en el resto de grupos de edad se observó la tendencia constante a disminuir en estos años.

Huelva experimentó el mayor descenso (casi un 34%) en la percepción de afectación negativa del trabajo en la salud, mientras que en las provincias de Almería, Cádiz, y Granada tendió a aumentar (aumento entre el 4 y el 11%).

El descenso paulatino en los últimos años de la influencia negativa del trabajo en la salud fue patente en los diferentes niveles de ingresos, clases sociales y estudios, exceptuando a los universitarios, donde aumentó el porcentaje de 2011 a 2015 de esta percepción negativa.

Resultados

Afectación negativa del trabajo en la salud




Ilustración 292. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Afectación negativa del trabajo en la salud




Ilustración 293. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Afectación negativa del trabajo en la salud




Ilustración 294. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Afectación negativa del trabajo en la salud




Ilustración 295. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Afectación negativa del trabajo en la salud




Ilustración 296. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Afectación negativa del trabajo en la salud




Ilustración 297. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Apoyo social: Apoyo confidencial y apoyo afectivo

El apoyo social de la población residente en Andalucía se recogió a través de la escala de apoyo social DUKE, que por un lado mide la posibilidad de disponer de personas para comunicarse (apoyo emocional, confidencial) y por otro lado las demostraciones de amor, cariño y empatía que recibe una persona (apoyo afectivo).

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016, la población residente en Andalucía tuvo más carencia de apoyo afectivo que en el ámbito confidencial: el 3% de los andaluces mayores de 16 años percibió un escaso apoyo confidencial mientras que el 5,3% declaró falta de apoyo afectivo: estas carencias fueron mayores entre las mujeres (3,1% escaso apoyo confidencial y 5,7% escaso apoyo afectivo) que entre los hombres (2,9% escaso apoyo confidencial y 5% escaso apoyo afectivo).

A medida que aumentaba la edad, la proporción de personas con falta de apoyo confidencial y afectivo fue mayor. En el caso del apoyo confidencial, el 0,9% de la población entre 16 y 24 años percibió una carencia en el ámbito confidencial, llegando al 6,1% de la población de 75 o más años. El 2% de las personas entre 16 y 24 años y un 11,3% las personas de 75 o más años percibieron un déficit en el entorno afectivo.

Almería fue la provincia donde las personas percibieron más carencia en el ámbito confidencial (5,2%) y afectivo (11,3%). Huelva (2,5%) y Sevilla (2,7%) donde menos.

A medida que descenden el nivel de estudios e ingresos mensuales, mayor es la carencia de apoyo confidencial y afectivo percibido por los residentes en Andalucía (apoyo afectivo: 7,6% estudios primarios, 3,4% estudios secundarios y 2,6% estudios universitarios; 10,5% ingresos inferiores a 1.000€, 3,5% ingresos entre 1.000 y 1.499€, 1,3% ingresos entre 1.500 y 2.499€ y 1,5% ingresos superiores a 2.500€; apoyo confidencial: 4,6% estudios primarios, 1,9% estudios secundarios y 0,7% estudios universitarios; 6,1% ingresos inferiores a 1.000€, 1,6% ingresos entre 1.000 y 1.499€, 0,9% ingresos entre 1.500 y 2.499€ y 0,0% ingresos superiores a 2.500€).

En las clases sociales medias y altas no se apreciaron diferencias respecto a la proporción de personas que sufrieron falta de apoyo confidencial y afectivo, mientras que en las clases sociales más desfavorecidas el porcentaje fue mayor (apoyo confidencial: 1,1% en las clases sociales I y II, 0,9% en la clase social III y 3,8% en las clases sociales inferiores; apoyo afectivo: 2,9% en las clases sociales I, II y III y 6,5% clases sociales inferiores).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, el apoyo social (confidencial y afectivo) mejoró desde 1999 en la población residente en Andalucía. Esta mejoría fue mayor en el ámbito afectivo que en el confidencial. Desde el año 2011 al año 2015 el apoyo afectivo y confidencial experimentaron un leve aumento, más acentuado en el apoyo afectivo y en hombres de 75 o más años, o

Resultados

residentes en las provincias de Jaén y Málaga, o con un entorno socioeconómico más desfavorable. En cuanto al apoyo confidencial, el cambio fue superior en mujeres mayores de 45 años, de las provincias de Jaén y Málaga, con peor entorno socioeconómico.

Resultados

Apoyo confidencial




Ilustración 298. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 299. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Apoyo confidencial




Ilustración 300. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Apoyo confidencial




Ilustración 301. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 302. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 303. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Recursos afectivos




Ilustración 304. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 305. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Apoyo afectivo




Ilustración 306. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Apoyo afectivo




Ilustración 307. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Apoyo afectivo



Ilustración 308. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Apoyo afectivo




Ilustración 309. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Bloque V: SERVICIOS SANITARIOS

Consultas médicas: Frecuencia, lugar de consulta, motivos de consulta y profesional de la medicina visitado/a

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 28,8% de la población residente en Andalucía (25,3% hombres y 32,3% mujeres), había consultado al médico en las dos semanas previas a la encuesta. Lo habían hecho en un centro de salud o consultorio (más del 70% de los residentes), independientemente de la edad, el sexo, el nivel socioeconómico o la provincia. El principal motivo de dicha consulta fue el diagnóstico y el tratamiento (más del 50% fue a una consulta por este motivo). El profesional más visitado fue el de medicina general (más del 80% de los residentes andaluces decidió acudir a este especialista). A medida que la edad aumentó, también lo hicieron las consultas al médico. Donde más se consultó al médico, en términos relativos, fue en la provincia de Jaén (43,9%), y donde menos en la de Huelva (19,1%). Según el nivel socioeconómico, la tendencia fue la de aumentar las consultas médicas cuanto menor era el nivel de estudios, de ingresos y la clase social.

Evolución desde la I Escuela Andaluza de Salud de 1999

La demanda de consultas médicas ha tendido a aumentar desde el año 2007 (25,8% en 2007, 28,8% en 2015). Las mujeres mantienen porcentajes similares a lo largo de los años, mientras que en los hombres se observa una tendencia creciente desde 2007. El lugar más habitual de la consulta sigue siendo el centro de salud o consultorio. Las visitas a los centros de salud han seguido aumentando mientras se reducen las visitas a un ambulatorio o a un centro de especialidades o las visitas a las consultas externas de un hospital, en todas las variables estudiadas (sexo, edad, nivel socioeconómica y clase social). El motivo principal de dicha consulta cada vez más fue para diagnóstico y tratamiento, mientras que las revisiones aumentaron hasta 2011, reduciéndose en 2015. Finalmente las recetas, que aumentaron hasta 2011, mantuvieron los porcentajes similares en 2015. El profesional más visitado sigue siendo el de medicina general.

Los residentes andaluces menores de 45 años son los que han experimentado el mayor aumento en la frecuencia de consultas médicas desde 1999, aunque van cada vez menos para una revisión o chequeo. Las visitas al centro de salud se incrementaron en personas de 16 a 24 años. Por provincias, el incremento de consultas es mayor en Jaén, pero en la provincia de Huelva acuden cada vez menos al médico para diagnóstico y tratamiento.

Resultados

En función del perfil socioeconómico, la demanda de consultas aumentó en mayor proporción en personas con estudios primarios o con ingresos inferiores a 1.000€. Se redujo más en las clases altas la proporción de personas que acudió a un ambulatorio o centro de especialidades y consultas externas. En cuanto al motivo de la consulta, el aumento de las consultas para revisiones y disminución de las consultas para diagnóstico y tratamiento es más notable en las clases sociales altas; mientras que en las clases inferiores mantienen valores muy similares a los de 1999 en 2015, en ambos motivos de consulta.

Resultados




Ilustración 310. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.




Ilustración 311. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015.

Resultados

Frecuencia




Ilustración 312. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Frecuencia




Ilustración 313. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Frecuencia




Ilustración 314. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Frecuencia




Ilustración 315. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Lugar de consulta




Ilustración 316. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 317. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Lugar de consulta




Ilustración 318. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Lugar de la última consulta




Ilustración 319. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Lugar de consulta




Ilustración 320. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Lugar de consulta




Ilustración 321. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Lugar de la última consulta




Ilustración 322. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Lugar de la última consulta




Ilustración 323. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 324. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 325. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Motivos de consulta




Ilustración 326. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 327. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 328. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 329. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Motivo de la última consulta




Ilustración 330. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Motivo de la última consulta




Ilustración 331. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 332. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 333. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 334. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 335. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Profesional de medicina visitado/a




Ilustración 336. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 337. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Resultados




Ilustración 338. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 339. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 340. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 341. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Ingresos hospitalarios: Frecuencia y número medio de hospitalizaciones

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

Durante el periodo de estudio 2015-2016 el 6,6% de la población residente en Andalucía (4,8% hombres y 7,5% mujeres) estuvo ingresado en un hospital al menos una noche en el último año. El número medio de hospitalizaciones de 1,3 veces (1,4 veces los hombres y 1,2 veces las mujeres).

A medida que aumentaba la edad el porcentaje de personas que fueron hospitalizadas al menos una noche en el último año iba creciendo: el porcentaje más alto se encontró en las personas de más de 75 años, con un 9,3% (media de ingresos hospitalarios 1,5 veces por personas de más de 75 años).

El porcentaje más alto de personas que estuvieron ingresadas alguna noche en el último año se produjo en Almería (8,8%) y Jaén (8,6%), y el más bajo en Huelva (4,4%). La media más alta de hospitalizaciones por persona fue en Almería (1,8 veces), mientras que el resto de provincias osciló entre 1,1 y 1,3 veces.

Las personas con estudios secundarios fueron hospitalizadas en menor proporción (5,7%) y en mayor las que tenían estudios primarios o universitarios (6,5% y 6,4%, respectivamente). La media de hospitalizaciones fue superior en personas con estudios primarios (1,4 veces estudios primarios, 1,2 veces estudios secundarios o universitarios).

Los residentes en Andalucía con ingresos mensuales superiores a 2.500€ fueron hospitalizados en el último año en menor proporción (6,6% ingresos menores de 1.000€, 6% ingresos entre 1.000€-1.499€, 6,5% ingresos entre 1.500€-2.499€ y 3,9% ingresos superiores a 2.500€). El número medio de hospitalizaciones fue de 1,4 veces para los que tenían ingresos mensuales superiores a 2.500€ y de 1,3 veces para los que tenían ingresos inferiores.

La población residente andaluza de clase media (7,7%) obtuvo en porcentaje más alto de hospitalizaciones, seguida de las clases superiores (6,6) y las clases inferiores (6,2%). La media de hospitalizaciones para las clases sociales más bajas fue de 1,3 veces, mientras que para las clases media o altas fue de 1,2 veces.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

El porcentaje de residentes andaluces mayores de 16 años hospitalizados al menos una noche en el último año descendió un 2% en el año 2007, aumentó casi un 2% en 2011 y volvió a descender levemente en 2015. El número medio de hospitalizaciones no varió respecto a años anteriores, sin distinguir sexo, edad o nivel socioeconómico.

En los distintos grupos etarios el porcentaje de hospitalizados al menos una noche en el último año ha decrecido: es más perceptible dicho cambio en los andaluces de 45 a 54 años. La media de hospitalizaciones disminuyó en todos los grupos de edad, excepto en personas de 45 a 54 años, donde aumenta.

Resultados

Almería hasta el año 2011 tuvo el mayor aumento en el porcentaje de al menos una hospitalización, descendiendo de nuevo en 2015, mientras que el resto de provincias han seguido una tendencia decreciente desde el año 2003. El mayor descenso de hospitalizaciones en el último año se observó en la provincia de Sevilla. En cuanto al número medio de hospitalizaciones no hubo cambios notables en las distintas provincias, excepto en la de Almería, donde pasa de una media de 1,2 veces en 1999 a 1,8 veces en 2015.

Según el nivel socioeconómico, el descenso superior desde 1999 se produjo en los que tenían peor situación socioeconómica (estudios primarios, ingresos mensuales inferiores a 1.000€ y clases sociales más desfavorecidas).

Resultados

Frecuencia




Ilustración 342. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 343. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Ingresado al menos una noche




Ilustración 344. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Ingresado al menos una noche




Ilustración 345. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 346. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 347. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Número medio de hospitalizaciones




Ilustración 348. Número medio de hospitalizaciones en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 349. Número medio de hospitalizaciones en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Número medio de hospitalizaciones




Ilustración 350. Número medio de hospitalizaciones en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Número medio de hospitalizaciones



Ilustración 351. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Número medio de hospitalizaciones



Ilustración 352. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Número medio de hospitalizaciones




Ilustración 353. Número medio de hospitalizaciones en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Utilización de servicios de urgencias: Frecuencia

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

Durante el periodo 2015-2016 el 18,9% de la población andaluza (16,5% hombres y 21,2% mujeres) acudió alguna vez a algún servicio de urgencias en el año previo a la encuesta. Estos servicios en un 92,8% pertenecían a la seguridad social, sin que se dieran diferencias entre hombres y mujeres.

Las personas que más demandaron el servicio se encontraban en las edades extremas (22,8% de 16 a 24 años y 20,9% de 75 o más años). El servicio era eminentemente de carácter público (entre el 92% y 94%). Las personas con edades comprendidas entre 45 y 64 años fueron quienes utilizaron en menor proporción el servicio de urgencias (alrededor del 16%).

En Almería (33%) se utilizó en mayor frecuencia el servicio de urgencias; por el contrario, en Huelva (13,4%) y Córdoba (13,2%) fue donde menos se utilizó. El servicio de urgencias que más utilizaron en las distintas provincias fue el público: menos utilizado en Sevilla (87,8%) y Málaga (89,1%) y más en Almería (96,1%).

Según el nivel socioeconómico, los residentes andaluces con estudios secundarios (18,4%) o con ingresos mensuales entre 1.000€ y 1.499€ (15,8%) lo utilizan menos que el resto de categorías (19,5% ingresos inferiores a 1.000€, 15,8% ingresos entre 1.000€-1.499€, 16,5% ingresos entre 1.500€-2.499€ y 16,6% ingresos superiores a 2.500€). Las clases sociales superiores acudieron a urgencias en menor proporción, aumentando estos porcentajes conforme desciende la clase social. En cuanto a los residentes que utilizaron el servicio público de urgencias, se constata una tendencia a aumentar su uso si el nivel de estudios, de ingresos y la clase social son más bajos.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 hasta 2007 el porcentaje de personas que han utilizado algún servicio de urgencias fue muy parecido. Sin embargo, entre 2007 y 2011 aumentó (20,7% en 2007 y 24,2% en 2011), para descender en 2015 (18,9%). Estos cambios se produjeron tanto para hombres como para mujeres.

Por grupo etario el porcentaje de utilización del servicio de urgencias se mantuvo estable hasta 2007 en las personas menores de 45 años, creciendo el mismo en 2011. En cuanto a las personas de 45 a 64 años sufrió ligeros altibajos los años 2003 y 2011. Por otro lado, las personas mayores de 65 a 74 años mostraron una tendencia a aumentar el porcentaje de los que acudían a urgencias desde 1999 hasta 2007, año en que comienza a descender. Por último, este porcentaje tiende a crecer en las personas de 75 o más años hasta 2011. En todos los grupos de edad descendió el uso del servicio de urgencias en el año 2015.

Resultados

En Almería se produjo la mayor oscilación -de crecimiento y decrecimiento- en el porcentaje de residentes que acudieron al servicio de urgencias a lo largo de estos años (aumenta un 15,5% en 2003, se reduce a la mitad en 2007, se vuelve a duplicar en 2011 y desciende levemente en 2015). En cuanto a las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva los mayores cambios los experimentaron en 2011, donde aumentaron los porcentajes, y en 2015, año en el que descienden. En Málaga se produjo el mayor cambio en 2015, con un descenso del 10%.

En las clases sociales más bajas o con menor nivel de estudios es más notable el crecimiento del uso de los servicios de urgencias en 2011, y el decrecimiento en 2015. En el nivel socioeconómico más alto ha descendido el uso de servicios públicos.

Resultados

Frecuencia




Ilustración 354. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 355. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Utilización de algún tipo de servicio de urgencias




Ilustración 356. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Utilización de algún tipo de servicio de urgencias




Ilustración 357. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Utilización de algún tipo de servicio de urgencias



Ilustración 358. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Utilización de algún tipo de servicio de urgencias




Ilustración 359. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Tipo de servicio usado




Ilustración 360. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 361. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Servicio de urgencias de la Seguridad Social




Ilustración 362. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Servicio de urgencias de la Seguridad Social




Ilustración 363. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 364. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 365. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consultas odontológicas: Tipo de dentista visitado

V Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 más del 88% de la población residente en Andalucía que acudió al dentista lo hizo en una consulta privada (88,8% hombres y 88,1% mujeres). El 9,2% de los hombres y el 8,9% de las mujeres acudieron a un dentista de la seguridad social. Las mujeres (3%) tuvieron mayor preferencia por una sociedad médica que los hombres (1,8%).

Las personas de 16 a 24 años (12,7%) y las mayores de 65 años (10,5%) fueron quienes más visitaron al dentista de la seguridad social. Las sociedades médicas fueron más visitadas por las personas de 45 a 54 años (3,8%) y el dentista privado recibió más visitas de las personas mayores de 25 años.

Más del 80% de la población residente de cada provincia acudió al dentista privado; entre un 5% y un 13% de personas acudió al dentista de la seguridad social, y entre un 1% y un 4% visitó dentistas de sociedades médicas, sin diferencias apreciables entre provincias.

Los residentes andaluces con mejor situación socioeconómica (mayor nivel de estudios, mayores ingresos y clases sociales más altas) fueron en mayor proporción al dentista de una sociedad médica, descendiendo esta proporción conforme empeora su situación. Los a los que fueron más a un dentista de la seguridad social tenían un peor nivel socioeconómico. No se encontraron diferencias notables (según nivel de estudios, ingresos mensuales o clase social) entre aquellos que acudieron al dentista privado.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, el porcentaje de personas que acudieron al dentista de la seguridad social o de las sociedades médicas aumentó desde 2007, volviendo a descender en 2015: en mayor proporción en la seguridad social que en las sociedades médicas. La asistencia al dentista privado sufrió una disminución, tanto por parte de los hombres como de las mujeres, en el año 2011 y un leve aumento en el año 2015.

Las tendencias anteriores en la asistencia al dentista de la seguridad social, sociedades médicas y privado, suceden también para los diferentes grupos etarios, provincias, niveles de estudios, de ingresos y clase social. Los cambios en los porcentajes de los que asisten a dentistas de sociedades médicas o dentistas privados, son menos pronunciados en las personas con estudios universitarios, en las de mayores ingresos mensuales y en las de de clase social alta.

Resultados

Tipo de dentista visitado




Ilustración 366. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Tipo de dentista visitado




Ilustración 367. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 368. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 369. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 370. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 371. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 372. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 373. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Consumo de medicamentos

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 más de la mitad de la población residente en Andalucía (56,8%) consumió algún tipo de medicamento durante las dos semanas previas a la realización de la encuesta: el porcentaje fue mayor en las mujeres (63,2%) que en los hombres (50,2%).

Con respecto al grupo etario, aumentó el consumo de medicamentos conforme aumentó la edad del grupo (de un 32,5% de personas entre 16 y 24 años a un 93% de personas de 75 o más años).

Granada (67,1%) y Almería (64,5%) son las provincias donde se registró el mayor consumo de medicamentos. En el resto de las provincias los porcentajes se movieron entre el 50% y el 57%.

Los residentes andaluces con estudios primarios (68,1%), con ingresos inferiores a 1.000€ (64,7%) y los pertenecientes a clases sociales inferiores (57,3%) son los que consumieron en mayor proporción medicamentos. Se da una tendencia a disminuir el consumo de medicamentos cuando mejora el nivel socioeconómico.

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 hasta 2011 el consumo de medicamentos en las dos semanas previas a la encuesta en la población residente andaluza aumentó, descendiendo en 2015. En los hombres el consumo de medicamentos se mantuvo desde 2011; en las mujeres bajó en 2015. En cuanto a la edad del encuestado, en todos los rangos de edad creció el consumo de medicamentos hasta 2011: un 13% para las personas de 25 a 44 años y un 10% para las que tenían de 45 a 54 años. Sin embargo, estos valores decrecieron (entre el 2% y el 7%) en todos los rangos en 2015.

La tendencia anterior se repite, en general, por provincias: aumento en 2011 entre el 11% y el 15%, y disminución entre el 7% y el 15% en 2015), excepto en la provincia de Granada, donde en el año 2015 siguió creciendo el porcentaje de personas que tomaron medicamentos en las dos semanas previas a la encuesta.

Según el nivel de estudios, también se observa un mayor consumo de medicamentos en las dos semanas previas a la encuesta en 2011 y un menor consumo en 2015. Destacan las personas que tenía estudios primarios o secundarios, quienes incrementaron su consumo entre el 10% y el 12% entre 2007 y 2011. En lo referente al nivel de ingresos del encuestado, los que tenían ingresos mensuales superiores a 2.500€ tendieron a consumir más medicamentos desde el año 2007, mientras que en el resto de los grupos bajó el consumo a partir de 2011. En los grupos intermedios (ingresos entre 1.000€-1.499€ e ingresos entre 1.500€-2.499€) los cambios producido son más notables. En la clase media y baja

Resultados

hubo una tendencia a consumir cada vez más medicamentos hasta 2011, mientras que en las clases superiores se mantuvieron los porcentajes hasta 2007, con un aumento del 8,2% en 2011.

Resultados




Ilustración 374. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 375. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 376. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 377. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 378. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 379. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados

Cobertura sanitaria

V Encuesta Andaluza de Salud de 2015-2016

En el periodo de estudio 2015-2016 el 4% de las personas encuestadas residentes en Andalucía tenía doble cobertura sanitaria: el 3,6% de hombres y el 4,3% de mujeres.

La franja de edad con el mayor porcentaje de personas con doble cobertura sanitaria fue de 25 a 44 años (5,3%), disminuyendo progresivamente hasta llegar al 1,8% en las personas de 75 o más años.

Granada (7%) y Almería (6,3%) fueron las provincias donde mayor porcentaje de hombres y mujeres tenían doble cobertura sanitaria frente a Córdoba (0,7%), Huelva (0,9%) y Cádiz (1,1%), que presentaban el menor porcentaje.

Los mayores porcentajes de residentes andaluces con doble cobertura sanitaria se dieron en las personas con mayor nivel de estudios (1,6% para estudios primarios, 12,5% para estudios universitarios), mayor nivel de ingresos (1,1% para ingresos inferiores a 1.000€, 18% para ingresos superiores a 2.500€) y pertenecientes a clases sociales superiores (2,3% para las clases inferiores, 12,8% para las clases más altas).

Evolución desde la I Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales (según sexo, grupo de edad, provincias, estudios, ingresos y clase social), desde el año 1999 la población andaluza tiene cada vez menos doble cobertura sanitaria, registrándose el descenso más acusado del año 2007 al 2011. Además, entre los hombres el cambio es más notable que entre las mujeres. Por grupo etario, los menores de 25 años y los mayores de 55 años reducen casi a la mitad sus porcentajes desde 1999.

Según la provincia de residencia del encuestado, en Granada, Jaén y Sevilla se produjo un aumento de personas con doble cobertura sanitaria (de un 5,4% en 1999 a un 7% en 2015; de un 1,6% en 1999 a un 2,3% en 2015 y de un 4,4% en 1999 a un 5,6% en 2015, respectivamente). En la provincia de Córdoba la disminución de personas con doble cobertura fue la más acusada (10,3% en 1999 y 0,7% en 2015).

En todos los niveles de estudios, ingresos y clase social de 2007 a 2011 decrece el número de personas con doble cobertura sanitaria. Aunque, en los residentes andaluces con el perfil socioeconómico más favorable (estudios universitarios, mayores ingresos y clases altas) aumentó el porcentaje de personas con doble cobertura sanitaria, mientras que en el resto de grupos siguió disminuyendo.

Resultados




Ilustración 380. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 381. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 382. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 383. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Resultados




Ilustración 384. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007, 2011 Y 2015.




Ilustración 385. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007, 2011 Y 2015.

Bibliografía

Sánchez-Cruz JJ., García LI. y Mayoral JM. 2016. V Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016 de Adultos. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz JJ., García LI. y Mayoral JM. 2012. IV Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012 de Adultos. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 2007. III Encuesta Andaluza de Salud 2007 de Adultos. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 2003. II Encuesta Andaluza de Salud 2003 de Adultos. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 1999. I Encuesta Andaluza de Salud 1999 de Adultos. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Anexo A

Anexo A: Cuestionario 2015

Cuestionario EAS 2015. Adultos



Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD

AÑO 2.015

D-3895

CUESTIONARIO NÚMERO

--	--	--	--



ADULTOS

RUTA:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				DISTRITO:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			SECCIÓN:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
MUNICIPIO:	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				PROVINCIA:	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>					

Buenos días/tardes, soy ..., entrevistador/a para la empresa DEMOMETRICA. En estos momentos estamos realizando la V Encuesta Andaluza de Salud por encargo de la Junta de Andalucía a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La encuesta va dirigida a conocer el estado de salud de la población andaluza y su utilización de servicios sanitarios. La **carta de presentación** que le muestro contiene una breve información introductoria de los objetivos de la encuesta, junto a la solicitud de su colaboración en la misma respondiendo a un sencillo cuestionario.

Entregar carta de presentación

La selección de los hogares a los que se solicita la colaboración voluntaria en el estudio es estrictamente aleatoria, por lo que su colaboración resulta especialmente valiosa. Toda la información que Vd. nos facilite está sujeta a las especificaciones de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus modificaciones posteriores. Los datos que le solicitamos se tratarán informáticamente para realizar análisis estadísticos de una forma totalmente ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales.

GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN

COMPOSICIÓN DEL HOGAR:

- HOGAR:** Persona o conjunto de personas que conviven/ocupan en común la vivienda seleccionada, o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.
- MIEMBROS DEL HOGAR:** Se consideran miembros del hogar todas las personas que, sin ocupar otra vivienda principal, dependen económicamente del hogar seleccionado.
- CABEZA DE FAMILIA:** Se considera cabeza de familia, el miembro del hogar que aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar.

Cuestionario EAS 2015. Adultos

EN PRIMER LUGAR, LE VAMOS A REALIZAR VARIAS PREGUNTAS REFERIDAS A USTED Y A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTA CASA:

P.1. DÍGANOS, POR FAVOR, ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN ESTA CASA DE MANERA HABITUAL? (contando a la persona entrevistada)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 personas

P.2. TABLA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR: (Entrevistador/a: Describa para cada miembro del hogar las características que se relacionan en la tabla adjunta, ordenando según edad)

MIEMBROS DEL HOGAR:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P.2. Sexo, edad (en años cumplidos), parentesco con la persona entrevistada y situación laboral										
Sexo:										
▪ Hombre	<input type="checkbox"/> 1									
▪ Mujer	<input type="checkbox"/> 2									
Edad: (Si edad < 1 año, poner "0", preguntar meses e indicarlo abajo)										
Meses										
CABEZA DE FAMILIA (Persona que aporta más ingresos al hogar)	<input type="checkbox"/>									
IDENTIFICACIÓN PERSONA A ENTREVISTAR EN EL HOGAR:	<input type="checkbox"/>									
Parentesco con la persona a entrevistar:										
▪ Esposo/a o pareja	<input type="checkbox"/> 1									
▪ Hijo/a	<input type="checkbox"/> 2									
▪ Padre o madre. Suegro/a	<input type="checkbox"/> 3									
▪ Abuelo/a	<input type="checkbox"/> 4									
▪ Nieto/a	<input type="checkbox"/> 5									
▪ Hermano/a	<input type="checkbox"/> 6									
▪ Yerno/Nuera	<input type="checkbox"/> 7									
▪ Otros familiares	<input type="checkbox"/> 8									
▪ Otros no familiares	<input type="checkbox"/> 9									
▪ No sabe / No contesta	<input type="checkbox"/> 0									
Situación laboral:										
▪ Trabaja	<input type="checkbox"/> 1									
▪ Paro	<input type="checkbox"/> 2									
▪ Estudia	<input type="checkbox"/> 3									
▪ Ama/o de casa	<input type="checkbox"/> 4									
▪ Jubilado/a	<input type="checkbox"/> 5									
▪ Otros	<input type="checkbox"/> 6									
▪ No lo sabe, no está seguro	<input type="checkbox"/> 7									
▪ No contesta	<input type="checkbox"/> 8									
P. 2a. ¿Presenta una o varias de las condiciones que voy a leerle? (señalar tantas opciones de respuesta como declare el encuestado)										
▪ Padecer alguna enfermedad crónica	<input type="checkbox"/> 1									
▪ Padecer problemas de nervios, depresión o trastorno mental	<input type="checkbox"/> 2									
▪ Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo físico	<input type="checkbox"/> 3									
▪ Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo sensorial	<input type="checkbox"/> 4									
▪ Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo psíquico o mental	<input type="checkbox"/> 5									
▪ No lo sabe, no está seguro	<input type="checkbox"/> 7									
▪ No contesta	<input type="checkbox"/> 8									
P. 2aa. ¿El tiempo con la limitación, discapacidad o minusvalía es superior a 6 meses?										
▪ Sí	<input type="checkbox"/> 1									
▪ No	<input type="checkbox"/> 2									
▪ No lo sabe, no contesta	<input type="checkbox"/> 9									

Cuestionario EAS 2015. Adultos

(Continuación)										
MIEMBROS DEL HOGAR:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P. 2b. ¿Requiere algún tipo de dedicación o de cuidados especiales? (Entrevistador/a: esta pregunta debe realizarse para todas las personas con algún código 1 a 5 en P.2a, y para todos los miembros menores de 16 años o mayores de 64 años, aunque no cumplan ninguna de las condiciones de P.2a)										
▪ Sí	<input type="checkbox"/> 1									
▪ No	<input type="checkbox"/> 2									
▪ No lo sabe, no está seguro	<input type="checkbox"/> 8									
▪ No contesta	<input type="checkbox"/> 9									
SÓLO PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR CON CÓDIGO 1 EN P.2b y PARA TODOS LOS MIEMBROS MENORES DE 16 AÑOS ó MAYORES DE 64 AÑOS										
P. 2c. Y, ¿quién se encarga <u>HABITUALMENTE</u> de su cuidado? (nos referimos a la persona que se ocupa con más frecuencia y/o dedica más tiempo a cuidar a la persona referenciada), (marcar una sola opción de respuesta por cada miembro del hogar que requiere cuidados)										
▪ Habitualmente se cuida él/ella mismo/a	<input type="checkbox"/> 1									
Habitualmente lo/la cuido yo (la persona entrevistada):										
▪ Yo solo/sola	<input type="checkbox"/> 2.1									
▪ Mi pareja y yo	<input type="checkbox"/> 2.2									
▪ Yo, junto a otra persona que no es mi pareja	<input type="checkbox"/> 2.3									
▪ Otra opción	<input type="checkbox"/> 2.4									
▪ Habitualmente lo cuida otra persona que no reside en el hogar	<input type="checkbox"/> 3									
▪ Habitualmente lo cuida otra persona del hogar	<input type="checkbox"/> 4									
En caso de que el cuidador sea otra persona del hogar anotar el número de miembro que le corresponde en el cuadro										

HACER P.2d y P.2e SÓLO SI LA PERSONA ENTREVISTADA **CUIDA A ALGUIEN DEL HOGAR** (ES DECIR, QUE SE HAYA MARCADO ALGUNA "X" EN P2C EN LA OPCIÓN "HABITUALMENTE LO CUIDO YO (LA PERSONA ENTREVISTADA)"). RESTO, PASAR DIRECTAMENTE A P2f.

P.2d. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a cuidar a las personas de esta casa que lo necesitan? (nos referimos a tareas como prestar ayuda para el aseo, la alimentación, vestirse, dar medicinas, etc.)

- De lunes a viernes (por día) ▪ NS/NC 99
- Fines de semana (por día) ▪ NS/NC 99

P.2e. ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en el cuidado de esta/s persona/as? (admite respuesta múltiple)

- Sí, una persona contratada para ello 1
- Si, profesionales de los servicios sociales o sanitarios 2
- Si, otras personas(familiares, Amigos/as, vecinos/as, otros) ... 3
- No, no viene ninguna persona ... 4
- No contesta 9

A TODOS/AS

P.2f. ¿Se encarga habitualmente del cuidado de alguna persona fuera del hogar (en otro domicilio) sin percibir ningún tipo de remuneración por ello?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.2g. ¿Cuántas horas diarias dedica usted a cuidar de esas personas fuera del hogar?

- De lunes a viernes (por día) ▪ NS/NC 99
- Fines de semana (por día) ▪ NS/NC 99

A TODOS/AS

P.3a. En su casa, ¿quién se ocupa principalmente de las tareas domésticas tales como fregar, planchar, cocinar, etc.? (una sola respuesta)

- Yo solo/a 1
- Mi pareja 2
- Mi pareja y yo 3
- Yo, junto a otra persona que no es mi pareja 4
- Otra persona de la casa que no es mi pareja 5
- Una persona contratada (que cobra por ello) 6
- Otra situación 7
- No sabe / No contesta 9

→ **Nº de persona del hogar:**

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.3b. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a las tareas de la casa tales como fregar, planchar, cocinar, etc., de lunes a viernes?, ¿Y durante los fines de semana?

- De lunes a viernes (por día) ▪ NS/NC 99
- Fines de semana (por día) ▪ NS/NC 99

P.3c. ¿Tiene alguna persona de fuera de la casa que ayude a realizar las tareas domésticas?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.4a. ¿La vivienda que usted ocupa es de propiedad o de alquiler?

- De propiedad 1
- De alquiler 2
- Otra situación, especificar 3
-
- NS/NC 9

P.4b. ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda? (no contar la cocina, los baños/lavabos o el comedor/sala de estar)

- Habitaciones
- NS/NC 99

P.4c. ¿Cuáles son las instalaciones con las que cuenta su vivienda?

	Sí	No
▪ Agua corriente	1	2
▪ Agua caliente.....	1	2
▪ Ascensor	1	2
▪ Refrigeración (aire acondicionado, aparatos móviles, NO ventiladores)	1	2

P.4d. ¿De qué tipo de calefacción dispone su vivienda?

- Calefacción colectiva 1
- Calefacción individual (se excluyen aparatos que permiten calentar alguna habitación, como radiadores eléctricos)..... 2
- No tiene instalación de calefacción pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (ej: radiadores eléctricos). 3
- No tiene calefacción 4

P.4e. ¿Tiene Vd. falta de espacio en su vivienda?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.4f. ¿Posee/tiene Vd. otra vivienda que se pueda utilizar como residencia aunque no la utilice habitualmente?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.5a. La siguiente pregunta se refiere a aspectos del medio ambiente del barrio o zona donde usted reside. Referido al último año, considera usted que

	Mucho	Algo	Nada	NS/NC
▪ El ruido procedente del exterior de su vivienda le resulta molesto	1	2	3	9
▪ Su vivienda sufre de malos olores procedentes del exterior	1	2	3	9
▪ En el barrio donde usted vive la contaminación del aire es elevada	1	2	3	9
▪ Su barrio se encuentra afectado por alguna industria contaminante	1	2	3	9
▪ En el barrio donde usted vive hay espacios verdes suficientes	1	2	3	9
▪ En el barrio donde usted vive hay delincuencia/inseguridad	1	2	3	9
▪ En el barrio donde usted vive hay tráfico intenso de vehículos de motor.....	1	2	3	9

P.5b. En general, la calidad del medio ambiente de su barrio es ...

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3
- Mala 4
- Muy mala 5
- NS/NC 9

P.6. ¿Tienen ustedes coche? (para uso personal, no profesional exclusivamente)

- Uno 1
- Dos 2
- Más de dos 3
- Ningún coche 4
- NS/NC 9

Las preguntas que siguen se refieren a lo que Vd. piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto

P.7. En general, usted diría que su salud es ... (una sola respuesta)

- Excelente 1
- Muy buena 2
- Buena 3
- Regular 4
- Mala 5
- No sabe/no está seguro 8
- Se negó 9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.8. Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades o cosas que usted podría hacer un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas?. En caso afirmativo, ¿cuánto?

	Sí, me limita MUCHO	Sí, me limita UN POCO	No, no me limita NADA
▪ Esfuerzos moderados como mover una mesa, pasa la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora	1	2	3
▪ Subir varios pisos por la escalera	1	2	3

P.9. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física?

	Sí	No
▪ ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?	1	2
▪ ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?	1	2

P.10. Durante las últimas 4 semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

	Sí	No
▪ ¿Hizo menos de lo que hubiera querido por algún problema emocional?	1	2
▪ ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre por algún problema emocional?	1	2

P.11. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

- Nada 1
- Un poco 2
- Regular 3
- Bastante 4
- Mucho 5

P.12. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ...

	Siempre	Casi Siempre	Muchas Veces	Algunas Veces	Sólo alguna vez	Nunca
▪ Se sintió calmado y tranquilo?	1	2	3	4	5	6
▪ Tuvo mucha energía?	1	2	3	4	5	6
▪ Se sintió desanimado y triste?	1	2	3	4	5	6

P.13. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?

- Siempre 1
- Casi siempre 2
- Algunas veces 3
- Sólo alguna vez 4
- Nunca 5

Cuestionario EAS 2015. Adultos

- P.14. En la tarjeta que voy a enseñarle aparecen una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho un/a profesional de la salud (médico/a, enfermero/a) que usted padece actualmente alguna de ellas? (Entrevistador/a: Mostrar TARJETA A). Si responde "SI" hacer P.14a, P.14b y p14c:**
P.14a. ¿Recibe medicación u otro tipo de terapia por ello?
P.14b. ¿Esa condición le limita alguna de sus actividades?
P.14c. ¿Cuánto tiempo hace que se la diagnosticaron?

ENFERMEDAD CRÓNICA	P.14			P.14a		P.14b		P.14c		
	¿Le ha dicho un/a profesional de la salud si tiene esta condición? (si es 'No', saltar a la siguiente)			¿Recibe medicación u otro tipo de terapia por ello?		¿Esa condición le limita alguna de sus actividades?		¿Cuánto tiempo hace que se la diagnosticaron?		
	Sí	No	No lo sabe	Sí	No	Sí	No	Últimos 12 meses	De 1 a 4 años	Más de 4 años
1. Cáncer (tumor maligno, incluido leucemia, linfoma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Diabetes/azúcar alta en sangre/azúcar en orina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Hipertensión/presión arterial alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Colesterol alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Colitis y enfermedades crónicas intestinales/ Enf. inflamatoria intestinal/ Enfermedad de Crohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Úlcera de estómago/duodeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Estreñimiento crónico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Enfermedad crónica del pulmón / enfisema / bronquitis crónica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Asma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Trastornos cardíacos/insuficiencia cardíaca /insuficiencia cardíaca congestiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Infarto de miocardio/ataque al corazón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Angina/dolor de pecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Dolor de espalda, cuello, hombro, cintura (cervical/lumbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fibromialgia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Problemas crónicos de la piel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Alergias crónicas (como rinitis, inflamación de ojos, dermatitis, alergia a los alimentos, etc), asma alérgica excluida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Anemia u otra enfermedad de la sangre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Mala circulación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Varices en las piernas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Hemorroides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Migrañas/Jaquecas/ Cefaleas crónicas / dolor de cabeza frecuente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Accidente cerebrovascular/hemorragia cerebral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Trastornos depresivos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Trastornos de ansiedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Otros problemas mentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Hipoacusia / problemas de audición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Cataratas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Artritis o reumatismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Osteoporosis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Cirrosis/enfermedad del hígado / disfunción hepática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Enfermedad del riñón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Incontinencia urinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Esterilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. (SÓLO HOMBRES) Trastornos de próstata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. (SÓLO MUJERES) Dolor menstrual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Continúa)										

Cuestionario EAS 2015. Adultos

¿Tiene alguna otra condición crónica que no haya sido mencionada antes? Si es así, por favor especifíquelas:	P.14			P.14a		P.14b		P.14c		
	¿Le ha dicho un/a profesional de la salud si tiene esta condición? (si es 'No', saltar a la siguiente)			¿Recibe medicación u otro tipo de terapia por ello?		¿Esa condición le limita alguna de sus actividades?		¿Cuánto tiempo hace que se la diagnosticaron?		
	Sí	No	No lo sabe	Sí	No	Sí	No	Últimos 12 meses	De 1 a 4 años	Más de 4 años
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACCIDENTES

P.15. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido usted algún accidente que le haya causado heridas o lesiones suficientes para limitar su actividad normal y/o para necesitar asistencia sanitaria?

- Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?

 No 2 ⇒ **Pasar a P.16**

P.15a. ¿Y en los últimos tres meses?

- Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?

 No 2

P.15b. Refiriéndonos en concreto al **ÚLTIMO ACCIDENTE**, ¿dónde tuvo **LUGAR**?

- En su casa 1
- En su centro de formación 2
- En su centro de trabajo 3
- En un lugar de recreo, deporte 4
- En una vía pública, calle, edificio público, edificio comercial, etc. Que no sea accidente de tráfico 5
- En la vía pública; accidente de tráfico como conductor 6
- En la vía pública: accidente de tráfico como pasajero 7
- En la vía pública: accidente de tráfico como peatón 8
- En otro lugar, especificar 9

.....

P.15c. ¿Cuál es la **PRINCIPAL LESIÓN O DAÑO** que le produjo este accidente?

- Envenenamiento o Intoxicación (no alimentarias) .. 1
- Quemaduras 2
- Fracturas 3
- Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones . 4
- Heridas profundas 5
- Otros daños 6
- N/C 9

P.15d. Como consecuencia de este último accidente, ¿**TUVO QUE** ... ?

- Ser ingresado en un hospital o clínica 1
- Acudir a un servicio de urgencias de un hospital o clínica 2
- Consultar a un médico o enfermera (fuera de un hospital o clínica) 3
- No fue necesaria ninguna atención sanitaria 4
- N/C 9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

A TODOS/AS. CONSUMO DE MEDICAMENTOS Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

P.16. Y en las últimas 2 semanas, ¿ha utilizado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.17
- N/C 9 ⇒ Pasar P.17

P.16a. ¿Qué tipo de medicamento? (entrevistador/a: Mostrar TARJETA B y anotar todos los que cite)

P.16b. Para los medicamentos consumidos, ¿fueron recetados por el médico?

	P.16a CONSUMIDO		P.16b RECETADO	
	Sí	No	Sí	No
▪ Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios.....	1	2	1	2
▪ Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre	1	2	1	2
▪ Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	1	2	1	2
▪ Antibióticos	1	2	1	2
▪ Tranquilizantes, sedantes	1	2	1	2
▪ Pastillas para dormir	1	2	1	2
▪ Medicamentos antidepresivos	1	2	1	2
▪ Medicamentos para la alergia	1	2	1	2
▪ Medicinas para el reuma	1	2	1	2
▪ Medicinas para el corazón	1	2	1	2
▪ Medicinas para la tensión arterial	1	2	1	2
▪ Medicamentos para la diabetes	1	2	1	2
▪ Medicinas para alteraciones digestivas	1	2	1	2
▪ Medicamentos para bajar el colesterol	1	2	1	2
▪ Hormonas para la menopausia (sólo a mujeres).....	1	2	1	2
▪ Anticonceptivos (sólo a mujeres)	1	2	1	2
▪ Otros (especificar)	1	2	1	2
▪	1	2	1	2

A TODOS/AS

P.17. Durante los últimos doce meses, hasta el día de ayer, ¿ha acudido a algún Centro de Salud (Consultorio) o Ambulatorio (Centro de Especialidades) de la Seguridad Social/SAS (Servicio Andaluz de Salud) por algo que le pasaba a USTED o acompañando a otra persona?

- Sí, por algo que le pasaba a usted 1
- Sí, por algo que le pasaba a otra persona (familiar, conocido, etc.)..... 2
- Sí, por ambos motivos 3
- No, no he acudido en los últimos doce meses pero sí anteriormente 4
- No, nunca he ido a un Centro de Salud o Ambulatorio de la S. Social/SAS 5
- N/C 9

P.17a. Y, ¿ha CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO (público o privado) por algún problema, molestia o enfermedad suya EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS? Nos referimos a una verdadera consulta, no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.17h
- N/C 9 ⇒ Pasar P.17h

P.17b. ¿Cuántas veces ha consultado al médico en las 2 últimas semanas?

_____ veces

- NS/NC 99

P.17c. Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo usted al médico? (conteste en relación con la última consulta)

- Centro de Salud/Consultorio 1
- Ambulatorio/Centro de Especialidades 2
- Consulta externa de un Hospital 3
- Servicio de Urgencia de un Ambulatorio 4
- Servicio de Urgencia de un Hospital 5
- Consulta del médico particular 6
- Consulta del médico de una sociedad 7
- Empresa o lugar de trabajo 8
- En el domicilio de usted 9
- Consulta telefónica 10
- Organizaciones no gubernamentales (ONG,s) ... 11
- Otros lugares 12
- NS/NC 99

P.17d. ¿Cuál fue el motivo principal de la última consulta o visita?

- Diagnóstico y tratamiento 1
- Revisión 2
- Planificación familiar 3
- Control de embarazo 4
- Rehabilitación 5
- Orientación y consejo, problemas familiares y/o sociales 6
- Expedición de recetas 7
- Emisión de partes de bajas, confirmación o alta 8
- Otras 98
- NS/NC 99

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.17e. El médico que consultó o visitó era (una sola respuesta)

- Médico general 1
- Otros 2

¿Cuál?

- Alergología 01
- Aparato digestivo 02
- Cardiología 03
- Cirugía general y digestiva 04
- Cirugía cardiovascular 05
- Cirugía vascular 06
- Dermatología 07
- Endocrinología y nutrición 08
- Geriatria 09
- Ginecología-obstetricia 10
- Internista 11
- Nefrología 12
- Neumología 13
- Neurocirugía 14
- Neurología 15
- Oftalmología 16
- Otorrinolaringología 17
- Oncología 18
- Psiquiatría 19
- Rehabilitación 20
- Reumatología 21
- Traumatología 22
- Urología 23
- Otros 24
- No sabe 88
- No contesta 99

P.17f. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar entre la solicitud de la consulta al centro sanitario y su celebración? (Entrevistador/a: si le dicen "en el mismo día" escriba "0" en el espacio días)

- años meses días
 ▪ NS/NC 99

P.17g. El médico al que acudió en esta última consulta realizada era ...

- De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas, Adeslas, Asisa) 2
- Médico privado/particular 3
- Mutua de su empresa o médico de su empresa... 4
- Otros 5
- NS/NC 9

(P.17h únicamente a los que respondieron 2 ó 9 en P.17a. Resto continuar en P.18)

P.17h. ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a usted?

- años meses
 ▪ Nunca ha ido al médico 97
 ▪ No recuerda 98
 ▪ NS/NC 99

A TODOS/AS

P.18 Durante los últimos 12 meses, es decir, desde (fecha de hace un año) ¿ha visitado para usted mismo/a un...?

	Sí	No	No sabe	N/C
• Laboratorio de análisis	1	2	8	9
• Centro o servicio de radiología	1	2	8	9
• Fisioterapeuta	1	2	8	9
• Enfermero/a, matrona (excluyendo las hospitalizaciones, atención domiciliaria, o en un laboratorio médico o centro de radiología)	1	2	8	9
• Psicólogo o psicoterapeuta	1	2	8	9

P.19. Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos 6 meses, ¿ha ido usted al dentista, protésico o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.19b
- N/C 9 ⇒ Pasar P.19b

P.19a ¿Cuántas veces?

- Veces ⇒ Pasar P.19c
 ▪ NS/NC 99

P.19b. Si no ha ido en los últimos 6 meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico o higienista dental?

- años meses
 ▪ Nunca he ido al dentista 97
 ▪ No recuerda 98
 ▪ NS/NC 99 } P.19e

P.19c. ¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Sí	No	N/C
▪ Revisión o chequeo	1	2	9
▪ Limpieza de boca	1	2	9
▪ Empastes (obturaciones)	1	2	9
▪ Extracción de algún diente o muela	1	2	9
▪ Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	1	2	9
▪ Tratamiento de las enfermedades de las encías	1	2	9
▪ Ortodoncia	1	2	9
▪ Selladores, aplicación de flúor ...	1	2	9
▪ Otros motivos	1	2	9

P.19d. El dentista al que consultó esta última vez era

- De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas, Adeslas, Asisa) 2
- Dentista privado/particular 3
- Otros especificar 4

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.19e. Ahora le voy a preguntar sobre su higiene dental, ¿cuántas veces al día se cepilla los dientes habitualmente?

- Ocasionalmente, no todos los días.. 1 ⇒ Pasar a P.20
- Nunca 2 ⇒ Pasar a P.20
- Una vez al día..... 3
- Dos veces al día..... 4
- Tres o mas veces al día..... 5 ⇒ Pasar a P.20
- No sabe 8
- No contesta 9

P.19f. ¿Y en qué momento del día acostumbra a cepillarse los dientes? (Entrevistador/a: anotar máximo 2 respuestas)

- Por la mañana 1
- Despues de comer 2
- Por la noche 3
- No sabe 8
- No contesta 9

A TODOS/AS

P.20. Durante los últimos doce meses, hasta el día de ayer, ¿ha estado usted ingresado en un hospital, al menos durante una noche?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.21
- N/C 9 ⇒ Pasar P.21

P.20a. ¿Cuántas veces ha estado usted hospitalizado en estos últimos doce meses?

- Veces
- NS/NC 99

P.20b. ¿Estuvo usted en la lista de espera por ese motivo?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.21
- N/C 9 ⇒ Pasar P.21

P.20c. ¿Cuánto tiempo en meses? (si menos de un mes contabilizar como "cero" meses)

- meses
- NS/NC 99

A TODOS/AS

P.21. En estos últimos doce meses, ¿ha tenido usted que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia, no de otro familiar?

- Sí, acudí a un centro o servicio 1
- Sí, acudieron a mi domicilio 2
- No 3 ⇒ P.22
- NS/NC 9 ⇒ P.22

P.21a. Y en total, ¿cuántas veces tuvo usted que utilizar algún servicio de urgencias en estos últimos 12 meses?

- Veces
- NS/NC 99

P.21b. Refiriéndonos a la última vez que utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, ¿dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a ...?

- Un hospital de la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- Un servicio de urgencias no hospitalario de la S.S./S.A.S. 2 } P.22
- Un servicio privado urgencia 3
- Un sanatorio, hospital o clínica privada 4
- Otras respuestas 5
- NS/NC 9

P.21c. ¿Por qué fue usted a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social?

- Se lo mandó el médico 1
- Usted, sus familiares lo consideraron necesario 2
- NS/NC 9

A TODOS/AS

P.22. ¿Podría decirme ahora, si es usted titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que le cito a continuación? (máximo 2 respuestas)

- Seguridad social 1
- Mutualidades del Estado (Muface, Isfas, etc.):
 - Acogidos a la Seguridad Social 2
 - Acogidos a un seguro privado 3
- Seguro Médico concertado individualmente (Sanitas, colegios profesionales, etc.) 4
- Seguro Médico concertado por su empresa 5
- No tengo seguro médico 6
- Otros 7
- NS/NC 9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

TABACO

P.23. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)? En caso de que fume o haya fumado, ¿a qué edad empezó a fumar?

	Tabaco	Hachis/ Marihuana
• Si, fuma diariamente	1	1
• Si, fuma pero no diariamente	2	2
• No fuma, pero ha fumado	3	3
• No fuma ni ha fumado nunca de manera habitual	4	4
• No contesta	9	9

Edad de inicio tabaco: años NC...99

Edad de inicio hachis/marihuana: años NC...99

P.24. Y durante las últimas dos semanas, ¿Ha fumado usted alguno de los siguientes TIPOS DE TABACO?

	SÍ	NO	NC
▪ Tabaco negro	1	2	9
▪ Tabaco rubio	1	2	9
▪ Mezcla de tabaco rubio y negro, picadura o tabaco de liar	1	2	9
▪ Mezcla de tabaco con marihuana o hachis	1	2	9
▪ Marihuana o hachis sin mezclar con tabaco	1	2	9
▪ Otros	1	2	9

FUMADORES: (Hacer P.24a y siguientes sólo a fumadores, dígito 1 y 2 en P.23). Resto, pasar a P.25

P.24a. ¿Qué cantidad de tabaco fuma usted por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

P.24b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

- Más 1
- Igual 2
- Menos 3
- NC 9

P.24c. Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar?

- Sí 1
- No 2
- No he acudido/consultado al médico 3
- NC 9

P.24d. ¿Ha intentado alguna vez dejar de fumar?

- Sí 1
- No 2 ⇒ P.24f
- NC 3 ⇒ P.24f

¿Cuántas veces?

P.24e. Y, ¿cuánto tiempo hace que intentó dejar de fumar? (si fueron varios intentos, de la última vez)

- Hace más de 5 años 1
- Entre 5 y 1 año 2
- Hace menos de 1 año 3
- NS 4

P.24f. ¿Le gustaría dejar de fumar?

- No 1
- Sí, le gustaría 2
- No lo ha pensado 3
- No lo sabe 4
- NC 9

EXFUMADORES: (Hacer P.25 hasta P.25b sólo a los exfumadores, dígito 3 en P.23). Resto, pasar a P.26

P.25. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar tabaco?

meses años

P.25a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión?

- Me lo aconsejó el médico 1
- Sentía molestias por causa del tabaco 2
- Aumentó mi preocupación por sus efectos nocivos 3
- Sentí que disminuía mi rendimiento psíquico o físico 4
- Lo decidí por propia voluntad 5
- Otros motivos 6

P.25b. ¿Qué cantidad de tabaco fumaba por término medio al día?

cigarrillos puros pipas

A TODOS/AS

P.26. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa?

- Sí 1
- No 2
- No procede (vive sola/o) 3
- NC 9

P.27. Fuera de casa, o del trabajo ¿cuánto tiempo al día, de media, pasa en ambientes cargados de humo de tabaco durante los días de diario? ¿y durante los fines de semana?

	Nunca	Menos de una hora	De 1 a 4 horas	Más de 4 horas	NS/NC
▪ Días de diario (de lunes a viernes)	1	2	3	4	9
▪ Fin de semana (sábado y domingo)	1	2	3	4	9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

A TODOS/AS: CONSUMO DE ALCOHOL

P.29. Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independiente de su graduación. ¿Consumes Vd. algún tipo de bebida alcohólica con una frecuencia de al menos una vez al mes?

- Sí 1
 - No consumo con una frecuencia de al menos una vez al mes, pero he consumido antes con esa frecuencia..... 2
 - No, nunca he consumido bebidas alcohólicas..... 3
 - NS/NC 9
- } Pasar P.33

P.29a. ¿Ha bebido usted en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

- Sí, diariamente 1
- Si, pero no diariamente.. 2
- No 3
- NS/NC 9

P.30. Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume?

	P.30.										N/C	P.30a. Nº vasos cada vez
	3-4 veces al día	2 veces al día	1 vez al día	5-6 veces semana	3-4 veces semana	1-2 veces semana	2-3 veces mes	1 vez mes	< 1/mes pero al menos 1 vez año	< 1 vez año o Nunca		
• Vino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Cerveza, sidra, tinto de verano ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Jerez, vermouth.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Champán, cava.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>

P.30a. ¿Cuál es la cantidad de vasos o copas que toma cada vez que bebe? _____

P.31. Para cada una de esas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluido viernes por la tarde), sólo en días laborables o en ambos indistintamente?

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	N/C
• Vino	1	2	3	9
• Cerveza, sidra, tinto de verano	1	2	3	9
• Jerez, vermouth	1	2	3	9
• Champán o cava.....	1	2	3	9
• Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, ..) ...	1	2	3	9
• Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)	1	2	3	9

P.31a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular?

(Entrevistador/a: no se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por sí solo)

años

P.32. ¿Ha pensando alguna vez que debería beber menos?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32a. ¿Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32b. ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.32c. ¿Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o para evitar la resaca?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

**A TODOS/AS:
SUENO Y EJERCICIO FÍSICO**

P.33. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme habitualmente?

horas

- NS/NC 99

P.33a Las horas que duerme, ¿le permiten descansar lo suficiente?

- Sí 1
- No 2
- N/S 8
- N/C 9

P.34. Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. De las siguientes, ¿cuál diría usted que describe mejor su actividad principal?

- Sentado la mayor parte de la jornada 1
- De pie la mayor parte sin grandes desplazamientos o esfuerzos 2
- Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 3
- Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 4
- NS/NC 9

P.34a. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre?. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre

- No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, TV., cine, etc.) ... 1
- Alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar, pasear en bici, jardinería, gimnasia suave, etc.) 2
- Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, etc.) ... 3
- Entrenamiento físico varias veces a la semana (incluye actividad física varias veces a la semana) 4
- NS/NC 9

P.34b. ¿Cuántos días a la semana practica normalmente durante **más de 30 minutos**? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

Nº de días/sem

- Caminar 1
- Una actividad física ligera como gimnasia suave, juegos que requieren poco esfuerzo y similares 2
- Una actividad física moderada como montar en bicicleta, gimnasia, aeróbic, correr, natación 3
- Entrenamiento físico deportivo como fútbol, baloncesto, ciclismo, natación de competición, judo, kárate o similares 4

IPAQ

P.34d1.

Piense en todas las actividades **INTENSAS** que usted realizó en los **últimos 7 días**. Las actividades físicas **INTENSAS** se refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico intenso y que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal. Piense *solo* en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos **10 minutos** seguidos.

Durante los **últimos 7 días**, ¿en cuántos realizó actividades físicas **INTENSAS** tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta?

Días por semana → P.34d2

Ninguna actividad física intensa 9 → P.34e1

P.34d2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física **INTENSA** en uno de esos días?

___/___ Horas por día ___/___ minutos por día

No sabe/No está seguro 99

P.34e1.

Piense en todas las actividades **MODERADAS** que usted realizó en los **últimos 7 días**. Las actividades **MODERADAS** son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado que lo hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piense *solo* en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos **10 minutos** seguidos.

Durante los **últimos 7 días**, ¿en cuántos días hizo actividades físicas **MODERADAS** como transportar pesos livianos, andar en bicicleta a velocidad regular o jugar dobles de tenis? **No incluya caminar**.

Días por semana → P.34e2

Ninguna actividad física moderada 9 → P.34f1

P.34e2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física **MODERADA** en uno de esos días?

___/___ Horas por día ___/___ minutos por día

No sabe/No está seguro 99

P.34f1.

Piense ahora en el tiempo que usted dedicó a **caminar en los últimos 7 días**. Esto incluye caminar en el trabajo o en la casa, para trasladarse de un lugar a otro, o cualquier otra caminata que usted podría hacer solamente para la recreación, el deporte, el ejercicio o el ocio.

Durante los **últimos 7 días**, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 minutos seguidos?

Días por semana → P.34f2

Ninguna caminata 9 → P.34g

P.34f2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días?

___/___ Horas por día ___/___ minutos por día

No sabe/No está seguro 99

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.34g.

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted **SENTADO** durante los días hábiles de los **últimos 7 días**. Esto incluye el tiempo dedicado al trabajo, en la casa, en una clase, y durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasó sentado ante un escritorio, visitando amigos, leyendo, viajando, o sentado o recostado mirando la televisión.

Durante los **últimos 7 días** ¿cuánto tiempo pasó **SENTADO** durante un día hábil?

___/___ Horas por día ___/___ minutos por día

No sabe/No está seguro 99

P.35. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

ALIMENTACIÓN

P.36. En relación a sus hábitos alimentarios ¿qué suele **desayunar** habitualmente?

- Café, leche, té, chocolate, cacao, yogur, etc..... 1
- Pan, tostadas, galletas, cereales, bollería, etc..... 2
- Fruta y/o zumo 3
- Alimentos como huevos, queso, jamón, etc..... 4
- Otro tipo de alimentos 5
- Nada, no suele desayunar 6
- Ns/Nc 9

P.36a. ¿Cuántos litros de agua bebe normalmente al día?

- Menos de medio litro 1
- De medio a 1 litro 2
- De 1 litro a litro y medio 3
- De 1 litro y medio a 2 litros 4
- Más de 2 litros 5
- N/C 9

P.36b. Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga con qué frecuencia los consume Ud. (MOSTRAR TARJETA C)

	A diario	Tres o más veces a la semana	Una/dos veces a la semana	Menos de 1 vez semana	Nunca o casi nunca	N/C
• Café, té,	1	2	3	4	5	9
• Leche y derivados (yogur, postres lácteos, queso, ...)	1	2	3	4	5	9
• Pan, cereales	1	2	3	4	5	9
• Legumbres (lentejas, judías, garbanzos)	1	2	3	4	5	9
• Pasta (fideos, macarrones, espaguetis, ...) arroz, patatas	1	2	3	4	5	9
• Fruta fresca (excluyendo zumos).....	1	2	3	4	5	9
• Zumos naturales de frutas o verduras	1	2	3	4	5	9
• Verduras, ensaladas y hortalizas	1	2	3	4	5	9
• Carne (pollo, ternera, cerdo, cordero, etc.).....	1	2	3	4	5	9
• Embutidos y fiambres.....	1	2	3	4	5	9
• Pescado	1	2	3	4	5	9
• Huevos	1	2	3	4	5	9
• Comida rápida (pollo frito, bocadillos, pizzas, hamburguesas)	1	2	3	4	5	9
• Refrescos con azúcar	1	2	3	4	5	9
• Dulces (galletas, mermelada, chocolate)	1	2	3	4	5	9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

A TODOS/AS: PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Las siguientes preguntas se refieren a prácticas preventivas en relación con la salud

P.37. Pasando a otro tema, querríamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña

- Sí 1 ⇒ **P.37a**
- No 2 ⇒ **P.38**
- NC 3 ⇒ **P.38**

P.37a. ¿Quién se lo indicó?

- El médico, por mi edad 1
- El médico, por mis enfermedades 2
- Me ponen la vacuna en la empresa/ centro de estudio 3
- Yo solicité la vacuna porque prefiero estar vacunado 4
- El médico, por otras razones 5
- Otros 6
- NS/NC 9

A TODOS/AS

P.38. Ahora me gustaría preguntarle sobre la revisión de la tensión arterial, niveles de colesterol, y niveles de glucosa.

	SI	NO	Ns/Nc
P.38.a ¿Le ha tomado la tensión alguna vez un/a profesional sanitario/a, excluyendo las tomas de tensión en farmacias?	1	2	9
P.38.b ¿le han medido alguna vez sus niveles de colesterol por prescripción médica, excluyendo las mediciones en farmacias?	1	2	9
P.38.c ¿le han medido alguna vez sus niveles de glucosa (azúcar) por prescripción médica, excluyendo las mediciones en farmacias?	1	2	9

P.39. ¿Cuánto tiempo hace que le midieron por última vez? (Entrevistador/a: Preguntar por tensión arterial/niveles de colesterol/glucosa según las respuestas afirmativas en P.38)?

	P.39a Tensión arterial	P.39b Colesterol	P.39c Glucosa
▪ Menos de 3 meses.....	1	1	1
▪ 3 a 5 meses	2	2	2
▪ Entre seis meses y un año	3	3	3
▪ Entre uno y tres años	4	4	4
▪ Más de 3 años.....	5	5	5
▪ No sabe/No recuerda	9	9	9

P.40. En los últimos 12 meses, es decir, desde principios de 2014 hasta hoy, ¿diría usted que su estado de salud ha sido ...?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4
- Muy malo 5
- NS/NC 9

P.41a. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (marque sólo una o el más usado)

- No 1 ⇒ **P.41b**
- Usa píldoras 2
- Tiene DIU 3
- Usa inyecciones 4
- Usa preservativo o condón 5
- Evita los días fértiles, uso método de ritmo de calendario 6
- Usa diafragma, espuma o gel 7
- Se practicó esterilización femenina ... 8
- Se practicó esterilización masculina ... 9
- Realiza coito interrumpido 10
- Píldora del día después 11
- Otros, especificar 12

P.42

P.41b. Si usted o su pareja no usan ningún método anticonceptivo, indique cuál es la principal razón para no usarlo (única respuesta)

- No lo necesita (no tiene relaciones, por la edad, infértil, postparto) 1
- Está embarazada 2
- Quiere quedar embarazada 3
- Se opone al uso de anticonceptivos (su religión se lo prohíbe, su pareja se opone, otros se oponen) 4
- Por razones de salud (temor a efectos secundarios, le es incómodo, molesto) 5
- No conoce los métodos anticonceptivos 6
- Por su precio, no puede comprarlo 7
- Otra, especificar

(ÚNICAMENTE MUJERES. RESTO, PASAR A P.44)

P.42 ¿Ha acudido alguna vez a un ginecólogo?

- Sí 1 ⇒ **P.42a**
- No 2 ⇒ **P.43**
- NC 9 ⇒ **P.43**

P.42a ¿Cuándo ha efectuado la última visita a un ginecólogo por algún motivo distinto a los relacionados con un embarazo o parto?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4
- Nunca ha ido por motivos diferentes al embarazo o parto 9 ⇒ **P.43**

P.42b ¿Podría decirme el motivo de la última consulta (que no sea embarazo/parto)?

- Por algún problema ginecológico 1
- Para realizar orientación/planificación familiar 2
- Para revisiones periódicas 3
- Para realizar detección de cáncer de mama 4
- Para realizar detección precoz de cáncer de útero 5
- Otro motivo 6
- NS/NC 9

P.42c. ¿Dónde tuvo lugar esta última consulta?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.43. ¿Le han hecho alguna vez una mamografía (radiografía de mama) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.43c**
- NC 9 ⇒ **P.43c**

P.43a. ¿Cuándo le han hecho la última mamografía?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.43b. ¿Dónde le hicieron la última mamografía?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

P.43c. ¿Le han hecho alguna vez una citología vaginal (muestra de células) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.44**
- NC 9 ⇒ **P.44**

P.43d. ¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.43e. ¿Dónde le hicieron la última citología vaginal?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

(HOMBRES Y MUJERES DE 50 Y MÁS AÑOS. RESTO, PASAR A P.45)

P.44. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.45**
- NC 9 ⇒ **P.45**

P.44a. ¿Qué tipo de prueba le han realizado?

- Análisis de sangre 1
- Sangre oculta en heces 2
- Endoscopia 3
- (Colonoscopia/Sigmoidoscopia/Rectoscopia)
- Otras 4
- No sabe / no recuerda 8
- No contesta 9

P. 44b. ¿En qué año se hizo la última prueba?

- Año: _____
- No sabe/no recuerda 8
- No contesta 9

P.44c. ¿Quién le recomendó la realización de esta prueba?

- Lo solicité yo mismo/a 1
- Me lo sugirió mi médico de cabecera 2
- Me lo sugirió otro médico especialista del SAS 3
- Me lo sugirió otro médico del servicio privado 4
- No sabe/no recuerda 8
- No contesta 9

P.44d. ¿Dónde le hicieron esta última prueba?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

A TODOS/AS: PROTECCION SOLAR

P.45. En el pasado verano, cuándo estuvo al aire libre, ¿con qué frecuencia utilizó....?. Piense en una escala de 0 a 10, donde 0 sería nunca y 10 siempre

	Nun- Ca	Casi nunca			Algunas veces			Casi siempre			Siem- pre
▪ Crema solar con factor de protección de 15 o mayor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Camiseta para protegerse del sol.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Gorra o sombrero para protegerse del sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Gafas de sol para protegerse del sol.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ La sombra para evitar el sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Crema solar con factor de protección de 50 o más.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P.45a En el pasado verano, ¿con qué frecuencia (utilizando la misma escala de 0 a 10) se expuso al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde?

Nunca	Casi nunca			Algunas veces			Casi siempre			Siempre
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P.45b ¿Ha utilizado en los últimos 5 años cabinas o lámpara de rayos ultravioleta (uva)?

No, nunca	Si, alguna vez	Si, muchas veces
0	1	2

P.45c Una quemadura solar es cualquier enrojecimiento o molestia durante más de 12 horas provocada por el sol u otra fuente de rayos U.V., como cabinas o lámparas solares. ¿Ha sufrido usted alguna quemadura solar en el último año?

- Sí, con ampollas 1
- Sí, sin ampollas 2
- No 3
- NS/NC 9

P.46. Imagínese que toma el sol sin ninguna protección. En ese caso....:

- Se quemaría siempre y no se pondría moreno nunca 1
- Se quemaría fácilmente y se pondría muy poco moreno 2
- Se quemaría moderadamente y se pondría moreno gradualmente 3
- Se quemaría mínimamente y se pondría moreno siempre 4
- Se quemaría raramente y se pondría muy moreno .. 5
- Nunca se quemaría 6
- NS/NC..... 9

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.54.3. ¿Es usted capaz de irse de compras?	
▪ Sin ayuda (se encarga personalmente de las compras necesarias)	0
▪ Con alguna ayuda (necesita que alguien le acompañe en todas sus compras)	2
▪ No puede hacer compras en absoluto	4
P.54.4. ¿Es usted capaz de manejar dinero (pagar facturas, contar dinero)?	
▪ Sin ayuda (pagar facturas, contar el cambio, etc.)	0
▪ Con alguna ayuda (aunque puede arreglarse con el dinero en el bolsillo, necesita ayuda para pagar facturas o manejar cheques bancarios)	2
▪ No puede manejar el dinero en absoluto	4
P.54.5. ¿Es usted capaz de usar el teléfono?	
▪ Sin ayuda (incluyendo buscar y marcar números)	0
▪ Con alguna ayuda (puede contestar el teléfono y llamar a números de emergencia –091- o los números más habituales, pero necesita un teléfono especial o ayuda para buscar y marcar números)	1
▪ No puede usar el teléfono en absoluto	3
P.54.6. ¿Es usted capaz de tomar su medicación?	
▪ Sin ayuda (las dosis correctas a la hora oportuna)	0
▪ Con alguna ayuda (puede tomar su medicación si alguien se la prepara y/o se lo recuerda)	2
▪ Es totalmente incapaz de tomar su medicación	4
P.54.7. ¿Es usted capaz de subir y bajar escaleras?	
▪ Sin ayuda (se incluyen cualquier instrumento de ayuda para andar)	0
▪ Con alguna ayuda	2
▪ Es totalmente incapaz de subir y bajar escaleras	5
P.54.8. ¿Es usted capaz de usar el water (o el sillón con escupidera)?	
▪ Sin ayuda (puede alcanzar la taza/sillón con escupidera, desvestirse lo necesario, limpiarse y salir)	0
▪ Con alguna ayuda (puede hacer algunas cosas, incluido limpiarse)	5
▪ No puede usar la taza/sillón de water	8
P.54.9. ¿Se le escapa la orina? (incontinencia urinaria)	
▪ No	0
▪ Pocas veces	6
▪ A menudo o necesita ayuda con el catéter/sonda de orina	8
P.54.10. ¿Se le escapa la caca? (incontinencia fecal)	
▪ No	0
▪ Pocas veces (menos de una vez al día)	6
▪ A menudo o necesita enemas	9
P.54.11. ¿Es usted capaz de usar el baño o la ducha?	
▪ Sin ayuda (puede entrar y salir de la bañera o ducharse sin ayuda o supervisión de nadie)	0
▪ Necesita ayuda para bañarse o ducharse	6
P.54.12. ¿Es usted capaz de arreglarse (por ejemplo peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.)?	
▪ Sin ayuda (si alguien le da las cosas si fuera necesario)	0
▪ Con ayuda	5
P.54.13. ¿Es usted capaz de vestirse solo?	
▪ Sin ayuda (incluido botones, cremalleras, cordones, etc.)	0
▪ Con ayuda (puede hacerlo a medias sin ayuda)	3
▪ No puede vestirse solo	6
P.54.14. ¿Es usted capaz de comer solo?	
▪ Sin ayuda	0
▪ Con algo de ayuda (para cortar los alimentos, untar la mantequilla, etc.)	5
▪ No puede comer solo	8
P.54.15. ¿Es usted capaz de salir a caminar?	
▪ Unos 50 metros o más sin ayudas	0
▪ Unos cuantos metros (menos de 50 metros)	4
▪ Es totalmente incapaz de caminar por fuera de casa	6
P.54.16. ¿Es usted capaz de moverse por su casa?	
▪ Sin ayuda (con bastón o muletas si los usa)	0
▪ Con alguna ayuda (bajo la supervisión de alguien no especializado)	5
▪ En silla de ruedas sin ayuda (incluidas puertas y esquinas)	4
▪ Necesita ayuda física para moverse	7
P.54.17. ¿Es usted capaz de moverse desde la cama hasta una silla que esté al lado de la misma?	
▪ Sin ayuda	0
▪ Con alguna ayuda (de alguien que supervise para mayor seguridad)	4
▪ Con mucha ayuda (de una persona fuerte o entrenada o dos no especializados para sentarse)	6
▪ Es usted completamente incapaz (no mantiene el equilibrio sentado y necesita dos personas)	7

Cuestionario EAS 2015. Adultos

SÓLO A QUIÉNES CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.54.1. A P.54.7 ó P.54.15 (AVDs INSTRUMENTALES)

- P.55. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?**
- Nadie 1
 - Su pareja 2
 - Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL: _____)..... 3
 - Un familiar que no vive con usted 4
 - Un amigo o alguien que no cobra por eso 5
 - Ayuda privada (pagada) 6
 - **Ayuda pública:**
 - Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales 7
 - Enfermera del centro de salud o ambulatorio 8
 - Voluntariado 9
 - Otro 10

SÓLO A QUIÉNES CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.54.8 A P.54.14 ó P.54.16 ó P.54.17 (AVDs BÁSICAS)

- P.56. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?**
- Nadie 1
 - Su pareja 2
 - Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL: _____)..... 3
 - Un familiar que no vive con usted 4
 - Un amigo o alguien que no cobra por eso 5
 - Ayuda privada (pagada) 6
 - **Ayuda pública:**
 - Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales 7
 - Enfermera del centro de salud o ambulatorio 8
 - Voluntariado 9
 - Otro 10

A TODOS/AS: APOYO AFECTIVO Y PERSONAL

P.57. En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera "completamente infeliz" y 10 que se considera "completamente feliz".

Completamente infeliz						Completamente feliz					Ns/Nc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

P.57a. En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por nosotros o nos proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según la escala de 5 a 1, en la que "5" significa "TANTO COMO DESEA", "4" "casi como desea", "3" "ni mucho ni poco", "2" "menos de lo que desea" y "1" significa "MUCHO MENOS DE LO QUE DESEA" (Mostrar Tarjeta D)

		Tanto como deseo	Casi como deseo	Ni mucho ni poco	Menos de lo que deseo	Mucho menos de lo que deseo
P.57.1.	Recibo visitas de mis amigos y familiares	5	4	3	2	1
P.57.2.	Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa	5	4	3	2	1
P.57.3.	Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo	5	4	3	2	1
P.57.4.	Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede	5	4	3	2	1
P.57.5.	Recibo amor y afecto	5	4	3	2	1
P.57.6.	Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo y/o en la casa	5	4	3	2	1
P.57.7.	Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares	5	4	3	2	1
P.57.8.	Tengo posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos ..	5	4	3	2	1
P.57.9.	Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas	5	4	3	2	1
P.57.10.	Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida	5	4	3	2	1
P.57.11.	Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama	5	4	3	2	1

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.58. ¿Cuál fue su lugar de nacimiento?

- Andalucía 1 Indicar provincia:
 Indicar municipio:
 Resto de España 2 Indicar provincia:
 Año que llegó a Andalucía:
 Extranjero 3 Indicar País:
 Año que llegó a España: Año que llegó a Andalucía:

P.59. ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1 ⇨ P.60
- Soltero/a 2
- Separado/a 3
- Divorciado/a 4
- Viudo/a 5
- NS/NC 9

P.59a. ¿Vive usted actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2
- No contesta 9

P.60. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que usted ha finalizado?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) .. 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria)..... 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.61. ¿Cuál es su situación laboral actual?

- Trabaja 1 ⇨ P.63a
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

→ ¿Cuántos meses en paro?

P.62. ¿Percibe usted alguna pensión (pública o privada)?

- Sí 1 ⇨ ¿Cuál?
- No 2
- NC 9

P.63. ¿Ha trabajado anteriormente?

- Sí 1 ⇨ Pasar a P.63a
- No 2 ⇨ Pasar a P.71
- NS/NC 9 ⇨ Pasar a P.71

(Entrevistador: como resultado de las preguntas anteriores, debe quedar clara la situación de la persona entrevistada):

- Trabaja o ha trabajado anteriormente (pasar a P.63a)
- No trabaja ni ha trabajado anteriormente (pasar a P.71)

PARA LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO

P.63a. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba?

.....

P.63b. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?

.....

P.63c. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados .. 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO, PASAR A P.71

P.64. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?

- Trabaja por su cuenta o no es asalariado 1
- Funcionario/estatutario 2
- Contrato indefinido 3
- Contrato temporal de menos de 6 meses 4
- Contrato temporal de 6 meses a 1 año 5
- Contrato temporal de 1 a 2 años 6
- Contrato temporal de más de 2 años 7
- Contrato temporal sin especificar duración 8
- Sin contrato 9
- Otra relación 10
- NS/NC 99

P.64a. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual empresa?

años meses

P.64b. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

- Jornada partida 1
- Jornada continua de mañana 2
- Jornada continua de tarde 3
- Jornada continua nocturna 4
- Turnos 5
- Por horas 6
- Otra posibilidad 7
- NS/NC 9

P.64c. En total, ¿cuántas horas trabaja usted habitualmente a la semana?

horas

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.64d. ¿Cuánto tiempo tarda en todos sus desplazamientos para ir y volver de trabajar al día?

 □□ horas □□ minutos

- Jornada muy variable, según los días 999

P.64e. ¿Cuántas personas trabajan bajo su responsabilidad?

- Ninguna 1
- De 1 a 5 2
- De 6 a 9 3
- De 10 a 20 4
- Más de 20 5
- Ns/Nc 9

P.65. La empresa donde usted trabaja, ¿cuántos empleados/as tiene?

- Ninguno 1
- De 1 a 9 2
- De 10 a 49 3
- De 50 a 99 4
- De 100 a 499 5
- 500 ó más 6
- No sabe 8
- No contesta 9

P.66. Entre las tareas que realiza en su trabajo, ¿en qué medida está usted expuesto a ...?

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Nunca	NS/NC
▪ Ruido tan alto que tiene que levantar la voz para hablar con otra gente	1	2	3	4	9
▪ Altas/Bajas temperaturas	1	2	3	4	9
▪ Respirar vapores, humos, polvo, o sustancias peligrosas como químicos, material infeccioso, etc./ Manejar o tocar sustancias o productos peligrosos/ Radiaciones como rayos X, soldadura, rayos láser	1	2	3	4	9
▪ Posiciones dolorosas / fatigantes	1	2	3	4	9
▪ Tareas repetitivas de menos de 10 minutos/ Movimientos repetitivos de manos o brazos	1	2	3	4	9
▪ Manipular cargas pesadas (más de 15 kg)	1	2	3	4	9
▪ Trabajos al aire libre	1	2	3	4	9

P.67. Elija una sola respuesta de la siguiente escala (leer) para cada una de las siguientes preguntas que le voy a leer:

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca
1. ¿Tiene usted que trabajar muy rápido?	1	2	3	4	9
2. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se le acumule el trabajo?	1	2	3	4	9
3. ¿Tiene usted tiempo de llevar al día su trabajo?	1	2	3	4	9
4. ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo?	1	2	3	4	9
5. ¿Su trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?	1	2	3	4	9
6. ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones?	1	2	3	4	9
7. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna?	1	2	3	4	9
8. ¿Se tiene en cuenta su opinión cuando se le asignan tareas?	1	2	3	4	9
9. ¿Tiene influencia sobre el orden en el que realiza las tareas?	1	2	3	4	9
10. ¿Puede decidir cuándo hace un descanso?	1	2	3	4	9
11. Si tiene algún asunto personal o familiar, ¿puede dejar su puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?	1	2	3	4	9
12. ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa?	1	2	3	4	9
13. ¿Su trabajo le permite que aprenda cosas nuevas?	1	2	3	4	9
14. ¿Se siente comprometido con su profesión?	1	2	3	4	9
15. ¿Tienen sentido sus tareas?	1	2	3	4	9
16. ¿Habla usted con entusiasmo de su empresa a otras personas?	1	2	3	4	9

P.68. ¿Piensa usted que su trabajo afecta negativamente a su salud?

- Sí 1 ⇨ **P.69**
- No 2 ⇨ **P.70**
- NC 3 ⇨ **P.70**

Cuestionario EAS 2015. Adultos

P.69. ¿De qué forma afecta su trabajo a su salud?

	Sí	No
▪ Tiene dolores de espalda	1	2
▪ Se siente nervioso y estresado	1	2
▪ Se siente agotado a todas horas	1	2
▪ Tiene dolores musculares	1	2
▪ Tiene dolores de cabeza	1	2
▪ Tiene problemas de sueño	1	2
▪ Otro problema, ¿cuál?	1	

P.70. En los últimos 12 meses, ¿cuántos días ha estado ausente de su trabajo debido a problemas de salud causados por su trabajo?

□ □ días

A TODOS/AS: INGRESOS ECONOMICOS DEL HOGAR

P.71. Con los ingresos de su hogar, ¿cómo suele llegar usted, o en su caso, usted y su familia, en la actualidad a fin de mes?

- Con mucha dificultad1
- Con dificultad2
- Con cierta/alguna dificultad3
- Con cierta/alguna facilidad4
- Con facilidad5
- Con mucha facilidad6

P.72. Por favor, indique el intervalo en el que están comprendidos los ingresos totales netos de su hogar, sumando todas las fuentes (si existe más de una) y deduciendo las retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos asimilados (MOSTRAR TARJETA E)

- Hasta 300 € 1
- De 301 a 499 € 2
- De 500 a 999 € 3
- De 1.000 a 1.499 € 4
- De 1.500 a 1.999 € 5
- De 2.000 a 2.499 € 6
- De 2.500 a 2.999 € 7
- De 3.000 a 4.999 € 8
- Más de 5.000 € 9
- No sabe leer, no está seguro 10
- No contesta 99

A TODOS/AS: DATOS DE LA PAREJA

ENTREVISTADORA/A: Las siguientes preguntas son sobre el/la esposo/a o pareja (conviviente) de la persona entrevistada.

P.73. ¿Está usted casado/a y/o vive actualmente en pareja? (Entrevistador/a: anotar según P.59/P.59a)

- Sí 1 ⇒ **P.74**
- No 2 ⇒ **P.75**
- No contesta 9 ⇒ **P.75**

P.74. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por su esposo/a y/o pareja?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.74a. ¿Cuál es la situación laboral actual de su esposo/a y/o pareja?

- Trabaja 1 ⇒ **P.74.c**
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3 ⇒ **P75**
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6 } **P75**
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

→ ¿Cuántos meses en paro? □ □ □

P.74b. ¿Percibe su esposo/a y/o pareja alguna pensión (pública o privada)?

- Sí 1 ⇒ ¿Cuál?
- No 2
- NC 9

P.74c. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o ha trabajado su esposo/a y/o pareja?

□ □ □ □ □

P.74d. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado su esposo/a y/o pareja?

□ □ □ □ □

P.74e. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba su esposo/a y/o pareja?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

Cuestionario EAS 2015. Adultos

DATOS DE LA ENTREVISTA

TRIMESTRE	1	2	3	4

SEMANA DEL TRIMESTRE	1	2	3	4

FECHA DE REALIZACIÓN:

Día: Mes: Año:

DÍA DE LA SEMANA:

Lunes 1 Viernes 5
Martes 2 Sábado 6
Miércoles 3 Domingo 7
Jueves 4

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: minutos

HORA DE REALIZACIÓN:

Mañana (9-12) 1 Tarde (4-8) 3
Mediodía (12-4) 2 Noche (8-10) 4

SINCERIDAD DEL ENTREVISTADO:

Mucha 1 Poca 3
Bastante 2 Ninguna 4

Cuestionario EAS 2015. Adultos

LOS SIGUIENTES CUADROS TIENEN QUE VENIR SIEMPRE RELLENOS

NOMBRE DEL/LA ENTREVISTADOR/A
.....

SUPERVISOR/A
.....

OBSERVACIONES
.....
.....
.....

CÓDIGO

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A

La persona entrevistada ha sido seleccionada de acuerdo a los criterios marcados para este estudio y la entrevista ha sido cumplimentada en su totalidad con esta persona.

Entrevistador/a

..... de de 2.015
(fecha)

El/la entrevistador/a

VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN DE LA ENTREVISTA:

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL : LOCALIDAD:

PROVINCIA: TELÉFONO CONTACTO:

Anexo B: Definición de las Variables

La siguiente tabla muestra las variables estudiadas. La formulación de las preguntas puede consultarse en el cuestionario de la EAS-15 (Anexo A).

I. Nivel de Salud	Variables Cuestionario Adulto EAS 11
Auto-percepción de salud y calidad de vida	P40
Indicadores de salud mental y física (SF-12)	Componente Físico, Componente Mental
Limitación temporal de las actividades cotidianas: limitación en el trabajo habitual y limitación de actividades sociales	P11, P13
Enfermedades crónicas: Alergias, hipertensión, artrosis, nervios, colesterol, varices, diabetes y trastornos cardíacos	P14.16, P14.03, P14.28, P14.23, P14.24, P14.04, P14.19, P14.02, P14.10.
Discapacidad física, sensorial y psíquica.	P2a
Autonomía personal- ADVs instrumentales y básicas	Q54
Accidente en los últimos tres meses y lugar	P15a, P15b
II. Determinantes de Salud	
Consumo de alcohol: frecuencia de consumo, edad media de inicio al consumo de alcohol y sospecha de alcoholismo (escala CAGE).	P29, Q31a, CAGE
Consumo de tabaco: hábitos de tabaco, edad a la que empezó a fumar, actitud ante el tabaco.	P23.1, Q23.1, P24d
Alimentación: consumo de verduras, frutas y lácteos	P36b08, P36b06, P36b02
Peso Corporal: Índice de masa corporal	IMC
Actividad física: actividad física durante el trabajo y durante el tiempo libre	P34, P34a
III. Prácticas preventivas	
Vacunación ante la gripe	P37
Métodos anticonceptivos	P41a
Visitas al ginecólogo	P42
Mamografías	P43
Citologías	P43c
Exposición solar: frecuencia de exposición al sol	Q45a
Higiene buco-dental	P19
Seguridad vial: frecuencia de uso del casco por ciudad y carretera, frecuencia de uso del cinturón por ciudad y carretera, uso de asiento especial para menores.	P51.1, P51.2, P50.1, P50A.1, P50.2, P50A.2, P53
Consejo médico para dejar de fumar	P24c
IV. Medioambiente	
Características de la vivienda	P04a, Q04b
Exposición ambiental a tabaco: fumadores pasivos y tiempo medio en ambientes cargados de tabaco	P26, P27.1, P27.2
Condiciones de trabajo: exposición en el trabajo a riesgos ergonómicos y físico-químicos y grado de afectación negativa del trabajo en la salud	P66.03, P66.04, P68
Apoyo social: escala: DUKE	DUKE

Anexo B: Definición de las Variables

V. Servicios sanitarios	
Consultas médicas: consultas médicas en las últimas dos semanas, lugar, motivo y medico al que visito	P17a, P17c, P17d, P17e
Ingresos hospitalarios	P20, Q20a
Utilización servicio de urgencias: utilización del servicio de urgencias y tipo de servicio usado	P21, P21b
Consultas odontológicas	P19d
Consumo de medicamentos	P16
Cobertura sanitaria: modalidad del seguro sanitario	P22

A continuación se describen algunas de las recodificaciones/tratamientos de las variables previas al análisis de las mismas:

Bloque 1:

- **Mala salud.** La variable estudiada es la unión de las dos opciones más desfavorables: Malo y Muy malo (pregunta 40 del cuestionario).
- **SF-12.** A partir de los ítems que forman el cuestionario se construyen dos puntuaciones resumen: la puntuación física y la puntuación mental. Las puntuaciones estandarizadas basadas en la población normativa (población general española), conocidas como puntuaciones “50/10”, ya que se obtiene una media de 50 y una desviación estándar de 10 en la población general de referencia. Los valores superiores o inferiores a 50 deben interpretarse como mejores o peores, respectivamente de la población de referencia (preguntas 7 a 10 del cuestionario).
- **Dolor que dificulta el trabajo habitual.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Bastante y Mucho (pregunta 11 del cuestionario).
- **Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales.** La variable estudiada es la unión de las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre (pregunta 13 del cuestionario).
- **Enfermedades crónicas.** Se define la variable nervios, cuando la persona entrevistada padece depresión, ansiedad o ambas. Para ello se procedió a la unión de las variables depresión y ansiedad (pregunta 14 del cuestionario).
- **Discapacidad física, sensorial y psíquica.** Se define limitación física cuando la persona entrevistada responde de forma afirmativa. Se define limitación sensorial cuando la persona entrevistada responde de forma afirmativa. Se define limitación psíquica cuando la persona entrevistada responde de forma afirmativa (pregunta 2a del cuestionario).
- **Discapacidad física, sensorial y psíquica en hogares.** Se define limitación física cuando algún miembro del hogar entrevistado responde de forma afirmativa. Se define limitación sensorial cuando algún miembro del

Anexo B: Definición de las Variables

hogar entrevistado responde de forma afirmativa. Se define limitación psíquica cuando algún miembro del hogar entrevistado responde de forma afirmativa (pregunta 2a del cuestionario).

Bloque 2:

- **Sospecha del alcoholismo.** En el cuestionario hay cuatro preguntas que conforman el cuestionario CAGE (Pregunta 32 del cuestionario). Se define la sospecha de alcoholismo cuando alguna de estas cuatro preguntas tiene por lo menos una respuesta afirmativa (preguntas 32, 32a, 32b y 32c del cuestionario).
- **Consumo de lácteos, fruta y verduras.** En estas tres variables se calcula la frecuencia de personas que consumen al menos tres veces a la semana este tipo de productos (pregunta 36 del cuestionario).
- **Sobrepeso y obesidad.** A partir de los datos de peso y altura (preguntas 46 y 47 del cuestionario respectivamente), se calculó el **Índice de Masa Corporal (IMC)**, como variable intermedia, codificándose según propone la OMS en bajo peso (IMC<18,5), peso normal (IMC entre 18,5 y 24,9), sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9) y obesidad (IMC>30). La variable estudiada es la prevalencia para la suma de las categorías sobrepeso y obesidad.
- **Actividad física en el trabajo.** Definimos sedentarismo en el trabajo como la unión de respuestas “Sentado” y “De pie sin esfuerzos” a la pregunta de qué es lo que mejor describe la actividad principal del entrevistado (pregunta 34 del cuestionario).
- **Actividad física en el tiempo libre.** Definimos sedentarismo en el tiempo libre cuando la persona entrevista declara no hacer ningún ejercicio en su tiempo libre (pregunta 34a. del cuestionario).

Bloque 3:

- **Exposición solar.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y Casi siempre, en una escala de 0 a 10, puntuación mayor o igual a 7 (pregunta 45a del cuestionario).
- **Uso del cinturón.** La variable estudiada es la agregación de las variables uso del cinturón de seguridad cuando conduce y como acompañante, tanto en ciudad como carretera. La opción seleccionada es Siempre (preguntas 50.1, 50.2, 50a.1, 50a.2 del cuestionario)
- **Uso de asientos especiales para menores.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y “La mayoría de las veces” (pregunta 53 del cuestionario).

Bloque 4:

- **Exposición (respirando y manejando) a vapores, humos y otras sustancias peligrosas.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y “Muchas veces” (pregunta 66.03 del cuestionario).
- **Exposición a posiciones fatigantes o dolorosas.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y “Muchas veces” (pregunta 66.04 del cuestionario).

Anexo B: Definición de las Variables

- **Apoyo social.** A partir de los 11 ítems que forman el cuestionario se construyen dos puntuaciones resumen: apoyo confidencial y apoyo afectivo. Se realiza una escala estandarizada de 0 a 100 con punto de corte en el 50%. Los valores inferiores a 50 deben interpretarse como escaso apoyo confidencial o afectivo, respectivamente de la población de referencia (pregunta 57 del cuestionario).

Bloque 5:

- **Utilización del servicio de urgencias.** La variable estudiada es la agregación de las opciones “Sí acudí a un centro o servicio” y “Sí acudieron a mi domicilio” (pregunta 21 del cuestionario).
- **Cobertura Sanitaria.** Se define la doble cobertura sanitaria cuando la persona entrevistada declara ser titular o beneficiario de más de un seguro sanitario (pregunta 22 del cuestionario).

Además las variables de estratificación fueron:

- **Sexo:** Hombre, Mujer.
- **Edad:** Los grupos de edad estudiados fueron de 16 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45 a 54 años, de 55 a 64 años, de 65 a 74 años y 75 y más años.
- **Provincias:** Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
- **Nivel educativo:** Hasta estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios.
- **Nivel de ingresos:** Hasta 999€ mensuales, entre 1000 y 1499€ mensuales, entre 1500 y 2499€ mensuales y más de 2500€ mensuales. Esta variable no se recogió en 1999, por lo que en los resultados desagregados por nivel de ingresos no aparece este año.
- **Clase social:** Se calculó la clase social del entrevistado en función de su ocupación, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994. De esta clasificación resultó la siguiente codificación de la variable:
 - Clases sociales I y II: Directivos, profesiones asociadas a estudios universitarios, artistas y deportistas.
 - Clase social III: Empleados de tipo administrativo, profesionales de apoyo a la gestión, trabajadores de los servicios personales y de seguridad, trabajadores por cuenta propia, supervisores de trabajadores manuales.
 - Clases sociales IVa, IVb, V y en situación de desempleo: trabajadores manuales cualificados y semicualificados, trabajadores no cualificados y personas desempleadas.