

# 6 INDICADORES

- **La indicación quirúrgica de amigdalectomía por síntomas de dolor de garganta se debe basar en el siguiente patrón clínico:**

- Ocurrencia de 5 o más episodios de dolor de garganta al año.
- Los dolores de garganta son debidos a amigdalitis agudas bacterianas.
- Síntomas que persisten durante al menos 1 año.
- Episodios de dolor de garganta incapacitantes que impiden el desempeño normal de las funciones y actividades personales.
- El dolor de garganta se debe a la repetición de un absceso periamigdalino.

- **La indicación quirúrgica de adenoidectomía por adenoiditis se debe basar en el siguiente patrón clínico:**

- Ocurrencia de 4 o más episodios de rinorrea en los 12 meses previos (al menos uno de los episodios debe haber sido documentado clínicamente por exploración médica).
- Síntomas persistentes de adenoiditis después de 2 cursos de tratamiento antibiótico (al menos uno de estos tratamientos debe haber incluido un antibiótico resistente a las beta-lactamasas y haber tenido una duración mínima de 2 semanas).

- N° de intervenciones de amigdalectomía realizadas por CMA x 100/N° de intervenciones totales de amigdalectomía.
- N° de intervenciones de adenoidectomía realizadas por CMA x 100/N° de intervenciones totales de adenoidectomía.
- N° de intervenciones programadas comunicadas al Médico de Familia-Pediatra de AP/N° total de intervenciones programadas.