




9

Indicadores

Denominación	PERSONAS A LAS QUE SE LES REALIZA CRIBADO INICIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA IDENTIFICACIÓN DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
Fórmula	Número de personas a las que se les realiza cribado inicial en AP para ansiedad y depresión según los criterios que aparecen en el PAI x 100 / N° de personas incluidas en el PAI.
Definiciones	Aplicación de cribado inicial para identificación de síntomas.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	Las personas que solicitan asistencia por síntomas compatibles con ansiedad, depresión. La aplicación del cribado puede ayudar a identificar grandes síndromes.
Población del indicador	Personas que acuden a la consulta por síntomas compatibles con ansiedad y depresión.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	85%

Denominación	PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROCESO Y QUE SE HA REGISTRADO EN AP Y/O USMC SU DIAGNÓSTICO, MEDIANTE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CIE-10.
Fórmula	Número de personas incluidas en el PAI-ADS y su diagnóstico está registrado en AP y USMC mediante criterios diagnósticos CIE-10 x 100 / Número de personas incluidas en el PAI-ADS.
Definiciones	La clasificación CIE-10 nos indica los criterios diagnósticos que deben cumplir los trastornos incluidos en el PAI-ADS.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	Establecer los criterios diagnósticos que deben cumplir los trastornos incluidos en el PAI-ADS.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	85%

Denominación	VALORACIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO CUANDO EXISTAN SITUACIONES Y/O FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN AP
Fórmula	$\frac{\text{Número de personas identificadas con factores de riesgo de suicidio en la evaluación inicial en AP y se les ha realizado evaluación específica de riesgo de suicidio según lo que establece el PAI-ADS} \times 100}{\text{Personas incluidas en el PAI en las que se identifica riesgo de suicidio en evaluación inicial en AP}}$
Definiciones	Evaluación específica de riesgo de suicidio en la población detectada en AP.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	Ante la gravedad de la situación.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS y que presentan riesgo de suicidio.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	100%

Denominación	PERSONAS INCLUIDAS EN EL PAI Y QUE TIENEN ELABORADO UN PLAN TERAPÉUTICO EN AP
Fórmula	$\frac{\text{Número de personas incluidas en el PAI-ADS y tienen elaborado un Plan Terapéutico en AP según criterios establecidos} \times 100}{\text{Número de personas incluidas en el PAI-ADS}}$
Definiciones	El Plan Terapéutico es un plan individualizado con contenidos específicos y consensuados.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	El Plan Terapéutico es un plan personal de atención con contenidos específicos.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	85%

Denominación	PERSONAS INCLUIDAS EN EL PAI-ADS CON DEPRESIÓN LEVE QUE NO UTILIZAN ANTIDEPRESIVOS COMO PRIMERA INTERVENCIÓN
Fórmula	$\frac{\text{Número de personas incluidas en el PAI-ADS con depresión leve y que no utilizan antidepresivos como primera intervención según criterios establecidos en el PAI-ADS}}{\text{Número de pacientes diagnosticados de depresión leve}} \times 100$
Definiciones	En la depresión leve no deben utilizarse antidepresivos como primera intervención excepto en los casos descritos en el PAI-ADS.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	La utilización de antidepresivos está establecida en el PAI-ADS.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS y que están diagnosticadas de depresión leve.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	90%

Denominación	PERSONAS INCLUIDAS EN EL PAI-ADS Y EN TRATAMIENTO CON LOS ANTIDEPRESIVOS RECOMENDADOS EN AP
Fórmula	$\frac{\text{Número de personas en tratamiento en AP con uno de los antidepresivos recomendados en el PAI-ADS}}{\text{Número de personas incluidas en el PAI-ADS y están en tratamiento con antidepresivos en AP}} \times 100$
Definiciones	Utilización de antidepresivos recomendados en el PAI.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	La utilización de antidepresivos recomendados en el PAI-ADS.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS y que están en tratamiento en AP con antidepresivos.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	85%

Denominación	PERSONAS INCLUIDAS EN EL PAI-ADS CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD, EN LAS QUE SE HA DECIDIDO TRATAMIENTO CON BENZODIAZAPINAS SEGÚN ESTABLECE EL PROCESO
Fórmula	$\frac{\text{Número de personas incluidas en el PAI-ADS diagnosticadas con un trastorno de ansiedad y se les ha prescrito benzodiazepinas según establece el proceso y la duración del mismo es inferior a las 4 semanas}}{\text{Número de personas incluidas en el PAI y diagnosticadas con un trastorno de ansiedad a las que se les ha prescrito benzodiazepinas}} \times 100$
Definiciones	Tiempo máximo de utilización de benzodiazepinas.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	Las benzodiazepinas deben ser utilizadas por un periodo máximo de 4 semanas en el tratamiento de los trastornos de ansiedad.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS y que han sido diagnosticadas con un trastorno de ansiedad y tienen tratamiento con benzodiazepinas.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	95%

Denominación	TIEMPO TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA CONSULTA EN USMC Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN CONSENSUADO DE TRATAMIENTO (PCT)
Fórmula	Número de personas que tienen elaborado el Plan Consensuado de Tratamiento en la USMC, en los 15 días siguientes a la primera consulta según criterios en el PAI-ADS x 100 / Número de personas incluidas en el PAI-ADS y atendidas en la USMC.
Definiciones	El Plan Consensuado de Tratamiento es un acuerdo establecido entre terapeuta referente y el/la paciente.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	El Plan Consensuado de Tratamiento recoge el acuerdo establecido entre profesionales y el/la paciente y consensuado por todos los profesionales que intervienen y que marca los pasos a seguir y los objetivos a alcanzar.
Población del indicador	Personas incluidas en el PAI-ADS y que han sido atendidas por USMC.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	90%

Denominación	PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE DEPRESIÓN GRAVE Y UTILIZAN PARA SU TRATAMIENTO UN ANTIDEPRESIVO
Fórmula	Número de personas diagnosticadas de depresión grave que están en tratamiento con un antidepresivo x 100 / Número de personas diagnosticadas de depresión grave.
Definiciones	Los antidepresivos son el tratamiento de elección en la depresión grave.
Tipo de Indicador	Proceso.
Dimensión	Efectividad.
Fundamento/Justificación	El tratamiento de la depresión grave debe ser con antidepresivos.
Población del indicador	Personas con diagnóstico de depresión grave.
Fuente de datos recomendada	Historia Clínica.
Periodicidad	Anual.
Estándares	95% (salvo intolerancia, inadecuación o no aceptación por el paciente.)