

# 2

## DEFINICIÓN GLOBAL

**Definición funcional:** Conjunto de actividades destinadas a establecer la confirmación diagnóstica de aquellas personas que presenten criterios sugerentes de artrosis de rodilla o cadera para proceder a su atención integral y coordinada desde los distintos niveles asistenciales.

**Límite de entrada:** Paciente que cumple los siguientes criterios:

Criterios de artrosis de rodilla<sup>2</sup>:

Dolor en la rodilla (la mayoría de los días del mes previo) y

Osteofitos o, al menos, 2 de los siguientes hallazgos:

- Edad  $\geq$  50 años (sustituible por líquido sinovial de OA)\*
- Rigidez matutina  $\leq$  30 minutos de duración
- Crepitación a la movilización articular activa

Criterios de artrosis de cadera<sup>3</sup>:

- Dolor en la cadera (la mayoría de los días del mes previo) más 2 de los siguientes hallazgos:
  - Velocidad de sedimentación globular  $<$  20 mm/hora
  - Osteofitos acetabulares y/o femorales
  - Estrechamiento radiológico del espacio articular (superior, axial y/o medial)

**Límite final:** Artroplastia sustitutiva u otra intervención quirúrgica que modifica estructuralmente la articulación.

Incorporación del paciente a otro proceso asistencial con prioridad sobre éste.

**Límites marginales:** Pacientes con criterios de artrosis de rodilla o artrosis de cadera que presenten, además, patología reumática inflamatoria: artritis reumatoide o espondiloartropatías (espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Reiter u otras artritis reactivas, artritis de las enterocolopatías - enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa).

---

\* Ambarino, viscoso, transparente, menos de 2.000 células/cc