



# 2

## Definición

### Definición funcional

Conjunto de actividades secuenciales destinadas a establecer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con manifestaciones clínicas y/o analíticas de hipertrofia benigna de próstata (HBP) y/o cáncer de próstata (CAP) que precisan, tras la valoración médica, el establecimiento de medidas terapéuticas y de cuidados, seleccionando las más adecuadas en cada caso y garantizando la continuidad de la asistencia.

### Límite de entrada

Varón con manifestaciones clínicas (\*) y/o analíticas (\*\*) sugestivas de HBP y/o CAP en ausencia de clínica compatible con infección urinaria.

### Límite final

1. Pacientes que una vez finalizado el estudio diagnóstico no son diagnosticados de HBP o CAP.
2. Pacientes con HBP que tras intervención quirúrgica no precisen seguimiento.

### Límites marginales

Pacientes con cáncer de próstata en situación terminal.

### Observaciones

(\*) Se consideran manifestaciones clínicas sugestivas de HBP/CAP los signos y síntomas irritativos y/o obstructivos del tracto urinario inferior (STUI).

Síntomas irritativos o de llenado	Síntomas obstructivos o de vaciado
Polaquiuria Nicturia Urgencia miccional Incontinencia de urgencia Dolor suprapúbico	Dificultad inicial Chorro débil / lento Goteo postmiccional Micción intermitente Vaciado incompleto

(\*\*) Se considera manifestación analítica sugestiva de CAP PSA > 3 ng/ml.