

Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012

Muestra de Adultos



Autores: José Juan Sánchez Cruz (Coordinador)
Escuela Andaluza de Salud Pública

Llenalia García Fernández

José M^a Mayoral Cortés

Edita: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 2013

Elaboración y coordinación editorial: Escuela Andaluza de Salud Pública, www.easp.es




Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012

Muestra de Adultos



Bloque I
Nivel de Salud

Índice

Listado de Gráficos	6
PRESENTACIÓN DE LA CONSEJERA.....	14
INTRODUCCIÓN	17
OBJETIVO	18
METODOLOGÍA.....	19
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO.....	19
TIPO DE MUESTREO Y UNIDADES MUESTRALES	19
ESTRATIFICACIÓN Y AFIJACIÓN MUESTRAL	20
TAMAÑO DE LA MUESTRA	20
ANÁLISIS DE LOS DATOS	21
RESUMEN DE RESULTADOS	23
NIVEL DE SALUD	23
DETERMINANTES DE LA SALUD	25
PRÁCTICAS PREVENTIVAS.....	26
MEDIO AMBIENTE, ENTORNO SOCIAL Y LABORAL.....	27
SERVICIOS SANITARIOS.....	29
SALUD GENERAL: PERCEPCIÓN DE MALA SALUD	32
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	32
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	32
SALUD GENERAL:PUNTUACIÓN FÍSICA DE LA ESCALA SF-12.....	37
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	37
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	38
SALUD GENERAL: PUNTUACIÓN MENTAL DE LA ESCALA SF-12	42
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	42
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	42
LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS: DOLOR QUE DIFICULTA EL TRABAJO HABITUAL.....	47
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	47
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	47

LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS: PROBLEMAS DE SALUD FÍSICA O EMOCIONAL QUE DIFICULTAN

LAS ACTIVIDADES SOCIALES	52
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	52
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	52
ENFERMEDADES CRÓNICAS	57
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	57
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	58
ALERGIAS CRÓNICAS	60
ARTROSIS O REUMATISMO	63
COLESTEROL	66
DIABETES	69
HIPERTENSIÓN	72
PROBLEMAS DE NERVIOS	75
PROBLEMAS CARDÍACOS	78
VARICES EN LAS PIERNAS	81
LIMITACIONES FÍSICAS, SENSORIALES O PSÍQUICAS	84
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	84
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	84
LIMITACIONES FÍSICAS	87
LIMITACIONES SENSORIALES	90
LIMITACIONES PSÍQUICAS	93
HOGARES CON PERSONAS CON ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA	96
AUTONOMÍA PERSONAL	97
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	97
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	97
DIFICULTADES EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE TIPO INSTRUMENTAL	99
DIFICULTADES EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE TIPO BÁSICO	102
ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES	105
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	105
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	105
ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES: LUGAR DEL ACCIDENTE	110

Listado de Gráficos

<i>Gráfico 1. Prevalencia de mala salud percibida por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	34
<i>Gráfico 2. Prevalencia de mala salud percibida por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	34
<i>Gráfico 3. Prevalencia de mala salud percibida por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	35
<i>Gráfico 4. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	35
<i>Gráfico 5. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	36
<i>Gráfico 6. Prevalencia de mala salud percibida por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	36
<i>Gráfico 7. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	39
<i>Gráfico 8. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	39
<i>Gráfico 9. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por provincias.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	40
<i>Gráfico 10. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de estudios.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	40
<i>Gráfico 11. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de ingresos.</i>	
Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	41
<i>Gráfico 12. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por clase social.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	41
<i>Gráfico 13. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por sexo.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	44
<i>Gráfico 14. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por edad.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	44
<i>Gráfico 15. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por provincias.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	45

<i>Gráfico 16. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>45</i>
<i>Gráfico 17. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>46</i>
<i>Gráfico 18. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>46</i>
<i>Gráfico 19. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>49</i>
<i>Gráfico 20. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>49</i>
<i>Gráfico 21. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>50</i>
<i>Gráfico 22. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>50</i>
<i>Gráfico 23. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>51</i>
<i>Gráfico 24. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>51</i>
<i>Gráfico 25. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>54</i>
<i>Gráfico 26. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>54</i>
<i>Gráfico 27. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>55</i>
<i>Gráfico 28. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>55</i>
<i>Gráfico 29. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>56</i>
<i>Gráfico 30. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. ...</i>	<i>56</i>
<i>Gráfico 31. Prevalencia de personas con alergia crónica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>60</i>

<i>Gráfico 32. Prevalencia de personas con alergia crónica por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	60
<i>Gráfico 33. Prevalencia de personas con alergia crónica por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	61
<i>Gráfico 34. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	61
<i>Gráfico 35. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	62
<i>Gráfico 36. Prevalencia de personas con alergia crónica por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	62
<i>Gráfico 37. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	63
<i>Gráfico 38. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	63
<i>Gráfico 39. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	64
<i>Gráfico 40. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	64
<i>Gráfico 41. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	65
<i>Gráfico 42. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	65
<i>Gráfico 43. Prevalencia de personas con colesterol alto por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	66
<i>Gráfico 44. Prevalencia de personas con colesterol alto por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	66
<i>Gráfico 45. Prevalencia de personas con colesterol alto por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	67
<i>Gráfico 46. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	67
<i>Gráfico 47. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	68

<i>Gráfico 48. Prevalencia de personas con colesterol alto por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	68
<i>Gráfico 49. Prevalencia de personas diabéticas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	69
<i>Gráfico 50. Prevalencia de personas diabéticas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	69
<i>Gráfico 51. Prevalencia de personas diabéticas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	70
<i>Gráfico 52. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	70
<i>Gráfico 53. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	71
<i>Gráfico 54. Prevalencia de personas diabéticas por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	71
<i>Gráfico 55. Prevalencia de personas hipertensas por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	72
<i>Gráfico 56. Prevalencia de personas hipertensas por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	72
<i>Gráfico 57. Prevalencia de personas hipertensas por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	73
<i>Gráfico 58. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	73
<i>Gráfico 59. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	74
<i>Gráfico 60. Prevalencia de personas hipertensas por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	74
<i>Gráfico 61. Prevalencia de personas con problemas de nervios por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	75
<i>Gráfico 62. Prevalencia de personas con problemas de nervios por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	75
<i>Gráfico 63. Prevalencia de personas con problemas de nervios por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	76
<i>Gráfico 64. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	76
<i>Gráfico 65. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.	77

<i>Gráfico 66. Prevalencia de personas con problemas de nervios por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	77
<i>Gráfico 67. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	78
<i>Gráfico 68. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	78
<i>Gráfico 69. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	79
<i>Gráfico 70. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	79
<i>Gráfico 71. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.....	80
<i>Gráfico 72. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	80
<i>Gráfico 73. Prevalencia de personas con varices en las piernas por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	81
<i>Gráfico 74. Prevalencia de personas con varices en las piernas por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	81
<i>Gráfico 75. Prevalencia de personas con varices en las piernas por provincia. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	82
<i>Gráfico 76. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.....	82
<i>Gráfico 77. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	83
<i>Gráfico 78. Prevalencia de personas con varices en las piernas por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	83
<i>Gráfico 79. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por sexo.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	87
<i>Gráfico 80. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por edad.</i>	
Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	87
<i>Gráfico 81. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	
.....	88

<i>Gráfico 82. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	88
<i>Gráfico 83. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	89
<i>Gráfico 84. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	89
<i>Gráfico 85. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	90
<i>Gráfico 86. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	90
<i>Gráfico 87. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	91
<i>Gráfico 88. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	91
<i>Gráfico 89. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	92
<i>Gráfico 90. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	92
<i>Gráfico 91. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	93
<i>Gráfico 92. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	93
<i>Gráfico 93. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	94
<i>Gráfico 94. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	94
<i>Gráfico 95. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	95
<i>Gráfico 96. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	95
<i>Gráfico 97. Porcentaje de hogares con algún miembro que padezca alguna limitación física, sensorial o psíquica. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	96

Gráfico 98. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	99
Gráfico 99. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	99
Gráfico 100. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	100
Gráfico 101. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	100
Gráfico 102. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	101
Gráfico 103. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011. ..	101
Gráfico 104. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	102
Gráfico 105. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	102
Gráfico 106. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	103
Gráfico 107. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	103
Gráfico 108. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	104
Gráfico 109. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	104
Gráfico 110. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	107
Gráfico 111. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	107
Gráfico 112. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	108

<i>Gráfico 113. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>108</i>
<i>Gráfico 114. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>109</i>
<i>Gráfico 115. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>109</i>
<i>Gráfico 116. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en casa, en el centro de trabajo o de tráfico. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>110</i>

Presentación de la Consejera

El Gobierno de la Junta de Andalucía, fiel al compromiso institucional de contribuir al conocimiento para mejorar la salud y las condiciones de vida de sus ciudadanos, mujeres y hombres, les ofrece esta publicación, que contiene información sobre la evolución del estado de salud, el uso de los servicios sanitarios, estilos de vida y otros determinantes de la salud de la población mayor de 16 años, residente en Andalucía, en los últimos 12 años, a través de las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS) de 1999, 2003, 2007 y la más reciente, procedente de la 4ª EAS, realizada por esta Consejería de Salud y Bienestar Social, entre febrero de 2011 y febrero de 2012.

Debido a la gran cantidad de información que recoge en cada una de las EAS, en esta publicación solo se presenta aquella que se ha considerado como de mayor relevancia. Queda además, a disposición de la comunidad científica y del conjunto del Sistema Sanitario, las bases de datos correspondientes a los diferentes estudios, para profundizar en el análisis de algunos de los aspectos relacionados con la salud de los andaluces y andaluzas, incluidos en estos estudios.

A modo de resumen, les adelanto que, de manera general, en los últimos años, ha mejorado el estado de salud de las personas residentes en Andalucía, medido a partir de la percepción que tienen de su propia salud, tanto en los hombres como en las mujeres, aunque en la actualidad, la percepción de una buena salud es algo mejor en los hombres. Este hecho se refleja además a través de muchos de los indicadores recogidos. Por citarles sólo algunos de ellos, destacaría el descenso en el porcentaje de hombres y mujeres con escasos recursos afectivos, que implica una mejora del apoyo social en la población andaluza, la disminución de personas que padecen algún tipo de dolor que les dificulta realizar con normalidad sus trabajos habituales. En estos últimos doce años, se ha incrementado el porcentaje de personas residentes en Andalucía que realizan algún tipo de actividad física en su tiempo de ocio en todos los grupos de edad. También ha descendido de manera continua y significativa el consumo de tabaco en los hombres entres quienes, tradicionalmente, el consumo ha sido más frecuente. Desde 1999 se ha registrado un descenso de personas con problemas cardíacos, aunque no ha ocurrido lo mismo con respecto a la presencia de otras patologías que aumentan el riesgo cardiovascular como la diabetes.

En este sentido, no puedo dejar de mostrarles mi preocupación por algunos de los resultados puestos en evidencia en estos estudios, como el aumento continuado del porcentaje de mujeres fumadoras, o el inicio en el consumo del alcohol y tabaco en edades tempranas, así como por el porcentaje de la población andaluza, hombres y mujeres mayores de 16 años, con un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad).

En la mayoría de los ocasiones, hemos podido constatar la influencia que las características culturales y socioeconómicas ejercen en el hecho de que una persona disfrute de una mejor o peor salud y calidad de vida, de tal manera que las personas con menor nivel de estudios o pertenecientes a clases sociales menos favorecidas presentan peores resultados.

Como siempre, agradezco la inestimable colaboración de los ciudadanos, hombres y mujeres, que de manera voluntaria han participado en el estudio y a los profesionales que lo han realizado, contribuyendo de esta forma a la mejora de nuestro sistema sanitario público y de la salud de todas las personas que residimos y convivimos en Andalucía.

M^a José Sánchez Rubio

Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Introducción

Objetivos y Metodología



Introducción

Este documento contiene un informe descriptivo de un conjunto de variables seleccionadas por la Secretaría General de Salud Pública de la Junta de Andalucía a partir de los cuestionarios de adultos de las cuatro Encuestas Andaluzas de Salud (EAS) realizadas hasta el momento: en 1999 (EAS-1999), en 2003 (EAS-2003), en 2007 (EAS-2007) y en 2011-2012 (EAS 2011-2012). Su objetivo consiste en describir, de forma básica, los principales aspectos o dimensiones concernientes al estado de salud y a la utilización de los servicios sanitarios de la población adulta (mayores de 16 años de edad) residente en Andalucía, a partir de los datos procedentes de las cuatro encuestas mencionadas, y compararlos gráficamente, cuando sea posible, a través de su evolución en el tiempo, desde 1999 hasta 2011-2012. La visión global del estado de salud de la población andaluza y de determinados aspectos de los servicios sanitarios que ofrece este documento puede ser un buen punto de partida para futuras investigaciones sobre temas específicos.

El lector debe ser consciente de que el análisis estadístico contenido en este documento es meramente descriptivo, con el único propósito de ofrecer una primera y elemental aproximación a la información derivada de estos instrumentos de medida, pero que, para finalidades de estimación o comparación estadística, deberá acudir a las técnicas inferenciales adecuadas (intervalos de confianza, tests de hipótesis). Y, por supuesto, no olvidar que la verificación de hipótesis de investigación requiere un tratamiento estadístico, y metodológico en general, adecuado para tal propósito.

La información se presenta atendiendo a cinco grandes bloques temáticos:

BLOQUE I:	Nivel de Salud
BLOQUE II:	Determinantes de Salud
BLOQUE III:	Prácticas Preventivas
BLOQUE IV:	Medio Ambiente
BLOQUE V:	Servicios Sanitarios

Objetivo

El objetivo de este informe es describir los resultados seleccionados de la encuesta andaluza de salud de adultos del año 2011 (EAS_2011) y su comparación con las encuestas andaluzas anteriores (1999, 2003 y 2007).

La descripción de los resultados será a modo global y desagregado según los siguientes aspectos sociodemográficos:

- Sexo
- Grupo de edad
- Provincia de residencia
- Nivel de estudios
- Nivel de ingresos
- Clase social

Metodología

Población objeto de estudio

La población de estudio está conformada por las personas mayores de 16 años de edad residentes en Andalucía en los años 1.999, 2.003, 2.007 y 2011 (entre febrero de 2011 y febrero de 2012), no institucionalizadas: Se incluyen las viviendas principales y alojamientos fijos, aquellas viviendas utilizadas todo el año o la mayor parte del mismo como residencia habitual o permanente, pero se excluyen del marco muestral las residencias colectivas, que comprenden hoteles, hospitales, orfanatos, cuarteles, cárceles, conventos, etcétera, aunque sí se incluyen las viviendas ubicadas en estos establecimientos cuando existe un núcleo familiar independiente como, por ejemplo, la vivienda de los directivos o conserjes.

Tipo de muestreo y unidades muestrales

Para cada una de las ediciones de la EAS, el tipo de muestreo utilizado ha sido el muestreo probabilístico, por conglomerados, polietápico y estratificado. Las unidades muestrales fueron:

- 1ª etapa: Municipios (unidades primarias)
- 2ª etapa: Secciones censales (unidades secundarias)
- 3ª etapa: Viviendas familiares/hogares (unidades terciarias)
- 4ª etapa: Individuos (unidades elementales)

Estratificación y afijación muestral

La Encuesta ha utilizado dos criterios básicos de estratificación, atendiendo al área geográfica: la provincia y el tamaño del hábitat de residencia. De esta forma, la provincia da lugar a 8 estratos. Respecto al hábitat, resultan cinco estratos:

- | | |
|------------|--|
| Estrato 1. | Capitales de provincia. |
| Estrato 2. | Otros municipios con más de 50.000 habitantes. |
| Estrato 3. | Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes. |
| Estrato 4. | Municipios de 2.001 a 10.000 habitantes. |
| Estrato 5. | Municipios de hasta 2.000 habitantes. |

La afijación muestral por cada estrato resultante del cruce de hábitat y provincia se ha llevado a cabo de forma proporcional a la población existente en los mismos. Existe además un tercer criterio de estratificación definido por el periodo temporal de realización de entrevistas. La muestra se distribuyó uniformemente a lo largo del año correspondiente en cuatro fases u oleadas: submuestras mensuales, que se aplicaron trimestralmente.

El grupo de edad y el sexo se consideraron como dominios, con tamaños muestrales prefijados para cada dominio de sexo y de edad (16 – 24 años, 25 – 44 años, 45 – 54 años, 55 – 64 años, 65 – 74 años y 75 y más años).

Tamaño de la muestra

Para un nivel de confianza del 95%, un porcentaje poblacional esperado del 50% ($P=Q$), un error muestral para estimaciones globales de $\pm 1,413$, un efecto de diseño de 1.35, se prefijó un tamaño muestral de 6.496 personas para cada una de las EAS. Tras el trabajo de campo, estas muestras fueron de 6.484, 6.708, 6.511 y 6507 individuos para las EAS99, EAS03, EAS07 y 2011-2012, respectivamente.

Análisis de los datos

En este documento la información se presenta con resúmenes gráficos de los resultados y el resumen descriptivo en el texto. Las variables cualitativas fueron analizadas mediante las distribuciones de porcentajes y las cuantitativas a través de la media aritmética.

Los resultados están desglosados por sexo, edad, provincia, nivel de estudios, nivel de ingresos y clase social, además de aportar la información de forma global.

Resultados



Resumen de Resultados

Nivel de Salud

Desde 1999 se ha producido un descenso en el porcentaje de personas residentes en Andalucía que tienen una mala percepción de su salud. Esto ha sucedido tanto en hombres como en mujeres (en hombres, 3,1% en 1999, 3,7% en 2003, 2,5% en 2007 y 2,2% en 2011-2012, y en mujeres 5,3%, 5,8%, 5,7% y 4,6%, respectivamente).

En el año 2011-2012, un 3,4% de la población andaluza percibió su estado de salud como malo o muy malo, siendo mayor el porcentaje de mala salud percibida entre las mujeres (4,6%). Dichos porcentajes aumentaron a medida que aumentaba la edad del entrevistado. En los grupos de adultos con menor nivel de estudios, menor nivel de ingresos y clase social más desfavorecida fue mayor el porcentaje de aquellos que percibían su salud como mala.

Respecto a la salud física, medida mediante la escala SF-12 (escala numérica de 0 a 100), la puntuación media fue de 51,1, siendo un poco mayor en el caso de los varones (51,8). La misma tendencia se observa para la puntuación de salud mental de la escala SF-12, cuya media fue de 50,6: los hombres obtuvieron una puntuación mayor (51,8 frente a 49,1 para mujeres). Las personas con más alto nivel de estudios, ingresos y clase social más favorecida, presentaron mayor media en las puntuaciones.

El 7,4% de los andaluces declaró tener algún tipo de dolor que limitaba el desarrollo normal de las actividades cotidianas, con más frecuencia entre las mujeres que en los hombres (9,8% frente al 4,9%).

Desde 1999 se observó un descenso en el porcentaje de personas con limitaciones para el trabajo habitual hasta el año 2007, pero en 2011-2012 aumentó, aunque sin llegar a alcanzar los valores de 1999. Un 7% de las personas residentes en Andalucía tuvieron, en las semanas previas al estudio, algún problema de salud física o emocional que les dificultó la realización de actividades sociales, con grandes diferencias entre hombres y mujeres (4,6% hombres frente a 9,3% mujeres). A menor nivel

de ingresos y estudios e inferior clase social, mayor fue la frecuencia de personas con problemas de salud que le limitaban en sus actividades.

En el año 2011-2012, las tres enfermedades crónicas más frecuentes fueron la artrosis (8,7%), el colesterol elevado (12,3%) y la hipertensión (18,7%). Se observan porcentajes más altos entre las mujeres y las personas de mayor edad. Además, a menor nivel de estudios, ingresos e inferior clase social mayores fueron los porcentajes de adultos que padecen alguna enfermedad crónica.

Desde 1999 ha descendido el porcentaje de personas con alergias crónicas, problemas cardíacos, o artrosis, destacando esta última, mientras que se ha producido un aumento de personas con colesterol elevado, diabetes e hipertensión arterial.

Entre las personas con algún tipo de limitación física, psíquica o sensorial, las más frecuentes fueron las primeras (4% de la población andaluza). Para las limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas se observan porcentajes más altos entre las mujeres, en las personas de mayor edad, en las personas con menor nivel de estudios e ingresos y en las clases sociales más desfavorecidas.

Respecto al grado de autonomía personal, en las personas con 65 años o más, las limitaciones para realizar actividades cotidianas de tipo instrumental fueron las más frecuentes que las limitaciones para realizar actividades básicas (el 33,1% de la población frente al 22,8% de personas con limitaciones tipo básico). En ambos casos la limitación fue mayor en las mujeres que en los hombres. Para los dos tipos de limitaciones la edad es un factor influyente, así como bajo nivel de estudios en las limitaciones de tipo básico. Desde el año 2003 se observa un aumento en el porcentaje de personas con limitación de la autonomía personal, siendo más acusado en el caso de limitaciones básicas, tanto en hombres como en mujeres.

El 35,6% de la población andaluza declaró haber sufrido un accidente en los 3 meses previos a la encuesta. El mayor porcentaje se dio entre los adultos de 65 a 74 años (50%). El hogar del entrevistado fue el lugar donde se produjo el accidente con más frecuencia.

Determinantes de la salud

En 2011, un 85,4% de las personas mayores de 16 años declaró consumir fruta fresca y un 75,1% verduras y hortalizas, al menos tres veces por semana. En líneas generales, la proporción de personas que consume verdura, hortalizas y fruta fresca al menos tres veces por semana aumentó en los últimos años. Este aumento se produce para todos los grupos de edad, provincias, nivel de estudios, de renta y clases sociales.

En el año 2011, el 59,7% de la población mayor de 16 años tenía un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad), mayor en los hombres (65%) que en las mujeres (54,4%). En líneas generales, en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de la población andaluza mayores de 16 años con un peso superior al normal y se mantiene un gradiente social, en la medida en que al aumentar el nivel de estudios, ingresos y clase social, disminuye el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad.

El 26,8% de la población andaluza mayor de 16 años declaró no practicar ejercicio físico en su tiempo libre, manteniendo las mujeres (31,1%) una vida más sedentaria que los hombres (22,3%). La proporción de personas sedentarias en tiempo libre en 2011 ha disminuido a prácticamente la mitad del valor de 2007.

Un 3,1% de la población andaluza mayor de 16 años considera que puede realizar un consumo excesivo de alcohol, valorado mediante el test CAGE; los hombres (5,4%) tienen un mayor porcentaje que las mujeres (1%). Las personas con ingresos superiores (4,2%) y clase social más favorecida (3,8%) son quienes tienen un mayor porcentaje. La edad media de inicio al consumo de alcohol es 17,7 años, más elevada entre las personas de mayor edad.

Desde 1999 hasta 2011-2012, la población andaluza que dice haber consumido tabaco a diario mantuvo los valores en torno al 31%. Destaca el aumento del porcentaje de mujeres (25,2% en 2011-2012) que fuman a diario en este periodo y el descenso de hombres (36,8% en 2011-2012). La edad de inicio al consumo de tabaco es de 16,9 años.

En 2011-2012, casi el 50% de la población andaluza declaró haber intentado dejar de fumar en alguna ocasión. Este porcentaje fue más elevado en las personas con mayor edad. Desde el 2003 hubo un descenso de las personas que se plantearon dejar de fumar en alguna ocasión hasta el 2007, a partir de este momento (hasta el 2011) aumentó un 15% la proporción de personas que habían intentado dejar de fumar en alguna ocasión. Este aumento es más elevado en las mujeres que en los hombres.

En el año 2011, el porcentaje de personas fumadoras a quienes su médico les aconsejó dejar de fumar fue un 35,8%. Las personas con un nivel socioeconómico desfavorecido fueron aconsejadas en mayor porcentaje respecto a las personas con un nivel socioeconómico superior. Desde el 2007, aumentó el porcentaje de personas cuyos médicos les aconsejaron dejar de fumar en más de un 15%.

Prácticas preventivas

Entre los mayores de 65 años, la cobertura de vacunación frente a la gripe ha ido aumentando desde 1999. En 2011, el 66% de los andaluces mayores de 74 años se vacunó frente a la gripe. Las personas con un nivel socioeconómico desfavorecido tuvieron un porcentaje más elevado de vacunación respecto a las personas con un nivel socioeconómico superior.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, un 38,7% no utilizó ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales. Entre las personas con menor nivel educativo, el porcentaje de personas que no utilizó ningún método anticonceptivo (67,6%) fue más elevado que entre las personas con el nivel educativo superior (34,2%).

En 2011, casi el 87% de las mujeres andaluzas acudió alguna vez al ginecólogo, alcanzando el 90% en las mujeres de 25 a 64 años. Las visitas al ginecólogo alguna vez han aumentado progresivamente desde 1999 (68,3%) hasta 2011-2012 (86,9%) en todos los grupos de edad y estatus sociales.

El 46,5% de las mujeres se había realizado alguna vez una mamografía: los porcentajes mas elevados se alcanzaron entre los 45 y 54 años (66,5%) y entre los 55 a 64 años (91,6%). En este grupo de edad

es en el que más ha aumentado el porcentaje de mamografías desde 2007 (75,8%). También es llamativo el aumento de mamografía entre mujeres con menores niveles de estudio entre 2007 (42%) y 2011 (56,5).

Desde 2007 ha aumentando el número de mujeres que se realizaron citologías, desde un 53,6% hasta un 64,6% en 2011. Este aumento se ha producido en todos los grupos socioeconómicos, aunque el porcentaje es mayor entre las mujeres con mayores niveles de estudios e ingresos económicos.

Un 27,6% de la población andaluza acudió al dentista en los últimos 6 meses en 2011. Las personas entre 16 y 54 años fueron quienes más se preocuparon sobre su higiene buco-dental. Entre las personas con un nivel socioeconómico favorecido se observó un mayor porcentaje de ellas que habían asistido al dentista en los últimos seis meses.

En relación a la seguridad vial, más del 90% de la población andaluza siempre usó el caso, tanto en carretera como en ciudad (alrededor de un 5% más alto el porcentaje de uso en carretera). Casi el 90% de los residentes en Andalucía utilizó siempre el cinturón cuando viajaban en coche en ciudad, y más de un 99% lo utilizó siempre cuando viajaban en coche en carretera. El 98,8% utilizó siempre asientos especiales para menores en los desplazamientos en coche.

Medio ambiente, entorno social y laboral

En el año 2011, el 86,3% de los residentes en Andalucía poseían una vivienda en propiedad y un 12,2% poseían vivienda en alquiler. Las personas con edades avanzadas, mayores de 55 años, fueron quienes tuvieron un porcentaje superior al 90% de viviendas en propiedad. Los menores de 44 años poseían viviendas en alquiler en un porcentaje algo superior al 17%. Cuanto mayor poder adquisitivo, mayor es el porcentaje de personas con viviendas en propiedad. Respecto al nivel de estudios, las personas con estudios primarios fueron quienes en mayor porcentaje tenían viviendas en alquiler. Se observa como el porcentaje de personas con viviendas en propiedad disminuye con los años.

El 34,5% de la población andaluza eran personas fumadoras pasivas en el hogar: las personas de 16 a 24 años fueron fumadores pasivos en el hogar en un 52%, disminuyendo este porcentaje a medida que avanza la edad. Las personas con estudios universitarios y clase social muy favorecida fueron

quienes en menor porcentaje estuvieron expuestos al humo del tabaco en su vivienda. El porcentaje de personas en ambientes cargados de humo, tanto entre semana como en el fin de semana, ha tenido un gran descenso desde 2007. En relación a las personas fumadoras pasivas entre semana, en 2011 un 4,3% de personas permanecieron en ambientes cargados de humo de 1 a 4 horas diarias, y un 2,1% de personas más de 4 horas en este tipo de ambiente. Las personas jóvenes permanecieron en este tipo de ambiente en mayor porcentaje, disminuyendo el porcentaje de adultos a medida que aumenta la edad. Destacamos Huelva por tener un 12,6% de personas en ambientes cargados de humo de 1 a 4 horas diarias entre semana. Los porcentajes de personas fumadores pasivos en el fin de semana, son ligeramente superiores que entre semana, aunque mantienen la misma tendencia.

En los últimos años ha descendido la proporción de personas trabajadoras que manifiestan estar expuestas a sustancias peligrosas. En el año 2011, un 14,5% de la población andaluza manifestó que estuvo muy expuesta a respirar y manejar sustancias peligrosas en su puesto de trabajo. La proporción fue mayor entre los hombres que en las mujeres y en el grupo de edad entre 55 a 64. Destacan Almería y Granada como las provincias con un porcentaje superior al 20% de la población trabajadora que manifestó estar expuesta a estas sustancias peligrosas.

Entre 2007 y 2011 ha disminuido el porcentaje de personas que manifiestan haber estado expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo, Este descenso en los últimos años, se ha producido en todos los grupos de edad, nivel de estudios y nivel de ingresos. En 2011, un 32,3% de la población andaluza estuvo muy expuesto a posiciones dolorosas o fatigantes. Los hombres (35,7%) estuvieron más expuestos a estas posiciones que las mujeres (27,1%). En líneas generales, en la población trabajadora andaluza la percepción negativa de la influencia del trabajo en la salud ha ido disminuyendo con el paso de los años, sin encontrarse diferencias por sexo, pero con un mayor porcentaje de personas con afectación negativa en el puesto de trabajo en el grupo de edades superiores.

Respecto al apoyo social de la población andaluza, esta se recogió a través de la escala de apoyo social de DUKE que mide, por un lado, la posibilidad de contar con personas para comunicarse (apoyo emocional) y, por otro lado, las demostraciones de amor, cariño y empatía que recibe una persona (apoyo afectivo). En Andalucía el porcentaje de personas que manifestó tener escasos apoyos, confidencial y afectivo, ha disminuido en los últimos años. En 2011-2012 solo un 2,6% de andaluces consideran que haber tenido un escaso apoyo confidencial y solo un 5,6% escaso apoyo

afectivo. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas con escaso apoyo social.

Servicios sanitarios

En el año 2011, el 27,6% de la población andaluza había consultado al médico en las dos semanas previas a la encuesta. Más del 70% lo había hecho en un centro de salud o consultorio, independientemente del sexo, edad, provincia y nivel socioeconómico. El principal motivo de visita para más del 50% fue diagnóstico y tratamiento. Y más del 80% visitó a un profesional de medicina general. Jaén (34,4%) y Córdoba (34,3%) fue donde más se consultó al médico. Acudieron más a consultas médicas personas mayores, con menor nivel de estudios, ingresos y de clase social más desfavorecida.

El 7,8% de los andaluces estuvo ingresado al menos una noche en el hospital, observándose entre las mujeres (9,5%) y entre las personas de más de 75 años un mayor porcentaje de hospitalización. A menor nivel de estudios, ingresos y clase social más desfavorecida, más hospitalizaciones se registraron.

En el año previo a la entrevista, el 24,2% de la población andaluza acudió alguna vez a urgencias. El 97,1% de esas personas utilizaron servicios pertenecientes a la Seguridad Social. Las mujeres asistieron un 7% más que los hombres a urgencias. Las personas de 75 años o más fueron las que en mayor porcentaje demandaron dicho servicio (34,6%). Se refleja la tendencia de un mayor porcentaje de personas que usan el servicio de urgencias si el nivel de estudios, ingresos y clase social son más bajos. El servicio de urgencias más utilizado fue el público, independientemente del nivel socioeconómico.

El 85% de los andaluces que acudió al dentista lo hizo en una consulta privada. Las personas más jóvenes (hasta 44 años) fueron las que más frecuentaron el dentista. Más del 80% de la población de cada provincia acudió al dentista privado, seguido del dentista de la seguridad social. Más del 80% de personas de todos los niveles socioeconómicos acudieron al dentista privado.

El 60% de la población andaluza consumió algún tipo de medicamento. Los grupos que más consumieron fueron las mujeres (70,1%), los de mayor edad (95,6%), los de menor nivel de estudios (69,5%), menores ingresos (70%) y clase social más desfavorecida (60,7%).

Presentaron doble cobertura sanitaria el 4,5% de las personas entrevistadas. La franja de edad donde se observó el mayor porcentaje fue de 25 a 44 años (6,3%). Y según el perfil socioeconómico, entre las personas con estudios universitarios (10,8%), ingresos superiores a 2500€ (14,6%) y de clases sociales más favorecidas (10,8%) fue donde se observaron los mayores porcentajes.

Bloque I

Nivel de Salud



Salud general: Percepción de mala salud

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 3,4% de la población andaluza declaró tener una mala o muy mala percepción de su salud. En las mujeres se percibió la mala (mala o muy mala) salud en mayor porcentaje (4,6% frente al 2,2% de los hombres). Se observa una relación directa entre la percepción de mala salud y la edad del encuestado: los porcentajes aumentan desde un 0,4% en personas de 16 a 24 años hasta un 15,4% en mayores de 75 años.

Granada fue la provincia en la que mayor porcentaje de personas percibieron de forma más negativa su salud general, 6%, frente a Sevilla, donde se observa el porcentaje más bajo en Andalucía de personas con una percepción de mala salud, el 2,2%.

Las personas con nivel de estudios primarios fueron las que tuvieron mayor porcentaje (5,2%) de mala salud percibida en 2011; en las personas con nivel de estudios secundarios dicho porcentaje era del 1%, prácticamente igual que los que alcanzaron los estudios universitarios. Con respecto al nivel de ingresos, se observa que prácticamente existe también una relación directa (5,9% en la categoría hasta 999€, 3,4% entre 1000 y 1499€, 1,5% entre 1500 y 2499€ mensuales, 2,5% más de 2500€ mensuales), con la excepción de la subida relativa en los de mayor poder adquisitivo. Por último, en cuanto a la clase social a la que pertenecía el encuestado, observamos que cuanto más desfavorecida era la clase social, peor salud declaró tener el encuestado (1,2% clases I y II, 1,7% clase III, 3,5% clases desfavorecidas).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Tanto en hombres como en mujeres, se ha producido un descenso en los porcentajes de personas residentes en Andalucía que tuvieron una percepción de mala salud (mala o muy mala). En cuanto a la edad del encuestado, los porcentajes se han mantenido estables en todos los rangos de edad, excepto en los de 45 a 54 años, 55 a 64 años y 65 a 74 años, que descendieron en los últimos años.

Con respecto a la zona geográfica de residencia, se observa que los porcentajes de personas cuya percepción de salud fue mala o muy mala son similares en las provincias andaluzas, en general, excepto en Almería, donde se da un descenso apreciable.

No se detectan diferencias en los porcentajes de personas cuya percepción de salud fue mala a lo largo de los años de realización de la encuesta según el nivel de estudios o el nivel de ingresos (con excepción de aquellos que ingresaban menos de mil euros mensuales). Sin embargo, cabe destacar que entre las personas de clase social III el porcentaje que percibía su salud como mala o muy mala se ha reducido de un 3,9% en 1999 a un 1,7% en 2011.




Gráfico 1. Prevalencia de mala salud percibida por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 2. Prevalencia de mala salud percibida por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 3. Prevalencia de mala salud percibida por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 4. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 5. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 6. Prevalencia de mala salud percibida por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Salud general: Puntuación física de la escala SF-12

En el cuestionario SF-12 las personas contestaron a una serie de preguntas relacionadas con su estado de salud. Una vez codificadas las respuestas, los valores se trasladaron a una escala de 0 (el peor estado de salud) a 100 (el mejor estado de salud). Este cuestionario se utilizó para medir la dimensión física de la salud general de la población andaluza.

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el valor medio en la escala de salud física SF-12 para la población andaluza fue 51,1. Estos valores fueron superiores en los hombres (51,8) que en las mujeres (50,5). Los valores medios según la edad del encuestado disminuían conforme aumentaba la edad (desde un 54,8 en personas de 16 a 24 años hasta un 37,9 en personas de 75 años o más). La provincia con mayor valor medio fue Sevilla (52,1) y la de menor valor medio fue Granada (49,6).

Según el nivel de estudio del encuestado, los valores medios en la escala de salud física varían: el valor de la media pasó de 49,4 en el grupo de personas cuyos estudios eran primarios a 53,7 para estudios secundarios y 54,1 para estudios universitarios.

Se observa una relación directa según el nivel de ingresos: a mayores ingresos, mayor valor medio en la escala de salud física de la persona (49,2 en la categoría hasta 999€ mensuales; 51,4 entre 1.000 y 1499€ mensuales; 53 entre 1.500 y 2499€ mensuales; 53,5 en 2500€ mensuales o más).

Por último, en la relación entre los valores medios en la escala de salud física y la clase social a la que pertenecía el encuestado, se pasó de 53,4 para clases más favorecidas a 52,2 para la clase media y a 50,7 para las clases más desfavorecidas.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde el año 1999 se han observado unos valores medios similares del estado de salud física: se pasa de un 52,2 en 1999 a un 51,1 en 2011. Un poco más acusado fue el descenso entre los hombres (de un 53,3 en 1999 a un 51,8 en 2011). Además, durante todo el periodo de estudio los hombres tuvieron mejor estado de salud física que las mujeres.

Con respecto a la edad del encuestado, en general, los valores medios de salud física han descendido en algo menos de un punto: encontramos un poco más acusado el descenso entre los adultos de 16 a 24 años y 75 o más (de 56,2 en 1999 a 54,8 en 2011; y de 41,7 en 1999 a 37,9 en 2011, respectivamente), y el aumento entre los adultos de 55 a 64 y de 65 a 74 (de 47 en 2003 a 49,1 en 2011; y de 43,1 en 2003 a 45,1 en 2011, respectivamente).

Se produce un leve descenso de algo menos de un punto en todas las provincias, excepto en Granada, en la que se pasó de un 51,7 en 2007 a un 49,6 en 2011.

De igual manera se produce una leve disminución con el paso de los años en cuanto al nivel de estudios del encuestado. Algo similar ocurre con el nivel de ingresos, con la excepción de las personas con ingresos de menos de 1000€ mensuales, con un aumento de más de dos puntos desde 2003 hasta 2011 (de 46,9 en 2003 pasó a 49,2 en 2011). Por último, también se constata un leve descenso de las puntuaciones en todas las clases sociales.




Gráfico 7. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 8. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 9. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 10. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 11. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 12. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Salud general: Puntuación mental de la escala SF-12

En este apartado se utilizó el cuestionario de salud SF-12 para medir la dimensión mental de la salud general de la población andaluza. Los valores obtenidos en las preguntas se cuantificaron en un rango que va del 0 hasta el 100, que indica que cuanto mayor es la puntuación obtenida mejor es el estado de salud en la ciudadanía en la dimensión analizada.

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En 2011 se obtuvo un valor medio de salud mental de 50,6 para el total de la población. De nuevo, para salud mental, fueron los hombres los que obtuvieron una puntuación mayor (51,8 frente a 49,1 para mujeres).

Con respecto a la edad del encuestado, se observa una mejor salud mental en personas más jóvenes: los valores medios descienden desde el 53,3 de personas entre 16 y 24 años hasta el 47,5 de personas con 75 años o más.

Según la zona geográfica, en todas las provincias se obtuvieron valores medios similares, alrededor de los 51, excepto en Almería, Granada y Sevilla, donde se obtuvieron valores inferiores a 50 (en particular, Granada fue la provincia que obtuvo el menor valor medio de toda Andalucía, 48,2).

Se obtuvieron mayores valores medios para niveles de estudios más avanzados (49,5 primarios; 51,7 secundarios; 52,9 universitarios). Lo mismo ocurrió para los ingresos, ya que a mayor nivel de ingresos mayor valor medio obtenido, con una diferencia de tres puntos entre las personas con menos de 1000€ mensuales y las que tenían 2500€ mensuales o más (49,4 y 52,3, respectivamente). En las clases sociales superiores fue donde los adultos obtuvieron una puntuación más alta (una media de 52,2 frente a 50,1 de las clases más desfavorecidas).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un aumento en el valor medio de la escala de salud mental (de 48,7 en 1999 a 50,6 en 2011): los varones obtuvieron una cifra mayor en todos los años del estudio. Sin embargo, también se aprecia un leve descenso desde 2003, aunque sin llegar a valores inferiores a los de 1999.

En cuanto a la edad del encuestado, se produjo un aumento de los valores medios de la puntuación mental de la escala SF-12 desde 1999 en todos los grupos de edades, siendo más acusado el aumento entre la población de 16 a 24 años (de 50,4 en 1999 pasó a 53,3 en 2011).

En el caso de la provincia en que residía el encuestado se produjeron, en general, mejores cifras en los niveles de salud mental, destacando la población de Cádiz con una subida de más de tres puntos (de 48,1 en 1999 a 51,8 en 2011).

Según el nivel de estudios, se produjo un aumento prácticamente constante de alrededor de dos puntos en todos los niveles. Con respecto a la clase social a la que pertenecía el encuestado, se produjo también una mejora en las puntuaciones de la escala de salud mental. Las personas de clases superiores aumentaron en media tres puntos desde 1999 hasta 2011 (49,5 en 1999 a 52,5 en 2011).

Indicadores de salud mental




Gráfico 13. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Indicadores de salud mental




Gráfico 14. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 15. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 16. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 17. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 18. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual

La limitación para la realización de las actividades cotidianas se estudió preguntando a las personas encuestadas por la existencia de algún dolor que les dificultara el trabajo habitual durante las cuatro semanas previas, trabajo habitual que incluía el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas.

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el 2011 un 7,4% de los andaluces declaró haber tenido algún tipo de dolor que les dificultaba el desarrollo normal de las actividades cotidianas, siendo bastante grande la diferencia entre hombres y mujeres, ya que se registró un 4,9% de hombres con limitación frente al 9,8% de mujeres. Esta prevalencia fue menor en la población más joven y crece de manera progresiva con el aumento de la edad (de un 1,6% de personas entre 16 y 24 años pasó a un 27,5% de personas de 75 años o más).

En cuanto al estudio por zona geográfica, Granada fue la provincia con el porcentaje más alto de personas con dificultades en el trabajo habitual (11,3%) frente a Málaga y Sevilla, donde se observa el porcentaje más bajo (5%). Tanto en las personas con nivel de estudios más básico, como en las que poseen ingresos mensuales inferiores, o en las pertenecientes a clases sociales más desfavorecidas, se observaron porcentajes más altos y, por tanto, fueron las que más limitaciones tuvieron para realizar con normalidad su trabajo habitual.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se puede observar un descenso en los porcentajes de personas con limitaciones para el trabajo habitual hasta el año 2007. Sin embargo, en general, se experimentó un aumento en los porcentajes correspondientes a 2011, sin llegar a alcanzar los valores de 1999. En el total de la población se registró un 8,2% en 1999, un 6,8% en 2003, un 4,4% en 2007 y un 7,4% en 2011. En todo este tiempo las mujeres tuvieron más dificultades que los hombres para realizar con normalidad actividades cotidianas.

Con respecto a la edad del encuestado se observa la misma tendencia de descenso hasta 2007 y aumento en 2011, destacando las franjas de más edad. Fijándonos en el aumento de 2007 a 2011, destacan el caso de 55 a 64 años que aumentó en más de cuatro puntos, el de 65 a 74 años que aumentó casi seis puntos y el de 75 años y más que aumentó en más de siete puntos, superando los porcentajes de 1999 y 2003.

Según la zona geográfica de residencia se presenta la misma situación anterior: destacan las provincias de Almería y Granada, en las que el aumento en 2011 fue más acusado. Sin embargo, se registró un descenso de los porcentajes durante todos los años para Sevilla.

En lo referente al nivel de estudios del encuestado, se observa la tendencia anteriormente mencionada sólo para nivel de estudios primarios y secundarios, aunque en este último se produjo un aumento más leve del porcentaje de 2011. Para el caso de nivel de estudios universitarios la limitación de las actividades cotidianas disminuyó con el paso de los años.

En cuanto al nivel de ingresos mensuales del encuestado, se observa que: para menos de 1000€ mensuales se mantuvieron los porcentajes de personas con dificultad para realizar con normalidad el trabajo habitual; en el caso de 1000 a 1499€ mensuales y de 1500 a 2499€ aumentó el porcentaje de personas con limitaciones para actividades cotidianas, y para 2500€ mensuales o más se observa una disminución hasta 2007 y aumento en 2011, mencionada con anterioridad.

Por último, en relación con la clase social a la que pertenece el encuestado, en las más favorecidas disminuyó el porcentaje de personas con limitaciones para realizar actividades cotidianas (del 5,7% en 1999 pasó al 2,4% en 2011), y en las más desfavorecidas el porcentaje de personas con dificultades para realizar con normalidad el trabajo habitual disminuyó hasta 2007 y aumentó en 2011 (9,6% en 1999; 6,9% en 2003; 4,4% en 2007; 7,8% en 2011).

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Gráfico 19. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Gráfico 20. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Gráfico 21. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual




Gráfico 22. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 23. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 24. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocional que dificultan las actividades sociales

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 un 7% de las personas residentes en Andalucía tuvieron algún problema de salud física o emocional en las 4 semanas previas a la realización de la encuesta, problemas que les dificultó la realización de actividades sociales. Se observaron grandes diferencias entre hombres y mujeres (4,6% hombres frente a 9,3% mujeres).

Al igual que ocurría para la realización de trabajo habitual, la prevalencia de personas en las que algún problema de salud limitó sus actividades sociales fue superior en la población de mayor edad: pasó de un 2,2% en personas de 16 a 24 años a un 20,7% en personas de 75 años o más.

En cuanto a la provincia de residencia del encuestado, Almería fue en la que mayor porcentaje de personas tuvieron dificultades en sus actividades sociales (11,9%), frente a Málaga, que fue la que menor porcentaje mostró (3,6%). Según el nivel de estudios, se observa que a mayor nivel de estudios, menor fue la limitación en las actividades sociales por problemas de salud física y emocional (9,5% para estudios primarios; 3,7% para estudios secundarios; 3,1% para estudios universitarios). Existe una relación similar entre el nivel de ingresos y las dificultades en las actividades sociales, ya que pasa del 11,2% de personas con ingresos inferiores a 1000€ mensuales a 2,9% de personas con 2500€ mensuales o más. Lo mismo ocurrió entre los grupos de clases sociales a la que pertenecían: las clases más desfavorecidas son las que en mayor porcentaje tuvieron dificultad en sus actividades sociales debido a problemas de salud física o emocional.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La tendencia fue similar al trabajo habitual. Se produjo un descenso de personas con dificultades en sus actividades sociales desde 1999 hasta 2007 y, posteriormente, se registró un aumento en 2011. Sin embargo, en este caso el porcentaje de 2011 superó al del 1999. De nuevo, las mujeres fueron las que más dificultades se encontraron, superando a los hombres en, aproximadamente, un 4%.

Con respecto a la edad, se dio la misma tendencia que en la sección anterior. Destacan los porcentajes de personas de entre 65 y 74 años: 14,7% en 1999, 10% en 2003, 7,3% en 2007, 12,8% en 2011. En lo referente a la zona geográfica, hubo un incremento considerable entre 2007 y 2011, excepto en Málaga.

Según el nivel de estudios del entrevistado, el patrón de datos fue similar al de las limitaciones en el trabajo habitual, destacando el caso de estudios primarios, donde se produjo un mayor aumento de 2007 a 2011 (7,9% en 1999; 6,9% en 2003; 5,1% en 2007; 9,5% en 2011). En cuanto al nivel de ingresos mensuales, se produjo un aumento de los porcentajes de quienes declararon haber tenido algún tipo de problema de salud físico o emocional que les dificultara sus actividades sociales en todos los rangos, excepto en 2500€ mensuales o más, donde pasó de un 3,8% en 2003 a un 3% en 2007 y a un 2,9% en 2011. Por clase social, observamos también un descenso en el porcentaje de personas con limitaciones en su vida social hasta el 2007 y luego un aumento en 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Gráfico 25. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Gráfico 26. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Gráfico 27. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Gráfico 28. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Gráfico 29. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales




Gráfico 30. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Enfermedades crónicas

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 las tres enfermedades crónicas más frecuentes fueron la artrosis o reumatismo (8,7%), el colesterol (12,3%) y la hipertensión (18,7%). La menos frecuente fue los problemas cardíacos (solo un 4%). Las mujeres presentaron mayores porcentajes que los hombres: 5% de hombres en contraste con el 12,3% de mujeres en el caso de artrosis o reumatismo; 10,9% de hombres versus 13,7% de mujeres con colesterol; 16,3% de hombres y el 21% de mujeres que tenían hipertensión; mientras que, solo el 3,8% de hombres y el 4,2% de mujeres tenían problemas cardíacos.

Para todas las enfermedades, los porcentajes de personas que las padecían aumentaron a medida que aumentaba la edad de éstas, excepto en el caso de alergias crónicas, que ocurrió al contrario (pasó del 8,8% de personas de 16 a 24 años al 4,5% de personas de 75 años o más). Con respecto a la zona de residencia, Almería fue la provincia donde se dio un menor porcentaje de artrosis (5,8%) y en Jaén la que más (16,3%). En el caso del colesterol, Huelva fue la provincia con mayor porcentaje (19,1%) y Sevilla con menor (10%). Jaén destaca con la mayor frecuencia de hipertensión (23,1%), y en Almería con la menor (13,4%). Para la enfermedad menos común, los problemas cardíacos, Sevilla fue la provincia con menor porcentaje (2,8%) y Jaén la de mayor porcentaje (5,9%).

En cuanto al nivel de estudios, se cumple para todas las enfermedades crónicas (excepto alergias) que las personas con nivel de estudios hasta estudios primarios fueron las que en mayor porcentaje las padecieron. Destacamos las tres enfermedades más comunes: artrosis o reumatismos (un 13% entre personas con estudios primarios, un 2,8% de personas con estudios secundarios y 3,3% de personas con estudios universitarios); colesterol (un 18,5% de personas con estudios primarios, un 3,8% de personas con estudios secundarios y 5,2% de personas con estudios universitarios); hipertensión (un 28,1% entre personas con el nivel de estudios más bajo, un 5,9% de personas con estudios secundarios y 7,3% de personas con estudios universitarios). En el caso de los problemas cardíacos (enfermedad menos frecuente en 2011) se observa un 6,3% en personas con hasta

estudios primarios, un 1,3% de personas con estudios secundarios y 0,6% de personas con estudios universitarios.

Por nivel de ingresos, en todas las enfermedades (excepto las alergias crónicas) la tendencia es que a mayor nivel de ingresos menor porcentaje de personas con enfermedades crónicas. En el caso de alergias crónicas se registró un 6,1%, en personas con hasta 999€ mensuales; el porcentaje fue aumentando hasta llegar al 10,8% de personas con 2500€ mensuales o más. En cuanto a las tres enfermedades más comunes, la artrosis o el reumatismo registró un 14,8% de personas con hasta 999€ mensuales versus un 3,3% de personas con 2500€ mensuales o más; con colesterol se registró un 17,8% frente a un 7,5%; y con hipertensión, un 28,9% frente a un 7,5%, respectivamente.

Respecto a la clase social, en las clases más desfavorecidas se observan porcentajes más altos de personas con enfermedades crónicas (a excepción de alergias crónicas). La artrosis o reumatismo aumentó de un 4,2% personas de clases sociales superiores a un 7,8% personas de clases inferiores. El colesterol aumentó de un 7,3% a un 13% y la hipertensión de un 12,3% a un 18,5%. En el caso de las alergias crónicas disminuyó de un 9% en las clases superiores a un 5,6% en las inferiores.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se registró un descenso de personas con alergias crónicas, artrosis, problemas cardíacos y varices en las piernas: destaca la artrosis, que descendió en un 11% (de un 13% en 1999 disminuyó a un 5% en 2011 en hombres, y de un 25,5% en 1999 disminuyó a un 12,3% en 2011 en mujeres). Se produjo un aumento de personas con colesterol, diabetes e hipertensión: destaca esta última, donde se registró un aumento del 7,5% (de un 9,2% en 1999 aumentó a un 16,3% en 2011 en el caso de los hombres, y de un 13,3% en 1999 aumentó a un 21% en 2011 para mujeres).

Con respecto a la edad, se dieron las mismas tendencias que en el total, destacando algunas enfermedades: la artrosis o reumatismo disminuyó en las personas de edad comprendida entre 55 a 64 años, que pasó de un 41,2% en 1999 a un 15% en 2011. El colesterol aumentó en más de un 10% entre las personas de edad de 65 a 74 años y de 75 años y más. El porcentaje de personas con problemas de nervios disminuyó hasta el año 2007 y aumentó en 2011 en todos los rangos de edad. El porcentaje de personas con varices en las piernas disminuyó en un 10% entre las personas con edades de 55 a 64 años.

Según la zona de residencia, se observa la misma tendencia para cada enfermedad crónica. Destaca el aumento de personas con colesterol en Huelva (de un 5,8% en 1999 a un 19,1% en 2011); el aumento de personas con hipertensión en Huelva y Jaén, (Huelva pasó de un 11,4% en 2007 a un 20,6% en 2011 y Jaén pasó de un 6,9% en 1999 a un 23,1% en 2011). Y la disminución de personas con varices en las piernas en Almería (de un 16% en 2003 pasó a un 2,8% en 2011).

Las personas con un nivel de estudios primarios fueron las que presentaron mayores cambios en ciertas enfermedades como, por ejemplo, artrosis o reumatismo (disminución del 13%), colesterol (incremento del 8%) e hipertensión (aumento del 14%). Para cada enfermedad crónica, la tendencia en los porcentajes según el nivel de ingresos es similar a los porcentajes globales observados: destacan los porcentajes de personas diabéticas, ya que aumentó para todos los niveles excepto para personas con 2500€ mensuales o más, para el cual disminuyó.

Alergias crónicas




Gráfico 31. Prevalencia de personas con alergia crónica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 32. Prevalencia de personas con alergia crónica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 33. Prevalencia de personas con alergia crónica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 34. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 35. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 36. Prevalencia de personas con alergia crónica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Artrosis o reumatismo




Gráfico 37. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 38. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 39. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 40. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 41. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 42. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Colesterol




Gráfico 43. Prevalencia de personas con colesterol alto por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 44. Prevalencia de personas con colesterol alto por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 45. Prevalencia de personas con colesterol alto por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 46. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 47. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 48. Prevalencia de personas con colesterol alto por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Diabetes




Gráfico 49. Prevalencia de personas diabéticas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 50. Prevalencia de personas diabéticas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 51. Prevalencia de personas diabéticas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 52. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 53. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 54. Prevalencia de personas diabéticas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Hipertensión




Gráfico 55. Prevalencia de personas hipertensas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 56. Prevalencia de personas hipertensas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 57. Prevalencia de personas hipertensas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 58. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 59. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 60. Prevalencia de personas hipertensas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Problemas de nervios




Gráfico 61. Prevalencia de personas con problemas de nervios por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 62. Prevalencia de personas con problemas de nervios por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 63. Prevalencia de personas con problemas de nervios por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 64. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 65. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 66. Prevalencia de personas con problemas de nervios por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Problemas cardíacos




Gráfico 67. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 68. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 69. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 70. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 71. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 72. Prevalencia de personas con problemas cardíacos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Varices en las piernas




Gráfico 73. Prevalencia de personas con varices en las piernas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 74. Prevalencia de personas con varices en las piernas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 75. Prevalencia de personas con varices en las piernas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 76. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 77. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 78. Prevalencia de personas con varices en las piernas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 las limitaciones más frecuentes fueron las de tipo físico (4% de la población andaluza), mientras que las limitaciones sensoriales o psíquicas resultaron minoritarias (0,8% y 0,6%, respectivamente). La frecuencia de las limitaciones (físicas, psíquicas o sensoriales) fue similar entre hombres y mujeres.

En relación con la edad, se produjo un aumento progresivo tanto en limitaciones físicas como en sensoriales (físicas pasa de un 0,5% en 16 a 24 años a un 14% en 75 años o más; y sensoriales aumenta de un 0,1% en 16 a 24 años a un 2,8% en 75 años o más).

Para las limitaciones físicas la provincia con mayor porcentaje fue Huelva, 6,4%, frente a Sevilla que sólo presentó un 2,4%. Para limitaciones sensoriales el porcentaje mayor fue recogido también por Huelva, 2,7%, mientras que Granada y Sevilla solo presentaron un 0,3%. Y para limitaciones psíquicas Almería, Córdoba y Jaén fueron las provincias con el porcentaje más alto, 1,1%.

En los tres tipos de limitaciones se recogió el porcentaje más alto en personas con estudios primarios (5,7% en físicas, 1% en sensoriales y 0,8% en psíquicas). Las personas con menor nivel de ingresos fueron los que presentaron mayor porcentaje en limitaciones físicas, 7,4%, y sensoriales, 1,1%; mientras que para las psíquicas el porcentaje más alto correspondió a personas con 2500€ mensuales o más, 1,7%. Por último, en las clases sociales inferiores fue donde se dio un mayor porcentaje de personas con limitación física (4,3%), sensorial (0,9%) y psíquica (0,6%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la prevalencia de personas con limitaciones física, sensorial y psíquica evolucionó de forma diferente. La limitación física experimentó un descenso. En las mujeres subió el porcentaje casi dos puntos (de 2,3% en 2007 a 4,2% en 2011), frente a solo un punto de aumento en los hombres (de 2,9% en 2007 a 3,9% en 2011).

Por rango de edad, se presenta unos cambios más bruscos: un aumento en 2011, en las edades comprendidas de 65 a 74 años y 75 años o más (este último aumento de casi un 5%). En cuanto a la zona geográfica, Almería y Huelva tuvieron un mayor aumento.

El nivel de estudios evolucionó de forma parecida a los casos anteriores, destacando las personas con estudios primarios, que de un 3,6% en 2007 pasaron a un 5,7% en 2011. Según el nivel de ingresos mensuales, se produjo un aumento de personas con limitaciones físicas en todos los rangos de ingresos desde 2003, excepto las personas con menos de 999€ mensuales. En las clases sociales se produjo un aumento en 2003, un descenso en 2007 y un aumento en 2011.

El porcentaje de personas con limitación sensorial se mantuvo estable desde 2003, un 0,8%. Los hombres presentaron porcentajes levemente superiores a los de las mujeres. Permanecieron estables los porcentajes en todos los rangos de edad, excepto en personas de 45 a 54 años y de 75 y más años. Según la zona geográfica, se observa un descenso en los porcentajes de las provincias excepto en Almería y Huelva.

La prevalencia de limitación sensorial se mantuvo estable en todos los niveles de estudios, de ingresos y clase social. La excepción fueron las rentas menores a 999€ mensuales, cuyo porcentaje aumentó en 2007 y disminuyó en 2011, y las clases superiores, en las que disminuyó gradualmente desde 1999.

En relación a las limitaciones psíquicas, los porcentajes se mantuvieron estables (0,6% en 2003; 0,3% en 2007; 0,6% en 2011). No se aprecian diferencias entre hombres y mujeres. En todos los rangos de edad se mantuvieron porcentajes similares durante todos los años y en todas las provincias, a excepción de Córdoba, Huelva y Jaén, que aumentaron progresivamente. No hubo cambios en la evolución con respecto al nivel de estudios o de ingresos. Sin embargo, aumentó el porcentaje de personas con limitaciones psíquicas en renta superior a 2500€ mensuales (de 0% en 2003 pasó a 1,7% en 2011). También se mantuvieron estables los porcentajes en cuanto a las clases sociales.

Desde el año 1999 se observa que en las limitaciones física y sensorial se produjo un aumento hasta 2007 (del 5,5% en 1999 al 11,5% en 2007 para física y del 1,6% en 1999 al 2,7% en 2007 para sensorial) y posteriormente, en 2011, se registró un descenso de personas con dichas limitaciones (8% para física y 1,9% para sensorial). El caso de limitación psíquica es diferente, ya que el porcentaje aumentó hasta 2007 y se mantuvo en 2011 (1% en 1999; 1,8% en 2003; 1,9% en 2007; 1,9% en 2011).

Limitaciones físicas




Gráfico 79. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 80. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 81. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 82. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 83. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 84. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitaciones sensoriales




Gráfico 85. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 86. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 87. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 88. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 89. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 90. Porcentaje de personas con algún tipo de limitación sensorial por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Limitaciones psíquicas



Gráfico 91. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 92. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 93. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.



Gráfico 94. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.



Gráfico 95. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 96. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Hogares con personas con alguna limitación física, sensorial o psíquica




Gráfico 97. Porcentaje de hogares con algún miembro que padezca alguna limitación física, sensorial o psíquica. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Autonomía personal

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 las limitaciones de tipo instrumental fueron las más frecuentes en cuanto a la reducción de la autonomía individual de la población (el 33,1% de la población frente al 22,8% de personas con limitaciones tipo básico). En ambos casos la limitación fue mayor en las mujeres que en los hombres. Al avanzar la edad del entrevistado, mayores fueron los porcentajes recogidos (del 18,4% en las personas de 65 a 74 años se pasó al 49,1% con 75 años o más, en el caso del tipo instrumental; y del 11% al 35,7%, respectivamente, en las de tipo básico).

La provincia que mayor porcentaje de limitaciones de tipo instrumental fue Almería (49,4%), y la de mayor porcentaje de tipo básico fue Huelva (35,5%). En ambos tipos de limitaciones, Sevilla fue la provincia con menor porcentaje (24,1% para instrumentales y 16,3% para el tipo básico).

A menor nivel de estudios, mayor fue la limitación (en el caso del tipo instrumental 34,3% para primarios frente a 15,4% para universitarios; y en el caso del tipo básico 23,5% para primarios frente a 12,8% para universitarios). Las clases sociales superiores presentaron menos limitaciones de ambos tipos (33,8% para las de tipo instrumental y 23,8% para las de tipo básico).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

Desde el año 2003 se observa un aumento en el porcentaje de personas con limitación de la autonomía personal, tanto en hombres como en mujeres. La mayor frecuencia de limitaciones de ambos tipos se produjo en el rango de edad de 75 años y más (46,5% en 2003; 45,7% en 2007; 49,1% en 2011, para tipo instrumental, y 30,4% en 2003; 21% en 2007; 35,7% en 2011). Las limitaciones de tipo instrumental aumentaron en todas las provincias, excepto en Málaga y Sevilla.

En cuanto a las limitaciones de tipo básico se registró un aumento de personas limitadas en Cádiz, Córdoba y Jaén y un descenso en Sevilla. En las provincias de Almería, Granada, Huelva y Málaga disminuyó el número de personas con limitaciones básicas en 2007 y posteriormente, en 2011,

volvieron a subir los porcentajes. Almería es la provincia en la que se produjo un aumento mayor en el porcentaje, pues pasó de un 7,9% en 2007 a un 34,5% en 2011.

La evolución del porcentaje de personas con limitaciones de tipo instrumental siguió un patrón diferente dependiendo del nivel de estudios. Para personas con nivel de estudios primarios, se produjo un descenso de los porcentajes en 2007 y un aumento en 2011. En la población con estudios universitarios ocurrió al contrario, y en personas con nivel de estudios secundarios aumentó el porcentaje de limitaciones a lo largo de los años. Por el contrario, en cuanto a las limitaciones de tipo básico, se produjo en todos los niveles un descenso en 2007 y un aumento en 2011, destacando el aumento de las personas con estudios primarios (de un 20,3% en 2003 pasó a un 13% en 2007, y a un 23,5% en 2011). Aumentó la frecuencia de personas con limitaciones de tipo instrumental en el grupo de menos de 999€ mensuales y con 2500€ mensuales o más. En el caso de limitaciones de tipo básico se produjo un descenso en 2007 y un aumento en 2011 para todos los niveles de ingresos mensuales, excepto en personas con 2500€ mensuales o más, que aumentó hasta un 5%. En cuanto a la clase social, se vuelve a repetir la tendencia de descenso en 2007 y aumento en 2011.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental




Gráfico 98. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 99. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 100. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 101. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 102. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 103. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.

Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico




Gráfico 104. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 105. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 106. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por provincia. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 107. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 108. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 109. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.

Accidentes en los últimos tres meses

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 35,6% de la población residente en la comunidad autónoma de Andalucía tuvo un accidente en los tres meses previos a la encuesta. Dichos accidentes fueron más frecuentes en las mujeres (37,3%) que en los hombres (34,1%). En cuanto a la edad del entrevistado, el menor porcentaje correspondió al grupo de 16 a 24 años (32,3%), y el mayor a los comprendidos entre 65 y 74 años (50%).

Según la zona geográfica de residencia, Cádiz fue la provincia en que se produjeron menos accidentes en los últimos tres meses (28,8%), frente a la provincia de Huelva, que registró el mayor porcentaje de accidentes de Andalucía (50%). Las personas con nivel de estudios universitarios fueron las que sufrieron más accidentes (48%) y las que tenían estudios secundarios fueron las que presentaron menor porcentaje de accidentes en los tres meses previos a la realización de la entrevista (31,1%). A medida que aumentaba el nivel de ingresos, mayor era el porcentaje de accidentes: un 30,5% para la categoría hasta 999€ mensuales, un 40% para los de entre 1000€ y 1499€ mensuales y con ingresos entre 1500€ y 2499€ mensuales, y un 66,7% en las personas con mayor nivel de ingresos (2500€ mensuales o más). El mayor porcentaje de accidentes en los últimos tres meses (44,2%) correspondió a las clases superiores. Las personas de clases medias fueron las que menos accidentes tuvieron en 2011 (22,7%).

En 1999, 2003 y 2011 el mayor número de accidentes se produjo en el hogar de la persona entrevistada (30,7%, 28,8% y 34%, respectivamente). En el año 2007 fueron los de tráfico los accidentes más frecuentes (26,8%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 2007 el número de accidentes fue disminuyendo hasta llegar a un 35,6% en 2011. En general, el número de accidentes fue mayor para mujeres en todos los años. Sin embargo, fue entre ellas donde se observa un mayor descenso de 2007 a 2011 (pasaron de un 53,3% a un 37,3%).

Con respecto a la edad del entrevistado, también se produjo descenso de accidentes desde 1999. Las franjas de edad de 16 a 24 años y de 75 años y más fueron las que mayor descenso tuvieron desde 2007: esta última fue la de mayor diferencia (entorno a un 30% de descenso).

El porcentaje de accidentes ha disminuido, entre 1999 y 2011, en todas las provincias y en todos los niveles de estudios, aunque el menor descenso se produce en aquellos con estudios universitarios (categoría en la que más accidentes se produce, por otra parte).

En lo referente al nivel de ingresos, se observa un descenso de aproximadamente un 20% en todos los niveles. Durante todos los años de realización de este estudio se cumplió que a mayor nivel de ingresos, más alto fue el número de accidentes. Por último, en cuanto a la clase social, se observa una disminución en todas ellas, destacando la clase social media, que registró un descenso de casi un 30% desde 2007.

Desde 1999 se produjo una disminución de accidentes en casa hasta 2007. Sin embargo, en 2011 se produjo un incremento de, aproximadamente, el 10%. En cuanto a los accidentes en el centro de trabajo, se produjo un aumento de accidentes en 2003 y, posteriormente, el porcentaje fue disminuyendo hasta 2011. En lo referente a los accidentes de tráfico, se produjo un aumento hasta 2007, pero en 2011 disminuyó aproximadamente un 4%.




Gráfico 110. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 111. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 112. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 113. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 114. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 115. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Accidentes en los últimos tres meses: Lugar del accidente





Gráfico 116. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en casa, en el centro de trabajo o de tráfico. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012

Muestra de Adultos



Bloque II
**Determinantes
de la Salud**

Índice

Listado de Gráficos	112
CONSUMO DE ALCOHOL: FRECUENCIA DE CONSUMO	117
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	117
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	117
CONSUMO DE ALCOHOL: EDAD DE INICIO AL CONSUMO DE ALCOHOL	121
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	121
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	121
CONSUMO DE ALCOHOL: SOSPECHA DE ALCOHOLISMO	125
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	125
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	125
CONSUMO DE TABACO: FRECUENCIA DE CONSUMO	130
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	130
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	130
CONSUMO DE TABACO: EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE TABACO	135
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	135
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	135
CONSUMO DE TABACO: ACTITUD ANTE EL TABAQUISMO	139
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	139
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	140
ALIMENTACIÓN:	144
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	144
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	145
CONSUMO DE LÁCTEOS	146
CONSUMO DE FRUTA FRESCA	149
PESO CORPORAL: SOBREPESO Y OBESIDAD	155
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	155
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	155
ACTIVIDAD FÍSICA	159
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	159
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	160
SEDENTARISMO EN EL TRABAJO O ACTIVIDAD HABITUAL	161
SEDENTARISMO EN EL TIEMPO LIBRE	164

Listado de Gráficos

<i>Gráfico 117. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por sexo. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.....	118
<i>Gráfico 118. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por edad. Andalucía</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.....	118
<i>Gráfico 119. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por provincias.</i>	
Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	119
<i>Gráfico 120. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	119
<i>Gráfico 121. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	120
<i>Gráfico 122. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	120
<i>Gráfico 123. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	122
<i>Gráfico 124. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	122
<i>Gráfico 125. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por provincias. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	123
<i>Gráfico 126. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	123
<i>Gráfico 127. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.....	124
<i>Gráfico 128. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	124
<i>Gráfico 129. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	127
<i>Gráfico 130. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	127

Gráfico 131. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	128
Gráfico 132. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	128
Gráfico 133. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	129
Gráfico 134. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	129
Gráfico 135. Prevalencia de personas que fuman a diario por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. ...	132
Gráfico 136. Prevalencia de personas que fuman a diario por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. ..	132
Gráfico 137. Prevalencia de personas que fuman a diario por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	133
Gráfico 138. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	133
Gráfico 139. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	134
Gráfico 140. Prevalencia de personas que fuman a diario por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	134
Gráfico 141. Edad media de inicio al consumo de tabaco por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	136
Gráfico 142. Edad media de inicio al consumo de tabaco por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. ...	136
Gráfico 143. Edad media de inicio al consumo de tabaco por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	137
Gráfico 144. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	137
Gráfico 145. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	138
Gráfico 146. Edad media de inicio al consumo de tabaco por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	138
Gráfico 147. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	141
Gráfico 148. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	141

Gráfico 149. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	142
Gráfico 150. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	142
Gráfico 151. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	143
Gráfico 152. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	143
Gráfico 153. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.	146
Gráfico 154. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.	146
Gráfico 155. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.	147
Gráfico 156. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.	147
Gráfico 157. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.	148
Gráfico 158. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.	148
Gráfico 159. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.	149
Gráfico 160. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.	149
Gráfico 161. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.	150
Gráfico 162. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.	150
Gráfico 163. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.	151
Gráfico 164. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.	151

Gráfico 165. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.	152
Gráfico 166. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.	152
Gráfico 167. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.	153
Gráfico 168. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.	153
Gráfico 169. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.	154
Gráfico 170. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.	154
Gráfico 171. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	156
Gráfico 172. Porcentaje de trabajadoras con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	156
Gráfico 173. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	157
Gráfico 174. Porcentaje de con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	157
Gráfico 175. Porcentaje de con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	158
Gráfico 176. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	158
Gráfico 177. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	161
Gráfico 178. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	161
Gráfico 179. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	162

<i>Gráfico 180. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de estudios.</i>	
<i>Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	162
<i>Gráfico 181. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de ingresos.</i>	
<i>Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	163
<i>Gráfico 182. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por clase social. Andalucía.</i>	
<i>Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	163
<i>Gráfico 183. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por sexo. Andalucía.</i>	
<i>Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	164
<i>Gráfico 184. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por edad. Andalucía.</i>	
<i>Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	164
<i>Gráfico 185. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por provincias. Andalucía.</i>	
<i>Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	165
<i>Gráfico 186. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
<i>Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	165
<i>Gráfico 187. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
<i>Años 2003, 2007 y 2011.</i>	166
<i>Gráfico 188. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por clase social. Andalucía.</i>	
<i>Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	166

Bloque II
**Determinantes
de la Salud**



Consumo de alcohol: Frecuencia de consumo

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 44,4% de la población andaluza mayor de 16 años consumió alcohol al menos una vez al mes. El porcentaje de hombres (59,9%) duplicó al de mujeres (29,4%). A medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de personas que consumió alcohol al menos una vez al día: desde el 52,8% de los jóvenes de 16 a 24 años hasta el 16,8% de las personas mayores de 75 años.

Por área geográfica, Jaén (50,8%) y Córdoba (50%) es donde mayor porcentaje de personas consumen alcohol al menos una vez al mes, y Granada (35,8%) donde menor porcentaje se obtiene. En el perfil socioeconómico, se observa que conforme aumenta el nivel de estudios (59,7% personas universitarias), de ingresos mensuales de la unidad familiar (59,2% personas con renta superior a 2500€) y la clase social (58,6% personas en la clase social más favorecida) se incrementa también el porcentaje de personas que dijeron que consumían alcohol al menos una vez al mes.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

En líneas generales ha aumentado la población andaluza que consume alcohol al menos una vez al mes desde 2003: De un 38,8% de personas en 2003 se pasa a un 44,4% en 2011. Dicho aumento se produce tanto en hombres como en mujeres, en todos los grupos de edad, excepto en los mayores de 75 años, y en todas las provincias, salvo en Granada y Sevilla, donde se observa una tendencia a la baja.

Según el nivel socioeconómico, se ha incrementado el consumo de alcohol en todos los niveles de las variables nivel de estudios, ingresos familiares mensuales y clase social




Gráfico 117. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 118. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 119. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 120. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 121. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 122. Porcentaje de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.

Consumo de alcohol: Edad de inicio al consumo de alcohol

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 la edad media de inicio al consumo de alcohol fue de 17,7 años, más tardía para las mujeres (18,7 años) que para los hombres (17,3 años).

Los jóvenes que en 2011 tienen entre 16 y 24 años son quienes comienzan a beber antes (a los 16,2 años de media). La edad media de inicio al consumo de alcohol se incrementa según crece el grupo de edad, de manera que quienes en 2011 tienen más de 75 años son los que más tarde comenzaron a consumir alcohol (a los 19,6 años).

Por el área geográfica, en la provincia de Huelva (16,9 años de media) es donde las personas inician el consumo de alcohol antes y en Granada (18,3 años de media) más tarde. Apenas se aprecian diferencias por nivel familiar mensual de ingresos y clase social. Los que tienen un nivel de estudios primarios comienzan a consumir alcohol algo más tarde.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la edad media de inicio al consumo de alcohol se ha mantenido constante desde 2003, en torno a los 17,8 años. Esta igualdad se mantiene prácticamente en todos los grupos de edad, provincias, nivel de estudios y clase social.




Gráfico 123. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 124. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 125. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 126. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 127. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 128. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consumo de alcohol: Sospecha de alcoholismo

Se realizó otra serie de preguntas relacionadas con la actitud ante el consumo de alcohol, perteneciente al test CAGE. Se consideró sospecha de alcoholismo los casos en los que al menos una de las cuatro preguntas realizadas tenía respuesta afirmativa.

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 3,1% de la población española mayor de 16 años se considera que es sospechosa de alcoholismo según este test. Los hombres (5,4%) tienen un mayor porcentaje que las mujeres (1%).

Por grupos de edad, a medida que aumenta la edad disminuye la proporción de personas con sospechas de alcoholismo. Los jóvenes de 16 a 24 años tienen un porcentaje de sospecha de alcoholismo del 5,4%.

Según el área geográfica, Almería (11,3%) es donde se encuentra el porcentaje mayor de sospecha de alcoholismo y Córdoba el menor (0,9%). Según el aspecto socioeconómico, las personas con nivel de estudios secundarios (4,4%), de ingresos superiores a 2500€ (4,2%) y clase social más favorecida (3,8%) son quienes tienen un mayor porcentaje.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, la proporción de personas con sospecha de alcoholismo ha aumentado en los últimos años. Éste es mayor en los hombres que en las mujeres desde 2003. Según las diferentes edades, hasta los 54 años, los porcentajes han aumentado, descendiendo en personas mayores de 55 años.

Según las provincias, aumenta la proporción de personas con sospecha de alcoholismo en la mayoría de provincias en los últimos años, presentando un aumento considerable, casi un 10%, la provincia de Almería. Como excepción tenemos Granada y Sevilla, donde desciende el porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo desde 2003. Respecto al ámbito socioeconómico, los porcentajes de personas con sospecha de alcoholismo presentaron una tendencia al alza en relación al nivel de estudios, de ingresos y las clases sociales. Como excepción cabe destacar las personas con ingresos superiores a 2500€, cuyo porcentaje disminuye desde 2003.




Gráfico 129. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 130. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 131. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 132. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 133. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.



Gráfico 134. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consumo de tabaco: Frecuencia de consumo

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 30,9% de la población andaluza mayor de 16 años manifestó que consumía tabaco a diario. Este porcentaje era mayor para los hombres (36,8%) que para las mujeres (25,2%).

Por grupos de edad, el 40,7% de la población entre 25 y 44 años fumaba tabaco a diario, seguidos de la población de entre 45 y 54 años (39,3%) y el 30,8 % de entre 16 y 24 años. Los porcentajes disminuyeron a partir de los 55 años hasta alcanzar el 4,4% de la población mayor de 75 años.

En relación al área geográfica, observamos que la provincia de Almería es donde se encuentra el porcentaje más alto de personas que declaró fumar a diario (37%), y Jaén donde se encuentra el porcentaje mínimo (24,7%).

Según el nivel de estudios, el 33,8% de la población con estudios secundarios afirmó consumir tabaco a diario, seguidos de las personas con de estudios primarios (30,1%) y, en última posición, las personas con estudios universitarios (28,2%).

Por nivel de ingresos, el 32,6% de la población mayor de 16 años con renta entre 1000€ y 1499€ mensuales en la unidad familiar declaró consumir tabaco a diario. Los porcentajes son menores del 30% en los extremos: menos de 999€ o más de 2500€ de renta familiar mensual).

Por clase social, el mayor porcentaje de personas que fuman a diario (36,5%) pertenece a la clase social más desfavorecida; dicho porcentaje disminuye conforme aumenta la clase social, hasta reducirse al 30,5% de la clase social más favorecida.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 hasta 2011, la población andaluza que dice haber consumido tabaco a diario mantuvo los valores en torno al 31%. Destaca el aumento del porcentaje de mujeres que fuman a diario en este periodo y el descenso de hombres.

Se observa una reducción en el porcentaje de personas que fuman a diario en los diferentes grupos de edad, excepto para los grupos 16-24 años, 45-54 años y 55-64 años, en los que aumenta el consumo diario de tabaco.

En Almería y Huelva se produjo un incremento apreciable del porcentaje de fumadores, mientras que en Jaén la reducción fue importante.

Por el nivel de estudios, observamos cómo en los últimos años descienden los porcentajes de las personas que declararon fumar a diario con estudios secundarios o universitarios y se mantienen prácticamente igual los correspondientes a estudios primarios.

Según el nivel de ingresos, en los extremos (menores de 999€ y mayores de 2500€) aumenta ligeramente el porcentaje de personas que fuman a diario, pero disminuye en las personas con nivel de ingresos medios (entre 1000€ y 2499€). Por la clase social, aumentó considerablemente el porcentaje de personas que fumaba a diario pertenecientes a las clases sociales desfavorecidas (III y IV), y se mantuvo prácticamente constante en las superiores (I y II).




Gráfico 135. Prevalencia de personas que fuman a diario por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 136. Prevalencia de personas que fuman a diario por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 137. Prevalencia de personas que fuman a diario por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 138. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 139. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 140. Prevalencia de personas que fuman a diario por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consumo de tabaco: Edad media de inicio al consumo de tabaco

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 la edad media de inicio al consumo de tabaco fue de 16,9 años, un poco más elevada para las mujeres (17,6 años) que para los hombres (16,4 años).

Según el grupo de edad, observamos que la media ascendió conforme aumentaba la edad: 15,5 años de media para los jóvenes de 16 a 24 años y 17,6 años de media para las personas de 65 a 74 años.

Por área geográfica, Granada (17,5 años) es donde más tarde se comienza a fumar, y Cádiz (16,5 años) la provincia donde antes se inicia. En el aspecto socioeconómico, comenzaron algo más tarde las personas con estudios universitarios, con ingresos mensuales de la unidad familiar por encima de los 2.500€ y los de las clases sociales superiores.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución de la edad media de inicio en el consumo desde 1999 hasta 2011 se mantuvo estable en torno a los 17 años para el conjunto de la población, y para hombres y mujeres.

Por grupos de edad, los comprendidos entre los 16-24 años y 45-54 años muestran a una ligera tendencia a empezar a fumar un poco antes en las últimas encuestas, y el resto de los grupos mantienen prácticamente las edades de inicio.

Por provincias, la edad de inicio a consumir tabaco se mantiene sin cambios importantes, quizás con ligera tendencia a la baja en Córdoba, Jaén y Málaga. Según el nivel socioeconómico, tampoco se aprecian cambios relevantes.




Gráfico 141. Edad media de inicio al consumo de tabaco por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 142. Edad media de inicio al consumo de tabaco por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 143. Edad media de inicio al consumo de tabaco por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 144. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 145. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 146. Edad media de inicio al consumo de tabaco por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consumo de tabaco: Actitud ante el tabaquismo

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 47,7% de la población andaluza mayor de 16 años indicó que había intentado dejar de fumar en alguna ocasión. Este porcentaje fue mayor en mujeres (51%) que en hombres (45,1%) y en personas con edades comprendidas entre 45 y 64 años.

Según la zona geográfica, Almería (64,2%) fue la provincia donde existió una mayor proporción de personas que habían intentado dejar de fumar alguna vez y Sevilla (39,4%) donde aparece el menor porcentaje.

Por nivel de estudios, el 50% de personas con estudios universitarios se habían planteado dejar el tabaco en alguna ocasión, seguidos de las personas con estudios primarios (47,8%) y secundarios (46,5%).

Las personas con nivel de ingresos inferiores a 1499€ fueron quienes intentaron dejar el consumo del tabaco en alguna ocasión en mayor proporción (48,7% personas con ingresos inferiores a 999€ y 47,1% personas con ingresos entre 1000€ y 1499€), frente al 44,2% de los ciudadanos con nivel de ingresos superior a 1500€.

Las personas de clase social más desfavorecida intentaron en menor proporción dejar de fumar en alguna ocasión (47,5%) que respecto a las clases sociales superiores (51,6% clase social I y II y 52,6% clase social III).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

Desde el 2003 hubo un descenso de las personas que se plantearon dejar de fumar en alguna ocasión hasta el 2007, a partir de este momento (hasta el 2011) aumentó un 15% la proporción de personas que habían intentado dejar de fumar en alguna ocasión. Este aumento es más elevado en las mujeres que en los hombres.

En todos los grupos de edad se observa una tendencia al aumento del porcentaje de los que han intentado dejar de fumar alguna vez, excepto en los adultos entre 45 y 54 años, donde prácticamente se mantiene.

Por área geográfica, en todas las provincias ha aumentado el porcentaje de personas que alguna vez se ha planteado dejar de fumar desde 2003 (excepto en Málaga) y, muy acentuadamente, respecto al año 2007. Almería fue donde más aumentó, llegando a triplicarse respecto a 2007.

Según el nivel socioeconómico, para todas las categorías de las variables nivel de estudios, nivel de ingresos y clase social, el porcentaje de personas que se plantearon dejar de fumar baja, en general, en 2007 respecto a 2003, pero aumenta considerablemente en 2011, superando los porcentajes de 2003 incluso.




Gráfico 147. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 148. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 149. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 150. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 151. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 152. Porcentaje de personas fumadores que alguna vez han intentado dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.

Alimentación:

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En 2011 un 93,8% de las personas mayores de 16 años declararon consumir productos lácteos, un 85,4% consumieron fruta fresca y un 75,1% verduras y hortalizas, al menos tres veces por semana. Este porcentaje fue superior para las mujeres (94,2% productos lácteos, 87,8% fruta fresca y 79,4% verdura y hortalizas) que para los hombres (93,5% productos lácteos, 83% fruta fresca y 70,6% verduras y hortalizas).

En el consumo de productos lácteos, los mayores de 65 años fueron quienes consumieron con mayor frecuencia leche y sus derivados (96,6% de 65 a 74 años, y 95,6% más de 75 años). Para el resto de los grupos de edad estos porcentajes estuvieron en torno al 93%.

Según el área geográfica, Granada (96,8%) y Sevilla (96,9%) fueron las provincias donde mayor proporción de personas consumió productos lácteos al menos tres veces por semana, y Almería (85,5%) donde se registró el menor porcentaje. En el aspecto socioeconómico, las personas con estudios primarios (93,7%), ingresos inferiores a 999€ (92,9%) y clase social superior (92,6%) fueron quienes consumieron menos productos lácteos. Los porcentajes más altos se dieron en personas con estudios superiores, ingresos superiores a los 1000€, y clase social media.

En el consumo de fruta fresca, a medida que aumenta la edad aumenta el consumo de ésta: se pasó de un 75% de jóvenes de 16 a 24 años, a un 95,2% de personas mayores de 75 años. Por área geográfica, Córdoba (90,2%) fue donde mayor porcentaje de personas consumió fruta fresca y Almería (75,4%) donde menos. Las personas con estudios secundarios (82,2%), ingresos inferiores a 999€ (83,5%) y clase social más desfavorecida (84,9%) fueron quienes menos consumieron fruta fresca al menos tres veces por semana. Los porcentajes fueron mayores en las personas con nivel de ingresos superiores y clases sociales más favorecidas.

En el consumo de verduras y hortalizas, a medida que aumenta la edad aumenta el consumo de este producto al menos tres veces por semana: desde un 57% de jóvenes de 16 a 24 años a un 85,3% de personas mayores de 75 años. Córdoba (82,8%) y Granada (82,5%) fueron las provincias donde

mayor proporción de personas consumió verduras y hortalizas; Cádiz (61%) donde menos. En el ámbito socioeconómico, las personas con estudios secundarios (69,6%), ingresos inferiores a 999€ (73,1%) y clase social más desfavorecida (74,2%) fueron quienes menos consumieron verduras y hortalizas al menos tres veces por semana.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En líneas generales, la proporción de personas que consumen verdura, hortalizas y fruta fresca al menos tres veces por semana aumentó en los últimos años. Por el contrario, el consumo de leche y derivados mantuvo sus valores desde 2007, tanto para hombres como para las mujeres.

Con respecto a la edad, en edades intermedias (de 54 a 74 años) aumentó levemente el porcentaje de personas que consumían leche y derivados, al menos tres veces por semana, desde 2007. Sin embargo, en las edades extremas (de 16 a 24 años y mayores de 75 años) nos encontramos que se mantienen los porcentajes de personas que consumían dichos alimentos.

En el ámbito socioeconómico, aumentó levemente la proporción de personas que consumían leche y sus derivados al menos tres veces por semana desde 2007, independientemente del nivel de estudios, renta o clase social.

El aumento en el consumo de verduras, hortalizas y fruta fresca al menos tres veces a la semana en la población andaluza se produce para todos los grupos de edad, provincias, nivel de estudios, de renta y clases sociales en los últimos años.

Consumo de lácteos




Gráfico 153. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 154. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 155. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 156. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 157. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 158. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Consumo de fruta fresca




Gráfico 159. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 160. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 161. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 162. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 163. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 164. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Consumo de verdura




Gráfico 165. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 166. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 167. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 168. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 169. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 170. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Peso corporal: Sobrepeso y obesidad

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 59,7% de la población mayor de 16 años tenía un peso superior al normal (exceso de peso: sobrepeso u obesidad), siendo mayor en los hombres (65%) que en las mujeres (54,4%).

A medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad: el 26% de los jóvenes de 16 a 24 años tenía exceso de peso; en la población de 65 a 74 años fue del 83,9%.

La provincia de Jaén (67,8%) fue donde hubo mayor porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad en Andalucía y Huelva (54,9%) donde se registró la menor proporción. En el ámbito socioeconómico, a medida que aumentaron los niveles de estudios, de ingresos y la clase social, disminuyó el porcentaje de personas con exceso de peso. En particular, hubo un 68,4% de personas con estudios primarios, 66,9% rentas inferiores a 999€ y 62,7% de personas pertenecientes a la clase social más desfavorecida con un peso superior al normal.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de la población andaluza mayores de 16 años con un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad). Este aumento se produce en la misma medida para hombres y mujeres y se ha manifestado tanto en los grupos de edad o en las provincias como en los niveles socioeconómicos, en particular entre los años 2007 y 2011: como excepción, en el intervalo de edad 45 - 54 años y en Huelva, ha disminuido.




Gráfico 171. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 172. Porcentaje de trabajadoras con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 173. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 174. Porcentaje de con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 175. Porcentaje de con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 176. Porcentaje de personas con índice de masa corporal superior a lo normal (es decir, sobrepeso más obesidad) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Actividad física

Para estudiar la actividad física de las personas entrevistadas se les pidió que dijeran qué tipo de ejercicio físico implicaba su trabajo o actividad habitual y cuál era el ejercicio que practicaban en el tiempo libre.

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 86,2% de la población indicó tener una actividad, habitual o laboral, sedentaria, entendiendo este como aquel que se realiza sentado o de pie sin realizar esfuerzos, y fue más frecuente en las mujeres (90,1%) que en los hombres (82,2%). El 26,8% de la población andaluza mayor de 16 años declaró tener una actividad sedentaria en su tiempo libre, mayor en las mujeres (31,1%) que los hombres (22,3%).

A medida que aumenta la edad, aumenta la proporción de personas con trabajos o actividades habituales sedentarias, al igual que en la vida sedentaria en el tiempo libre. El 87,1% de los jóvenes de 16 a 24 años y un 96,5% de personas mayores de 75 años ejercieron un trabajo o actividad habitual sedentaria. El 22,4% de los jóvenes de 16 a 24 años y el 27% de personas de 65 a 75 años ejercieron una vida sedentaria en su tiempo libre, aumentando hasta un 42,2% de las personas mayores de 75 años.

Cádiz (77,6%) fue la provincia donde menor porcentaje se registró de personas que ejercen un trabajo o actividad frecuente sedentaria. Sin embargo, un 91,7% de la población sevillana registró este tipo de vida sedentaria, siendo la provincia con el porcentaje de personas más elevado con trabajo o actividad habitual sedentaria. La mitad de las provincias, Huelva, Almería, Granada y Sevilla, tuvo más de un 30 % de la población con una vida sedentaria en su tiempo libre. Donde practicaron más ejercicio en su tiempo libre fue en Jaén y Córdoba. Las personas con nivel de estudios universitarios (90,6%), nivel de renta inferior a 999€ (89,8%) y clases sociales favorecidas (87,5% de clase social I y II, 88,2% de clase social III) fueron quienes mayor porcentaje de personas con trabajo o actividad habitual sedentaria presentaron. A medida que aumenta el nivel de estudios, ingresos y clase social, disminuye la proporción de personas que no practicaban ejercicio en su tiempo libre. Las personas con estudios primarios (30,9%), nivel de renta inferior a 999€ (29,8%) y clase social menos

favorecida (29,4%) fueron quienes en mayor porcentaje las personas tenían vida sedentaria en su tiempo libre.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, ha aumentado la proporción de personas con trabajo o actividad habitual sedentaria desde el 200, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en el tiempo libre, la proporción de personas que no realizan actividades físicas ha disminuido durante los últimos años en más de un 15%.

En cuanto a la edad del entrevistado, en las edades intermedias (de 25 a 64 años) aumentó, desde 2007, el porcentaje de personas que en su vida laboral o actividad habitual no realizan esfuerzos físicos, es decir, mantienen una vida sedentaria. Sin embargo, en las edades extremas (de 16 a 24 años y mayores de 65 años) nos encontramos que desciende el porcentaje de vida sedentaria (en el trabajo o actividad habitual) desde 2007.

Con respecto a la vida sedentaria en el tiempo libre, los porcentajes disminuyeron en los últimos años, independientemente del rango de edad, en más de un 10%. Las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga han disminuidos su porcentajes en más de un 20% desde 2007. Según el ámbito socioeconómico, aumentó el porcentaje de personas con vida sedentaria, tanto en el trabajo como en actividades habituales, sin distinción de nivel de estudios, ingresos y clase social en los últimos años, a excepción de las personas con ingresos superiores a 2500€. Por el contrario, disminuyó la proporción de personas que no realizan ejercicio en su tiempo libre en los últimos años en todos los niveles de estudios, renta y clase social.

Sedentarismo en el trabajo o actividad habitual




Gráfico 177. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por sexo. Andaluía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 178. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por edad. Andaluía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 179. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 180. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 181. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 182. Porcentaje de sedentarismo en el trabajo o actividad habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Sedentarismo en el tiempo libre




Gráfico 183. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 184. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 185. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 186. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 187. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.





Gráfico 188. Porcentaje de sedentarismo en el tiempo libre por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012

Muestra de Adultos



Bloque III
Prácticas Preventivas

Índice

LISTADO DE GRÁFICOS	170
VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE	176
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	176
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	176
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	180
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	180
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003</i>	180
VISITAS MÉDICAS DE GINECOLOGÍA	184
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	184
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	184
MAMOGRAFÍAS	188
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	188
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	188
CITOLOGÍAS	192
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	192
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	192
EXPOSICIÓN SOLAR	196
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	196
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	196
HIGIENE BUCO-DENTAL: VISITAS ODONTOLÓGICAS	200
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	200
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	200
SEGURIDAD VIAL	204
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	204
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	205
USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD	209
USO DE ASIENTOS ESPECIALES PARA MENORES	213
CONSEJO MÉDICO PARA DEJAR DE FUMAR	216
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	216
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	216

Listado de Gráficos

<i>Gráfico 189. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	177
<i>Gráfico 190. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	177
<i>Gráfico 191. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	178
<i>Gráfico 192. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	178
<i>Gráfico 193. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	179
<i>Gráfico 194. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	179
<i>Gráfico 195. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	181
<i>Gráfico 196. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	181
<i>Gráfico 197. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	182
<i>Gráfico 198. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	182
<i>Gráfico 199. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	183
<i>Gráfico 200. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	183
<i>Gráfico 201. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	185
<i>Gráfico 202. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	185

Gráfico 203. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	186
Gráfico 204. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	186
Gráfico 205. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	187
Gráfico 206. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	187
Gráfico 207. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.	189
Gráfico 208. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.	189
Gráfico 209. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.	190
Gráfico 210. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.	190
Gráfico 211. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.	191
Gráfico 212. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.	193
Gráfico 213. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.	193
Gráfico 214. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.	194
Gráfico 215. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.	194
Gráfico 216. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.	195
Gráfico 217. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.	197
Gráfico 218. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.	197

Gráfico 219. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.	198
Gráfico 220. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.	198
Gráfico 221. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.	199
Gráfico 222. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.	199
Gráfico 223. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	201
Gráfico 224. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	201
Gráfico 225. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	202
Gráfico 226. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	202
Gráfico 227. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	203
Gráfico 228. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	203
Gráfico 229. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	206
Gráfico 230. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	206
Gráfico 231. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	207
Gráfico 232. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	207

Gráfico 233. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	208
Gráfico 234. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	208
Gráfico 235. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	209
Gráfico 236. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	209
Gráfico 237. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	210
Gráfico 238. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	210
Gráfico 239. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	211
Gráfico 240. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	211
Gráfico 241. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	212
Gráfico 242. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	212
Gráfico 243. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	213
Gráfico 244. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	213
Gráfico 245. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	214
Gráfico 246. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	214
Gráfico 247. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	215
Gráfico 248. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	215

Gráfico 249. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011..... 217

Gráfico 250. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011..... 217

Gráfico 251. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011..... 218

Gráfico 252. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011. 218

Gráfico 253. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011. 219

Gráfico 254. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011..... 219

Bloque III

Prácticas Preventivas



Vacunación contra la gripe

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 17,7% de la población andaluza se vacunó contra la gripe en la última campaña: el 17,1% hombres y 18,3% mujeres. Cuanto más edad se tiene, mayor es la preocupación en vacunarse ante la gripe: se vacunó el 51,9% las personas entre 65 y 74 años y el 66% con más de 75 años.

Según el área geográfica, hay pocas diferencias en el porcentaje de personas que se vacunaron en la última campaña, siendo Jaén la que tiene el mayor porcentaje (22,3%) y Sevilla la que tiene el menor porcentaje (15,8%). La población con estudios primarios (25%) y con las rentas mensuales más bajas (27,6%) fue la que tuvo mayor porcentaje de vacunación. En relación a la clase social a la que pertenecen no se observan grandes diferencias.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, desde 1999 se ha incrementado el porcentaje de personas que se vacunó ante la gripe en la última campaña, aunque en 2007 hubo un leve descenso. Ha aumentado ligeramente el porcentaje de hombres y mujeres que se vacunaron. Cuanto mayor es la edad mayor es el porcentaje de las personas que toman medidas ante la gripe.

Según el área geográfica, aunque en la mayoría de las provincias se observa un leve ascenso, Granada y Jaén fueron donde un mayor aumento se produjo desde 1999 en el porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe. En relación a los estudios y la clase social a la que pertenecían, se mantuvieron los valores, exceptuando los que tenían estudios primarios y pertenecían a la clase social más desfavorecida, que experimentaron un aumento desde 1999. Y por último, las personas con unos ingresos medios (entre 1000€ y 2499€) fueron a vacunarse en las últimas campañas que los que tenían menores o mayores ingresos.




Gráfico 189. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 190. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 191. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 192. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 193. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 194. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Métodos anticonceptivos

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el 2011, el 55,6% de la población andaluza afirmó no utilizar ningún método anticonceptivo, ni ellos mismos ni sus parejas: el 49,9% hombres y 61,1% mujeres. Respecto a la edad, las personas mayores de 45 años empiezan a dejar de utilizar métodos anticonceptivos, pasando de un 55,4% (que no usan ningún tipo de método anticonceptivo) para el grupo entre 45 y 54 años hasta alcanzar el 99,7% para los mayores de 65 años en adelante. Los que utilizaron más métodos anticonceptivos son las personas entre 25 y 44 años, siendo un 29,3% los que no utilizaron ninguno. El 38,7% de los jóvenes entre 16 y 24 años no utilizó ningún método anticonceptivo.

En Almería (65%) y Cádiz (63%) es donde menos se utilizaron los métodos anticonceptivos, y en Córdoba (49,1%) y Málaga (49,2%) donde más. En relación a los estudios y la renta, las personas con estudios primarios (67,6%) y con rentas inferiores (67,4%) fueron los que menos utilizaron métodos anticonceptivos. La clase social más desfavorecida (55,3%) fue la que menos utilizó los métodos anticonceptivos.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

En líneas generales, la población andaluza se ha mantenido en valores similares desde 2003 con respecto a la no utilización de métodos anticonceptivos según el sexo, la edad, clase social y el nivel de estudios.

Las personas que recibían una renta media (entre 1000€ y 2499€) han mantenido sus valores desde 1999. Por el contrario, las personas que recibían una renta mayor a 2500€ han dejado de utilizar algún método anticonceptivo: el 28,4% en 2007 y el 40,8% en 2011. La mayoría de las provincias han tenido pocas variaciones con respecto a otros años, desde 2007. Granada ha aumentado el porcentaje de personas que no utilizan ninguna medida anticonceptiva (del 52,5% al 60,4%) y Huelva ha disminuido este porcentaje (del 66% al 55,6%).




Gráfico 195. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por sexo. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 196. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por edad. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 197. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por provincias. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 198. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 199. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 200. Porcentajes de personas que no usan ningún método anticonceptivo por clase social. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.

Visitas médicas de ginecología

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

El 86,9% de las mujeres andaluzas con edad superior a 16 años han acudido en alguna ocasión al ginecólogo: estos porcentajes fueron menores entre las mujeres pertenecientes a los grupos etarios extremos (57,8% en menores de 25 años y 72,9% en mujeres con más de 75 años).

Por situación geográfica, el porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo es similar: el máximo se da en Cádiz (90,6%) y el mínimo en Granada (84,6%). Se observa un claro gradiente positivo con: los estudios universitarios (92%), las rentas más altas (94,2%) y clase social más acomodada (96,3%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución del porcentaje de mujeres que ha visitado al ginecólogo alguna vez ha aumentado desde 1999: desde el 68,3% en 1999 hasta el 86,9% en 2011. En todas las variables estudiadas, edades, provincias, nivel de estudios, nivel de ingresos y clase social, se ha incrementado el porcentaje de mujeres que fueron revisadas alguna vez por los profesionales de la ginecología.




Gráfico 201. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 202. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 203. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 204. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 205. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 206. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Mamografías

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el 2011 las radiografías de mamas se realizaron al 46,5% de las mujeres andaluzas con más de 16 años. El 91,6% de las mujeres con edades comprendida entre 55 y 64 años se hicieron alguna vez una mamografía. Sin embargo, cuanto menor edad, menor porcentaje de mujeres se realizan una mamografía.

La provincia donde se realizaron más mamografías fue en Almería, con un 51,4% de mujeres, y Cádiz donde menos, con el 40,7%. Las mujeres con estudios primarios (56,5%) y una renta menor a 999€ (51,4%) son las que más mamografías se realizaron, en términos porcentuales. Sin embargo, según la clase social a la que pertenecían las mujeres no se observan diferencias.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En líneas generales, ha aumentando el número de mujeres que se realizan mamografías desde 2007: se pasa de un 38,2% en 2007 a un 46,5% en 2011. A partir de los 45 años es cuando aumenta dicho porcentaje.

Según el área geográfica, en las provincias de Huelva (30,6% mujeres en 2007 y 47,6% mujeres en 2011) y Almería (35,5% mujeres en 2007 y 51,4% mujeres en 2011) es donde más ha aumentado la frecuencia de mamografías desde 2007. Se han mantenido los porcentajes para estudios superiores y secundarios. Sin embargo, para las mujeres que tenían hasta estudios primarios se ha producido un aumento considerable: desde el 42% de 2007 hasta el 56,5% de 2011. Según la clase social, disminuye el porcentaje que se hace mamografías de la clase social favorecida (de un 46,2% a un 41,5% entre 2007 a 2011), pero aumenta en las demás clases.




Gráfico 207. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 208. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 209. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 210. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 211. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Citologías

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 64,6% de las mujeres andaluzas mayores de 16 años se habían realizado en alguna ocasión una citología vaginal. Los mayores porcentajes, según edades, pertenecen a las mujeres entre 25 y 44 años (78,3%) y entre 45 a 54 años (79,2%). El mínimo porcentaje de mujeres que se realizaron una citología se encontraba en las edades extremas: el 38,3% corresponde a las mujeres de 16 a 24 años y el 28,9% a las mujeres de 75 años en adelante.

Según el área geográfica, Cádiz es la provincia donde más mujeres acudieron al especialista para realizarse una citología (72,6%) y Jaén es la provincia donde menos (53,9%). Conforme aumentó el nivel de los estudios universitarios, de los ingresos y de la clase social, mayores fueron los porcentajes de mujeres que acudieron al especialista para realizarse una citología.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En líneas generales, desde 2007 ha aumentado el porcentaje de mujeres que se realizaron citologías, pasando de un total de 53,6% en 2007 a un 64,6% en 2011. Por edades, las mujeres de 16 a 24 años y de 55 a 74 años de edad tuvieron un aumento de su porcentaje mayor que el resto.

Según el área geográfica, observamos la evolución favorable de las mujeres que se realizaron una citología, exceptuando las provincias de Córdoba (de 57,1% mujeres en 2007 a 55,7% mujeres en 2011) y Málaga (de 63,8% mujeres en 2007 a 63,1% mujeres en 2011). Entre estos dos años, aumentó el porcentaje respecto al nivel de estudios, ingresos y clase social.




Gráfico 212. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 213. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 214. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 215. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 216. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Exposición solar

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el verano anterior, la población andaluza mayor de 16 años que se expuso al sol en las horas centrales del día (de 12h a 17h) fue un total de 11,2%: un 12,3% hombres y 10,2% mujeres. Los jóvenes entre 16 y 24 años fueron los que más se expusieron al sol en estas horas (22,1%); a partir de esta edad disminuyen los porcentajes a medida que avanza la edad: el mínimo se encuentra en los mayores de 75 años de edad (2,5%).

Según el área geográfica, las provincias cuya población residente se expuso al sol las horas centrales fueron Sevilla (13,9%) y Cádiz (13,8%) y donde menos en Jaén (6,2%). Con respecto al nivel de estudios, los que más se expusieron al sol fueron las personas con nivel de estudios secundarios (16%); los que menos, las personas con estudios primarios (8,6%). La población con más de 2500 euros de ingresos mensuales fue la que más se expuso al sol en las horas centrales del día (16,3%). Según la que clase social a la que pertenecían, no se observa ninguna diferencia.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007

El porcentaje de personas con más de 16 años de edad que se expuso al sol en las horas centrales del día se ha mantenido desde 2007 con respecto a las variables estudiadas. Podemos destacar que en las edades comprendidas entre 16 y 24 años aumentó el porcentaje de personas que se expusieron al sol en estas horas, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de edades, cuyos porcentajes disminuyeron. Según el área geográfica, la tendencia general fue la disminución de los porcentajes respecto a 2007; sin embargo, las provincias de Almería, Cádiz y Granada tuvieron un aumento. Con respecto al nivel de estudios, ingresos y clase social al que pertenecían no se observaron grandes diferencias entre el 2007 y 2011.




Gráfico 217. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 218. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 219. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 220. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 221. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 222. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Higiene buco-dental: Visitas odontológicas

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, un 27,6% de la población andaluza mayores de 16 años acudió al dentista en los últimos 6 meses: el 30,2% mujeres y el 24,9% hombres. Por grupos de edad, las personas con edades comprendidas entre 16 y 24 años tuvieron el porcentaje más elevado de asistencia al dentista (33,8%), reduciéndose este porcentaje según avanza la edad: el mínimo valor para las personas mayores de 75 años (11,7%).

Según el ámbito geográfico, no se observan diferencias reseñables respecto a la asistencia al dentista en los últimos 6 meses. Con respecto al nivel de estudios y de ingresos, existe una tendencia a visitar al dentista según aumentan los niveles de estudios y de ingresos: los valores máximos corresponden a las personas con estudios universitarios (38,1%) e ingresos superiores a 2500€ (41,7%). Esta tendencia también nos la encontramos en la clase social: el mayor porcentaje se da en la clase social superior (36,9%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, observamos un aumento paulatino de los porcentajes de visita al dentista en los últimos 6 meses desde 1999 hasta 2011. Sin embargo, constatamos que dichos porcentajes han disminuido desde 2007 en las edades superiores a 45 años.

Según el área geográfica, nos encontramos diferentes provincias que han aumentado su porcentaje, como Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla, y otras provincias donde disminuye el porcentaje de personas que visitaron al dentista en los últimos 6 meses, como Cádiz, Granada, Huelva y Málaga. Esto ocurre sobre todo desde 2007. Con respecto al nivel de estudios, ingresos y clase social, nos encontramos que los porcentajes de personas que visitaron al dentista en los últimos 6 meses aumentaron desde 1999, pero en los últimos años se estacó o aumentó muy despacio.




Gráfico 223. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 224. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 225. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 226. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 227. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 228. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Seguridad vial

El estudio de la seguridad vial se realizó preguntando por la adopción de medidas como el uso del casco (en el caso de haber ido en moto), cinturón de seguridad o asientos especiales para menores en los desplazamientos.

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, las personas mayores de 16 años adoptaron medidas de seguridad vial con mayor porcentaje en la carretera que en la ciudad. Con respecto al uso del casco, en la ciudad un 91,3% personas usó el casco siempre, y en carretera un 95,5% personas. Los hombres fueron más precavidos que las mujeres utilizando el casco cuando iban en moto (en ciudad: 91,9% hombres y 89,8% mujeres; en carretera: 96,2% hombres y 93,7% mujeres). Aumenta el porcentaje del uso del casco al incrementarse la edad de las personas, tanto en carretera como en ciudad: entre 16 y 24 años (84,6% en ciudad y 93,5% en carretera), y el 100%, en ciudad y carretera, para las edades entre 65 y 74 años.

Destaca el bajo porcentaje en Huelva, tanto en ciudad (77,6%) como en carretera (83,3%): en el resto de provincias superaron el 88% en ciudad y el 90% en carretera. Aunque los valores fueron próximos (superiores al 88%) entre los diferentes niveles de estudios, ingresos y clase social, se apreció un ligero descenso del uso del casco, en ciudad y carretera, para los niveles de estudios primarios, bajo nivel de ingresos y clase social inferior.

Con respecto al uso del cinturón, un 89,3% personas utilizó el cinturón en ciudad, y un 99,7% lo utilizó en la carretera. Su utilización es similar en hombres y en mujeres.. Según la edad, podemos observar que cuanto mayores son las personas, aumenta el porcentaje del uso del cinturón, tanto en carretera como en ciudad: los porcentajes para las edades entre 16 y 24 años son del 76,9% en ciudad y del 99% en carretera, y sobrepasaron el 90% en ciudad y llegaron al 100% en carretera en edades superiores. Los porcentajes de uso del cinturón en carretera oscilaron entre el 79% de Jaén y el 94% de Granada. Respecto el nivel socio-económico, en carretera se observa para todos los niveles y clases sociales, que los porcentajes de uso del cinturón son superiores al 99,5% en carretera. Tanto

en ciudad como en carretera, según aumenta el nivel de estudios, ingresos y clase social, más altos son los porcentajes de utilización del cinturón.

El 98,8% de la población andaluza con edad superior a 16 años utilizó asientos especiales para niños y niñas. Las personas de 16 a 24 años fueron las que menos utilizaron este tipo de asientos (96,7%). Córdoba y Granada tuvieron el 100% de la utilización de asientos especiales infantiles; Sevilla la provincia que tuvo el porcentaje inferior (97,7%). Todos los niveles de estudios estuvieron en torno al 98,8%. Las personas con menos nivel de ingresos fueron quienes menos utilizaron estos asientos especiales (el 98,3% con nivel de ingresos inferior a 1000€ y el 100% de las personas con nivel de ingresos superior a 2500€). La clase social superior fue la que menos utilizó este tipo de asientos (98,1%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

La evolución que ha sufrido la seguridad vial (uso de casco, cinturón y asientos especiales para menores) desde 1999 ha sido favorable, tanto en ciudad como en carretera, en función de todas las variables estudiadas: grupos de edad, provincias, nivel de estudios y de ingresos, y clase social.




Gráfico 229. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 230. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 231. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 232. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 233. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 234. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 235. Porcentaje de personas que siempre utilizan el casco cuando viajan en motocicleta por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Uso del cinturón de seguridad




Gráfico 236. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 237. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 238. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 239. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 240. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 241. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 242. Porcentaje de personas que siempre utilizan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Uso de asientos especiales para menores




Gráfico 243. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 244. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 245. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 246. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 247. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 248. Porcentaje de personas que siempre utilizan asientos especiales para menores por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consejo médico para dejar de fumar

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el porcentaje de personas fumadores a las que su médico les ha aconsejado dejar de fumar es un 35,8%: en mujeres el 36,5% y en hombres el 35,3%. Conforme aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas cuyos médicos les aconsejaron dejar de fumar.

Las provincias donde a menos personas se les aconsejó que dejaran de fumar fueron Córdoba (29,3%) y Sevilla (29,9%); Almería tuvo el mayor porcentaje, el 56,7%. El porcentaje más elevado de personas cuyo médico les ha aconsejado dejar de fumar corresponde a los que tienen estudios primarios (41,3%) e ingresos inferiores a 999€ (43,7%). Con respecto a la clase social, el mayor porcentaje de personas cuyos médicos les aconsejaron dejar de fumar se dio en la clase clase III, con un 41,1%.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En los últimos años ha aumentado el porcentaje de personas a quienes sus médicos les han aconsejado que dejen de fumar. Hubo un decrecimiento desde 1999 hasta 2007 (el 19,4% de personas en 2007), pero en los último años se ha incrementado este porcentaje hasta alcanzar un 35,8%.

Según las edades, nivel de estudios, ingresos y clase social sucede la misma tendencia: el porcentaje ha aumentado en los últimos años. Destaca el gran aumento desde 2007 de algunas provincias, de más de un 24%, como en Almería, Córdoba y Granada.




Gráfico 249. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 250. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 251. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 252. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 253. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 254. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012

Muestra de Adultos



Bloque IV
Prácticas de
Medio ambiente

Índice

Listado de Gráficos	222
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: PROPIEDAD DE LA VIVIENDA	226
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	226
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	226
EXPOSICIÓN AMBIENTAL AL TABACO: PERSONAS FUMADORAS PASIVAS EN EL HOGAR	232
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	232
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007</i>	232
CONDICIONES DE TRABAJO	236
EXPOSICIONES (RESPIRANDO Y MANEJANDO) A VAPORES, HUMOS Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	236
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	236
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	236
CONDICIONES DE TRABAJO	241
EXPOSICIONES A POSICIONES FATIGANTES O DOLOROSAS	241
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	241
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	241
CONDICIONES DE TRABAJO	246
PERCEPCIÓN DE AFECTACIÓN NEGATIVA DEL TRABAJO EN LA SALUD	246
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	246
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	246
APOYO SOCIAL: APOYO CONFIDENCIAL Y APOYO AFECTIVO.....	250
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	250
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	251
APOYO CONFIDENCIAL	252

Listado de Gráficos

<i>Gráfico 255. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	228
<i>Gráfico 256. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por edad. Andalucía</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	228
<i>Gráfico 257. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	229
<i>Gráfico 258. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	229
<i>Gráfico 259. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de estudios. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	230
<i>Gráfico 260. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2003, 2007 y 2011.....	230
<i>Gráfico 261. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por clase social. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	231
<i>Gráfico 268. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.....</i>	233
<i>Gráfico 269. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.....</i>	233
<i>Gráfico 270. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por provincias. Andalucía.</i>	
Años 2007 y 2011.....	234
<i>Gráfico 271. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de estudios. Andalucía</i>	
Años 2007 y 2011.....	234
<i>Gráfico 272. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de ingresos. Andalucía.</i>	
Años 2007 y 2011.....	235
<i>Gráfico 273. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por clase social. Andalucía.</i>	
Años 2007 y 2011.....	235
<i>Gráfico 274. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por sexo. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	238
<i>Gráfico 275. Porcentaje de trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por edad. Andalucía.</i>	
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	238

Gráfico 276. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	239
Gráfico 277. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	239
Gráfico 278. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	240
Gráfico 279. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	240
Gráfico 280. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	243
Gráfico 281. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	243
Gráfico 282. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	244
Gráfico 283. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	244
Gráfico 284. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	245
Gráfico 285. <i>Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	245
Gráfico 286. <i>Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	247
Gráfico 287. <i>Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	247
Gráfico 288. <i>Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	248
Gráfico 289. <i>Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	248

Gráfico 290. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	249
Gráfico 291. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	249
Gráfico 292. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	252
Gráfico 293. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	252
Gráfico 294. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	253
Gráfico 295. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	253
Gráfico 296. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	254
Gráfico 297. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	254
Gráfico 298. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	255
Gráfico 299. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	255
Gráfico 300. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	256
Gráfico 301. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	256
Gráfico 302. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	257
Gráfico 303. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	257

Bloque IV
**Prácticas de
Medio Ambiente**



Características de la vivienda: Propiedad de la vivienda

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 86,3% de la población andaluza era propietario de una vivienda: el 85,9% hombres y el 86,6% mujeres. En alquiler estaban un 12,2% de la población andaluza (12,4% hombres y 12% mujeres). Por edad, los jóvenes de 16 a 24 años eran quienes tenían el porcentaje más bajo de viviendas en propiedad (79,6%), aumentando este porcentaje a medida que aumenta la edad, hasta el máximo en las personas de más de 75 años de edad (96,1%). Al contrario ocurre con las viviendas en alquiler, los jóvenes de 16 a 24 años fueron los que más utilizaron este tipo de vivienda (18,3%).

Según el área geográfica, la provincia de Almería fue donde se encontró el mayor porcentaje de personas que vivían en alquiler (17,9%), y en Córdoba donde se encuentra el mayor porcentaje de personas que vivían en propiedad (91,4%). Los que tenían estudios primarios registraron el mayor porcentaje de personas que vivían en propiedad (88,5%) con respecto a personas con estudios superiores (un 16,9% de personas con estudios universitarios vivían en alquiler).

Conforme se incrementaba el nivel de ingresos o la clase social, aumentaba el porcentaje de personas que tenían vivienda en propiedad y disminuía quienes vivían en alquiler.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, los porcentajes de vivienda en propiedad han descendido desde 1999 y han aumentando los correspondientes a viviendas en alquiler, para los hombres y mujeres. En relación a la edad, desciende el porcentaje personas que tenían una vivienda en propiedad hasta las edades comprendidas entre 16 y 54 años, aumentando este porcentaje a partir de 55 años de edad. Al contrario ocurría con la vivienda en alquiler: desde 1999 descendió el porcentaje de personas que tenían una vivienda de alquiler en edades a partir de 55 años, y aumentó este porcentaje desde 1999 para las personas menores de 54 años.

Según la situación demográfica, el porcentaje de personas que vivían en propiedad descendió en los últimos años, exceptuando en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, que han mantenido o aumentado sus valores. Con respecto a las viviendas en alquiler, aumentaron los porcentajes en los últimos años, exceptuando en Jaén y Sevilla, que mantuvieron sus valores.

Por nivel de estudios, observamos como los porcentajes de las personas que vivían en alquiler aumentaron desde 1999, independientemente del nivel de estudios que se tuviera. Al contrario ocurría con la vivienda en propiedad. Según el nivel de ingresos y clase social a la que pertenecían, observamos una clara tendencia desde los últimos años: el aumento en el porcentaje de personas que vivían en alquiler y el descenso de quienes vivían en propiedad, independientemente del nivel de ingresos y clase social.




Gráfico 255. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 256. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 257. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 258. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 259. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 260. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 261. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Exposición ambiental al tabaco: Personas fumadoras pasivas en el hogar

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 34,5% de la población andaluza fueron fumadores pasivos en el hogar: más las mujeres (37,1%) que los hombres (31,8%). Las personas jóvenes fueron quienes tuvieron el porcentaje más alto (52%), disminuyendo según aumentó la edad.

El mayor porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en el hogar se dio en la provincia de Almería (38,9%), y el menor en Granada (28,7%). Por nivel de estudios, observamos un menor porcentaje de fumadores pasivos entre las personas con estudios universitarios (27,5%), y mayor en aquellos con estudios secundarios (39,5%). Con respecto al nivel de ingresos, el porcentaje más alto de fumadores pasivos correspondió a las personas cuyos niveles de ingresos eran superiores (el 36,8% quienes tenían unos ingresos entre 1500€ y 2499€). Según la clase social, se encuentra los porcentajes más altos de personas fumadoras pasivas en hogares de clases sociales más desfavorecidas.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2007

La evolución de las persona fumadoras pasivas en el hogar desde 2007 ha sufrido un ascenso de sus porcentajes, pasando de 30,4% personas que afirmaron que algún miembro de su familia fumaba en el hogar en 2007 a 34,5% de personas en 2011.

Este aumento del porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en el hogar aumenta en los últimos años según el rango de edad, por provincias y nivel socio-económico. Podemos destacar que en Granada, al contrario que en el resto de provincias, desciende el porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar desde 2007. También observamos que las personas que ganaban más de 2500€ mantenían sus porcentajes.




Gráfico 268. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por sexo. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 269. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por edad. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 270. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por provincias. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 271. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 272. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2007 y 2011.




Gráfico 273. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por clase social. Andalucía. Años 2007 y 2011.

Condiciones de trabajo: Exposiciones (respirando y manejando) a vapores, humos y otras sustancias peligrosas

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 14,5% de la población trabajadora estuvo expuesta a vapores, humos y otro tipo de sustancias peligrosas, estando más expuestos los hombres (18,5%) que las mujeres (8,4%). Las personas de 55 a 64 años de edad (18,1%) fueron quienes estuvieron más expuestos a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo con respecto a las personas más jóvenes, siendo el 14,7% de las personas de 16 a 24 años quienes estuvieron expuestos a sustancias peligrosas en el trabajo.

Por área geográfica, Almería (22,2%) fue donde mayor proporción de personas se expuso a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo, siendo Cádiz (10,4%) y Málaga (10,7%) donde menos porcentaje de personas estuvieron expuestas a este tipo de sustancias en el entorno laboral.

Según el nivel socioeconómico, las personas con alto nivel de estudios (6,3% personas con estudios universitarios), ingresos (9,1% personas con ingresos superiores a 2500€) y clase social favorecida (6,5% clase social III y 9,3% clase social I y II), fueron quienes menos estuvieron expuestas a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo, aumentando el porcentaje según descendían estos niveles de estudios, ingresos y clase social.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En los últimos años, ha descendido la proporción de personas trabajadoras que están expuestas a sustancias peligrosas, ya sea respirando como manejando. Descendiendo con mayor proporción en los hombres que en las mujeres. Por edades, descienden estos porcentajes, exceptuando las personas de 55 a 64 años, que aumentaron su porcentaje desde 1999.

Por área geográfica, las únicas provincias donde aumentó el porcentaje de personas expuestas a sustancias peligrosas en el ámbito laboral en los últimos años fueron Almería y Granada, descendiendo en el resto de provincias dichos porcentajes.

En el ámbito socioeconómico, estos porcentajes descendieron paulatinamente según el nivel de estudios, ingresos y clase social, destacando un gran descenso de casi el 10% de las personas expuestas a sustancias peligrosas en su puesto de trabajo en el caso de rentas inferiores a 1000€.




Gráfico 274. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 275. Porcentaje de trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 276. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 277. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 278. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 279. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas, y a manejar sustancias o productos peligrosos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Condiciones de trabajo: Exposiciones a posiciones fatigantes o dolorosas

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 32,3% de la población andaluza de más de 16 años estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas/fatigantes en el trabajo, siendo los hombres (35,7%) quienes estuvieron más expuestos a estas posiciones que las mujeres (27,1%). Según la edad, las personas con edad comprendida entre 55 y 64 años (38,8%) fueron quienes más expuestas estuvieron a este tipo de posiciones.

Según el área geográfica, Granada (47,1%) fue donde se registró mayor exposición a posiciones fatigantes/dolorosas en el trabajo y Sevilla (26,5%) donde menor exposición a este tipo de posiciones se tuvo.

En general, la población con mayor porcentaje de exposición a posturas muy fatigantes/dolorosas en su trabajo fueron aquellas con estudios primarios (41,4%), nivel de ingresos entre 1000€ y 1499€ (35%) y pertenecientes a la clase social más desfavorecida (43,2%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, la evolución desde 1999 ha tenido diferentes etapas, con respecto a 1999 ha aumentado el porcentaje de personas trabajadoras expuestas a posiciones fatigantes/dolorosas, pero en los últimos años (2007 y 2011) este porcentaje ha ido disminuyendo paulatinamente.

Este descenso en los últimos años, se ha producido en todos los grupos de edad, nivel de estudios (exceptuando las personas universitarias que han aumentado su porcentaje a este tipo de exposiciones) y nivel de ingresos.

Por áreas geográficas, exceptuando Granada y Almería que han aumentado el número de personas expuestas a posturas fatigantes/dolorosas, en el resto de provincias han disminuido en los últimos años el porcentaje de personas expuestas a este tipo de posturas.

En relación a la clase social, destacamos el aumento de las personas expuestas a posiciones fatigantes/ dolorosas pertenecientes a la clase social más favorable.




Gráfico 280. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 281. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 282. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 283. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 284. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 285. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Condiciones de trabajo: Percepción de afectación negativa del trabajo en la salud

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 un 23,4% de la población andaluza trabajadora indicó que su trabajo le afectaba negativamente en la salud: el 23,9% de los hombres y el 22,7% de las mujeres. Según la edad, las personas de grupos de edades más avanzadas percibieron una influencia negativa sobre la salud más frecuentemente que los más jóvenes (31% personas de 55 a 64 años y 12,3% personas de 16 a 24 años).

Sevilla (12,5%) y Córdoba (19,3%) fueron las provincias donde menos trabajadores creyeron que el trabajo afectaba negativamente en su salud. Por el contrario, en Jaén (36,3%) y Almería (33,3%) fue donde con más frecuencia pensaban que su trabajo influía negativamente en su salud. En relación al aspecto socio-económico, fue más frecuente tener la percepción negativa del trabajo en la salud del trabajador en las personas con estudios primarios (29,1%), nivel de ingresos no elevados (23,4% personas con ingresos de 1000€ a 1499€), y clase social más desfavorecida (26,5%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, la percepción negativa del trabajo en la salud ha ido disminuyendo con el paso de los años, tanto para hombres como para mujeres. Según la edad, en el grupo de edad entre 55 y 65 años hubo un aumento de la creencia de la influencia negativa del trabajo en la salud con respecto a los últimos años, un estancamiento en las edades intermedias, y un descenso de casi un 9% para el grupo de edad de 16 a 24. Por provincias, Granada y Jaén son las únicas provincias que tuvieron un aumento en la proporción de personas trabajadoras que tenían un pensamiento negativo en la influencia del trabajo en la salud en los últimos años. Con respecto al área socio-económico, el descenso paulatino en los últimos años de la creencia o percepción de la influencia negativa del trabajo en la salud se dio en los diferentes niveles de estudios, ingresos y clases sociales.




Gráfico 286. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 287. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 288. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 289. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 290. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 291. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Apoyo social: Apoyo confidencial y apoyo afectivo

El apoyo social de la población andaluza se recogió a través de la escala de apoyo social de DUKE, que por un lado mide la posibilidad de contar con personas para comunicarse (apoyo emocional) y, por otro lado, las demostraciones de amor, cariño y empatía que recibe una persona (apoyo afectivo).

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el 2011 la población andaluza tuvo mayor carencia de apoyo afectivo que confidencial: el 2,6% de la población andaluza mayores de 16 años percibió un escaso apoyo confidencial, y el 5,6% tuvo falta de apoyo afectivo: mayor carencia en las mujeres (2,8% escaso apoyo confidencial y 6,5% escaso apoyo afectivo) que entre los hombres (2,3% escaso apoyo confidencial y 4,6% escaso apoyo afectivo).

A medida que aumentaba la edad la proporción de personas con falta de apoyo confidencial y afectivo fue mayor: en el caso del apoyo confidencial, el 1% de la población entre 16 y 24 años percibe una escasez en el ámbito confidencial, pasando al 5,7% de la población de más de 75 años. En el caso del recurso afectivo, el 2% de las personas entre 16 y 24 años y un 8,9% las personas mayores de 75 años apreciaron una carencia en el entorno afectivo.

Según las zonas geográficas, Almería fue la provincia donde las personas percibieron mayor carencia en el ámbito confidencial (4,8%) y afectivo (13,6%). Málaga, donde menor carencia confidencial (1,5%) se detectó, y Sevilla donde menor carencia afectiva (3,3%).

A medida que descendió el nivel de estudios e ingresos, mayor fue la carencia de apoyo confidencial y afectivo percibido por la población andaluza. El 3,3% de personas con estudios primarios y el 4,9% de personas con ingresos inferiores a 999€ tuvieron falta de apoyo confidencial, frente al 0,8% de personas universitarias y el 0,8% de personas con ingresos superiores a 2500€. En el ámbito afectivo, el 7,2% de la población con estudios primarios y el 9,4% de la población con ingresos inferiores a 999€ tuvieron carencia en este aspecto, respecto al 2,4% de personas universitarias y el 3,4% de personas con ingresos superiores a 2500€.

En el ámbito confidencial, no se apreciaron diferencias respecto a la proporción de personas que sufrieron falta de apoyo, según la clase social a la que pertenecían. Sin embargo, aparecieron cambios en el aspecto afectivo: a medida que aumentó la clase social disminuyó la carencia de afecto.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, el índice de apoyo social mejoró en la población andaluza. Esta mejoría fue mayor en el ámbito afectivo que en el confidencial y se produjo para hombres y mujeres, todos los grupos de edad, provincias, nivel de estudios, de renta y clases sociales diferentes.

Apoyo confidencial




Gráfico 292. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 293. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 294. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 295. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 296. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 297. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Recursos afectivos




Gráfico 298. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 299. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 300. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 301. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 302. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 303. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Encuesta Andaluza de Salud 2011-2012

Muestra de Adultos



Bloque V
Servicios Sanitarios

Índice

Listado de Gráficos	261
CONSULTAS MÉDICAS	267
FRECUENCIA, LUGAR DE CONSULTA, MOTIVOS DE CONSULTA Y PROFESIONAL DE LA MEDICINA VISITADO/A.....	267
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	267
<i>Evolución desde la Escuela Andaluza de Salud de 1999</i>	267
MOTIVOS DE CONSULTA	276
PROFESIONAL DE MEDICINA VISITADO/A.....	281
INGRESOS HOSPITALARIOS.....	284
FRECUENCIA Y NÚMERO MEDIO DE HOSPITALIZACIONES	284
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	284
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	284
FRECUENCIA	286
NÚMERO MEDIO DE HOSPITALIZACIONES	289
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS: FRECUENCIA.....	292
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	292
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	292
FRECUENCIA	293
TIPO DE SERVICIO USADO	296
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS: TIPO DE DENTISTA VISITADA/O	299
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	299
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	300
CONSUMO DE MEDICAMENTOS.....	305
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	305
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	305
COBERTURA SANITARIA.....	309
<i>Encuesta Andaluza de Salud de 2011</i>	309
<i>Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999</i>	309
AGRUPACIONES DE LOS NIVELES INICIALES DE LAS VARIABLES.....	342

Listado de Gráficos

<i>Gráfico 304. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	268
<i>Gráfico 305. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	268
<i>Gráfico 306. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	269
<i>Gráfico 307. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	269
<i>Gráfico 308. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	270
<i>Gráfico 309. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	270
<i>Gráfico 310. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	271
<i>Gráfico 311. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	272
<i>Gráfico 312. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	272
<i>Gráfico 313. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	273
<i>Gráfico 314. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	273
<i>Gráfico 315. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	274

<i>Gráfico 316. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	274
<i>Gráfico 317. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	275
<i>Gráfico 318. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	275
<i>Gráfico 319. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	276
<i>Gráfico 320. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	277
<i>Gráfico 321. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	278
<i>Gráfico 322. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	278
<i>Gráfico 323. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	279
<i>Gráfico 324. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	279
<i>Gráfico 325. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	280
<i>Gráfico 326. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	280
<i>Gráfico 327. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	281
<i>Gráfico 328. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.</i>	281
<i>Gráfico 329. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	282

Gráfico 330. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	283
Gráfico 331. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	283
Gráfico 332. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	284
Gráfico 333. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	284
Gráfico 334. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	285
Gráfico 335. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	285
Gráfico 336. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	288
Gráfico 337. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	288
Gráfico 338. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	289
Gráfico 339. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	289
Gráfico 340. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	290
Gráfico 341. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	290
Gráfico 342. Número medio de hospitalizaciones en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	291
Gráfico 343. Número medio de hospitalizaciones en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	291
Gráfico 344. Número medio de hospitalizaciones en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	292
Gráfico 345. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	292

Gráfico 346. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	293
Gráfico 347. Número medio de hospitalizaciones en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	293
Gráfico 348. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	295
Gráfico 349. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	295
Gráfico 350. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	296
Gráfico 351. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	296
Gráfico 352. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....	297
Gráfico 353. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	297
Gráfico 354. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	298
Gráfico 355. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	298
Gráfico 356. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	299
Gráfico 357. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	299
Gráfico 358. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.	300
Gráfico 359. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	300
Gráfico 360. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.	303
Gráfico 361. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....	303

<i>Gráfico 362. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.</i>	<i>304</i>
<i>Gráfico 363. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>304</i>
<i>Gráfico 364. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>305</i>
<i>Gráfico 365. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>305</i>
<i>Gráfico 366. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>306</i>
<i>Gráfico 367. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011....</i>	<i>306</i>
<i>Gráfico 368. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>308</i>
<i>Gráfico 369. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>308</i>
<i>Gráfico 370. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>309</i>
<i>Gráfico 371. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>309</i>
<i>Gráfico 372. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>310</i>
<i>Gráfico 373. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>310</i>
<i>Gráfico 374. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>313</i>
<i>Gráfico 375. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>313</i>
<i>Gráfico 376. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>314</i>
<i>Gráfico 377. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.....</i>	<i>314</i>

Gráfico 378. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de ingresos.

Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.315

Gráfico 379. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por clase social. Andalucía.

Años 1999, 2003, 2007 y 2011.315

Bloque IV
**Prácticas de
Medio Ambiente**



Consultas médicas: Frecuencia, lugar de consulta, motivos de consulta y profesional de la medicina visitado/a

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, el 27,6% de la población (22,4% hombres y 32,7% mujeres), había consultado al médico en las dos semanas anteriores a la encuesta. Lo habían hecho en un centro de salud o consultorio (más del 70% de la población) independientemente de la edad, el sexo, nivel socioeconómico y la provincia donde residía. El principal motivo de dicha visita fue el diagnóstico y el tratamiento (más del 50% de la población fue a una consulta médica por este motivo). El profesional más visitado fue el de medicina general (más del 80% de la población andaluza decidió acudir a este especialista). A medida que la edad aumenta, también lo hacen las consultas al médico. Las provincias donde más se consultó al médico fueron Jaén (34,4%) y Córdoba (34,3%), y donde menos, Sevilla (23,6%). La tendencia es aumentar las consultas médicas cuanto menor es el nivel de estudios, ingresos y clase social.

Evolución desde la Escuela Andaluza de Salud de 1999

En la población Andaluza, la demanda de consultas médicas respecto al año 2007 ha aumentado (25,8% en 2007 y 27,6% en 2011). Aumentan tanto en hombres como en mujeres. El grupo de mayores de 55 años disminuyó el porcentaje de consultas y en menores de 55 años aumentó, respecto al año 2007. Por provincias, el aumento de consultas fue mayor en Córdoba y Jaén (10% mayor); en Málaga y Sevilla se reduce. Según el motivo, para diagnóstico y tratamiento disminuye en Córdoba en el grupo de 75 y más años. Las revisiones o chequeos disminuyen en los menores de 25 años de Cádiz y Huelva. Los hombres y mujeres, de 25 a 74 años, con ingresos inferiores a 2500€ al mes, fueron menos a por recetas, excepto los residentes de Cádiz. La demanda fue menor en personas con estudios universitarios. En las clases sociales más altas, con ingresos superiores a 1500€, el porcentaje aumentó, y se redujo en las clases sociales media y baja, y en las personas con ingresos menores de 999€.




Gráfico 304. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 305. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consulta al médico en las últimas dos semanas




Gráfico 306. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consulta al médico en las últimas dos semanas




Gráfico 307. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 308. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 309. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Lugar de consulta




Gráfico 310. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 311. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 312. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 313. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 314. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 315. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 316. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 317. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 318. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 319. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Motivos de consulta




Gráfico 320. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 321. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 322. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 323. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 324. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue diagnóstico y tratamiento por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 325. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue una revisión por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 326. Porcentaje si el motivo de la última consulta fue la expedición de recetas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 327. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 328. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 329. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Profesional de medicina visitado/a




Gráfico 330. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 331. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 332. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 333. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 334. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 335. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Ingresos hospitalarios: Frecuencia y número medio de hospitalizaciones

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

Durante el año 2011, el 7,8% de la población residente en Andalucía (6% hombres y 9,5% mujeres), estuvieron ingresados al menos una noche en el último año. El número medio de hospitalizaciones fue de 1,4 veces (1,5 veces en hombres y 1,3 veces en mujeres).

Respecto a la edad, a medida que esta aumentó, se incrementó el porcentaje de personas que al menos tuvo una hospitalización en el último año: el porcentaje más alto se dio en los mayores de 75 años, un 12,4% (1,8 veces fue la media de hospitalizaciones en los mayores de 75 años). El 10,8% de la población de Almería estuvo al menos una noche ingresado en el servicio de urgencias, con una media de hospitalizaciones de 1,9 veces, y en Sevilla el 6% de la población fue hospitalizado al menos una noche, con una media de hospitalizaciones de 1,3 veces. Huelva fue la provincia donde la media de hospitalizaciones fue menor (1,1 veces).

Conforme menor fue el nivel socioeconómico, mayor fue la proporción de personas ingresadas en el servicio de urgencias al menos una noche: el 8,8% personas con estudios primarios, el 9,3% con ingresos inferiores a 1000€, y el 8,2% en la clase social inferior.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En el año 2011 creció el porcentaje de al menos una hospitalización, respecto al año 2007 (5,8% en 2007 y 7,8% en 2011). El número medio de hospitalizaciones no varió respecto años anteriores, sin distinción de sexo o nivel socioeconómico. El grupo de edad de 75 y más años experimentó el mayor crecimiento, y el grupo de 65 a 74 años donde menos aumentó el porcentaje de al menos una hospitalización.

La media de hospitalizaciones disminuyó en todos los grupos de edad, excepto en personas de 25 a 44 años, donde aumentó y de 55 a 64 años se mantiene constante. Por provincias, Almería tuvo el mayor aumento en el porcentaje de al menos una hospitalización. La media de hospitalización aumentó en Almería. Donde más disminuyó fue en Huelva y Sevilla.

Frecuencia




Gráfico 336. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 337. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 338. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 339. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 340. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 341. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicios de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Número medio de hospitalizaciones




Gráfico 342. Número medio de hospitalizaciones en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 343. Número medio de hospitalizaciones en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 344. Número medio de hospitalizaciones en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 345. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 346. Número medio de hospitalizaciones en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 347. Número medio de hospitalizaciones en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Utilización de servicios de urgencias: Frecuencia

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

Durante el año 2011 el 24,2% de la población andaluza (20,7% hombres y 27,6% mujeres) acudió alguna vez a algún servicio de urgencias en el año previo a la entrevista. Estos servicios pertenecían a la Seguridad Social en un 97,1%. No hubo diferencias entre hombres y mujeres.

Las personas que más demandaron el servicio de urgencias fueron las de más edad (34,6% en el grupo de 75 y más años). Dicho servicio fue de carácter público en un 99,5%. Las personas con menor edad utilizaron menos el servicio público. En Almería (36,6%) y en Cádiz (32,4%) se utilizó en mayor proporción el servicio de urgencias; en Sevilla, donde menos. Según el nivel socioeconómico, se dio la tendencia a aumentar el uso del servicio de urgencias, si el nivel de estudios, ingresos y clase social eran más bajos: el 26,4% personas con nivel de estudios primarios, 27,5% con rentas inferiores a 999€, y el 25,8% de la clase social inferior.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 hasta 2007 el porcentaje de personas que han utilizado algún servicio de urgencias fue muy parecido. Sin embargo, de 2007 a 2011 aumentó (20,7% en 2007 y 24,2% en 2011). Éste aumento se dio en hombres y mujeres.

Las personas de 65 a 75 años utilizaron menos el servicio de urgencias durante el 2011, respecto a años anteriores. En las edades de 16 a 44 años y de más de 75 años aumentó el uso de éste servicio. En todas las provincias ha aumentado el uso del servicio de urgencias: en Almería se ha duplicado (18% en 2007 y 36,6% en 2011), y en Sevilla se ha reducido (16,2% en 2007 y 10,5% en 2011). En las clases sociales más bajas y con menor nivel de estudios fue más notable el crecimiento del uso de los servicios de urgencias. Este fue mayor en personas que ganaban más de 2500€ mensuales.

Frecuencia




Gráfico 348. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 349. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 350. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 351. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 352. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 353. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Tipo de servicio usado




Gráfico 354. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 355. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 356. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 357. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 358. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 359. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quienes usaron algún servicio de urgencias) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consultas odontológicas: Tipo de dentista visitada/o

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011, un 85% de la población andaluza que acudió al dentista lo hizo en una consulta privada, siendo más frecuente en mujeres (86,5%) que en hombre (83,5%). Los hombres tuvieron mayor preferencia por la seguridad social (13,4%) y las sociedades médicas (3,1%) que las mujeres: un 11,1% de mujeres acudieron a la seguridad social y un 2,4% asistió a las sociedades médicas.

Según las edades, los mayores de 75 años fueron quienes más visitaron al dentista de la seguridad social, reduciéndose la asistencia según disminuye la edad. Las sociedades médicas fueron más visitadas por los grupos de edades intermedias: un 3,7% de personas de 45 a 54 años y un 3,5% de 55 a 64 años.

Según el área geográfica, más del 80% de la población de cada provincia acudió al dentista privado, entre un 1% y 4,6% prefirieron asistir al dentista de las sociedades médicas, y entre un 9% y un 15,2% de personas acudieron al dentista de la seguridad social, sin diferencias entre cada una de las provincias. El 90,9% y el 5% de la población andaluza con estudios universitarios asistió al dentista privado y sociedades médicas, respectivamente, siendo menor la asistencia a medida que disminuye el nivel de estudios. Sin embargo, las personas con estudios primarios (16,4%) prefirieron ir a la seguridad social, disminuyendo el porcentaje de asistencia a medida que aumenta el nivel de estudios.

La seguridad social recibió una asistencia mayoritaria por parte de las personas con ingresos inferiores a 999€ (20,3%), disminuyendo la asistencia según aumenta el nivel de renta. En las sociedades médicas, las personas con renta superior a 2500€ fueron quienes más asistieron a este tipo de dentista, disminuyendo paulatinamente el porcentaje de asistencia según disminuye el nivel de ingresos. La clase social más desfavorecida (16,4%) acudió en mayor proporción a la seguridad social que el resto de personas de clases sociales superiores.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En líneas generales, la proporción de personas que acuden al dentista de la seguridad social y de las sociedades médicas aumenta desde el 2007. Sin embargo, la asistencia al dentista privado sufrió una disminución, tanto por parte de los hombres como de las mujeres. Este aumento se dio en los diferentes rangos de edad, provincias, nivel de estudios, ingresos y clases sociales. En líneas generales, la disminución en las asistencias al dentista privado y sociedades médicas, tendió a ser menor a medida que aumenta el nivel de estudios, ingresos y clase sociales.




Gráfico 360. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 361. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 362. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 363. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 364. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 365. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 366. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 367. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Consumo de medicamentos

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En 2011 más de la mitad de la población andaluza, el 60%, consumió algún tipo de medicamento durante las dos semanas previas a la realización de la entrevista: el 70,1% de las mujeres frente al 49,5% de hombres.

Con respecto a la edad, se produjo un aumento progresivo de consumo de medicamentos: de un 36,9% en el grupo de edad de 16 a 24 años aumentó al 95,6% en los de más de 75 años.

La provincia en que más medicamentos se consumieron fue Jaén (68,2%) y Huelva (67,4%). Sevilla, donde menos (49,9%). A menor nivel de estudios (69,5% de personas con estudios primarios), menor nivel de ingresos (70% de personas con menos de 1000€ mensuales) y clase social inferior (60,7%), mayores porcentajes consumieron medicamentos.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un aumento generalizado en el consumo de medicamentos en la población andaluza, aumento mucho más acusado desde 2007 a 2011 (del 50,2% en 2007 pasó al 60% en 2011). Este aumento se observa en todas las variables estudiadas: sexo, grupo de edad, nivel de estudios, provincias, nivel de ingresos y clase social.




Gráfico 368. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 369. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 370. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 371. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 372. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 373. Porcentaje de personas consumidoras de medicamentos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Cobertura sanitaria

Encuesta Andaluza de Salud de 2011

En el año 2011 el 4,5% de las personas entrevistadas residentes en Andalucía tenían doble cobertura sanitaria: no había diferencias entre hombres y mujeres (4,6% de hombres y 4,4% de mujeres).

El mayor porcentaje de personas con doble cobertura sanitaria es de 25 a 44 años (6,3%). Desde este valor, el porcentaje disminuye progresivamente hasta llegar al 1,4% de personas de 75 años y más. En cuanto a la zona geográfica, Almería (8,6%) y Huelva (8,1%) fueron las provincias donde mayor porcentaje de hombres y mujeres tenían doble cobertura sanitaria, frente a Córdoba, que registró el más bajo (2,5%) y Jaén (2,6%). Existe la tendencia de mayor porcentaje de hombres y mujeres con doble cobertura sanitaria en los de mayor nivel de estudios (2,7% para estudios primarios frente a 10,8% para estudios universitarios), de ingresos (1,4% para ingresos mensuales inferiores de 1000€ frente al 14,6% de personas con 2500€ mensuales o más) y pertenecientes a clases sociales superiores (10,8% de personas de clases sociales superior frente al 3% de la clase inferior).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 han descendido los porcentajes de personas residentes en Andalucía que tuvieran doble cobertura sanitaria: el descenso más acusado fue del año 2007 al 2011. Además, entre los hombres se observa un 1% más que las mujeres. En todas las franjas de edad se refleja la disminución en los porcentajes, aunque cabe destacar el descenso producido en el rango de 55 a 64 años (de 7,6% en 2007 pasó a 3,3% en 2011).

En cuanto a la provincia de residencia, se produjo disminución de los porcentajes en todas las provincias excepto en Almería (aumentó alrededor de un 3% desde 2007). Destacan los descensos en los porcentajes desde 2007 en las provincias de Huelva (de un 15,3% en 2007 pasó a un 8,1% en 2011) y Sevilla (de un 11,1% en 2007 pasó a un 4,8% en 2011).

En todos los niveles de estudios se observó el descenso mencionado, y lo mismo ocurre con el nivel de ingresos mensuales. En el caso de 2500€ mensuales y más pasaron de un 23,8% en 2007 a un 14,6% en 2011. También descendieron los porcentajes en todas las clases sociales.




Gráfico 374. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 375. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por edad. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 376. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 377. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 378. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003, 2007 y 2011.




Gráfico 379. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Bibliografía



Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 2013. Cuarta Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 2007. Tercera Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 2003. Segunda Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz J.J., Daponte A, García M^a del Mar. 1999. Primera Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Conserjería de Salud. Junta de Andalucía.

Anexo A
Cuestionario 2011





Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD

AÑO 2.011 D-3679

CUESTIONARIO NÚMERO

--	--	--	--

ADULTOS

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

Buenos días/tardes, soy ..., entrevistador/a para la empresa DEMOMETRICA. En estos momentos estamos realizando la IV Encuesta Andaluza de Salud por encargo de la Junta de Andalucía a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La encuesta va dirigida a conocer el estado de salud de la población andaluza y su utilización de servicios sanitarios. La **carta de presentación** que le muestro contiene una breve información introductoria de los objetivos de la encuesta, junto a la solicitud de su colaboración en la misma respondiendo a un sencillo cuestionario.

Entregar carta de presentación

La selección de los hogares a los que se solicita la colaboración voluntaria en el estudio es estrictamente aleatoria, por lo que su colaboración resulta especialmente valiosa. Toda la información que Vd. nos facilite está sujeta a las especificaciones de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus modificaciones posteriores. Los datos que le solicitamos se tratarán informáticamente para realizar análisis estadísticos de una forma totalmente ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales.

GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN

COMPOSICIÓN DEL HOGAR:

- HOGAR:** Persona o conjunto de personas que conviven/ocupan en común la vivienda seleccionada, o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.
- MIEMBROS DEL HOGAR:** Se consideran miembros del hogar todas las personas que, sin ocupar otra vivienda principal, dependen económicamente del hogar seleccionado.
- CABEZA DE FAMILIA:** Se considera cabeza de familia, el miembro del hogar que aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar.

<i>(Continuación)</i>										
MIEMBROS DEL HOGAR:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P. 2b. ¿Requiere algún tipo de dedicación o de cuidados especiales? (Entrevistador/a: esta pregunta debe realizarse para todas las personas con algún código 1 a 5 en P.2a, y para todos los miembros menores de 16 años o mayores de 64 años, aunque no cumplan ninguna de las condiciones de P.2a)										
▪ Sí	<input type="checkbox"/> 1									
▪ No	<input type="checkbox"/> 2									
▪ No lo sabe, no está seguro	<input type="checkbox"/> 8									
▪ No contesta	<input type="checkbox"/> 9									
SÓLO PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR CON CÓDIGO 1 EN P.2b y PARA TODOS LOS MIEMBROS MENORES DE 16 AÑOS ó MAYORES DE 64 AÑOS										
P. 2c. Y, ¿quién se encarga <u>HABITUALMENTE</u> de su cuidado? (nos referimos a la persona que se ocupa con más frecuencia y/o dedica más tiempo a cuidar a la persona referenciada), (marcar una sola opción de respuesta por cada miembro del hogar que requiere cuidados)										
▪ Habitualmente se cuida él/ella mismo/a	<input type="checkbox"/> 1									
Habitualmente lo/a cuida yo (la persona entrevistada):										
▪ Yo solo/sola	<input type="checkbox"/> 2.1									
▪ Mi pareja y yo	<input type="checkbox"/> 2.2									
▪ Yo, junto a otra persona que no es mi pareja	<input type="checkbox"/> 2.3									
▪ Otra opción	<input type="checkbox"/> 2.4									
▪ Habitualmente lo cuida otra persona que no reside en el hogar	<input type="checkbox"/> 3									
▪ Habitualmente lo cuida otra persona del hogar	<input type="checkbox"/> 4									
En caso de que el cuidador sea otra persona del hogar anotar el número de miembro que le corresponde en el cuadro										

HACER P.2d y P.2e SÓLO SI LA PERSONA ENTREVISTADA CUIDA A ALGUIEN DEL HOGAR (ES DECIR, QUE SE HAYA MARCADO ALGUNA "X" EN P2C EN LA OPCIÓN "HABITUALMENTE LO CUIDO YO (LA PERSONA ENTREVISTADA)". RESTO, PASAR DIRECTAMENTE A P2f.

P.2d. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a cuidar a las personas de esta casa que lo necesitan? (nos referimos a tareas como prestar ayuda para el aseo, la alimentación, vestirse, dar medicinas, etc.)

- De lunes a viernes (por día) • NS/NC 99
- Fines de semana (por día) • NS/NC 99

P.2e. ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en el cuidado de esta/s persona/as? (admite respuesta múltiple)

- Sí, una persona contratada para ello 1
- Sí, profesionales de los servicios sociales o sanitarios 2
- Sí, otras personas (familiares, Amigos/as, vecinos/as, otros) ... 3
- No, no viene ninguna persona ... 4
- No contesta 9

A TODOS/AS

P.2f. ¿Se encarga habitualmente del cuidado de alguna persona fuera del hogar (en otro domicilio) sin percibir ningún tipo de remuneración por ello?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

→ **P.2g.** ¿Cuántas horas diarias dedica usted a cuidar de esas personas fuera del hogar?

- De lunes a viernes (por día) • NS/NC 99
- Fines de semana (por día) • NS/NC 99

A TODOS/AS

P.3a. En su casa, ¿quién se ocupa principalmente de las tareas domésticas tales como fregar, planchar, cocinar, etc.? (una sola respuesta)

- Yo solo/a 1
- Mi pareja 2
- Mi pareja y yo 3
- Yo, junto a otra persona que no es mi pareja 4
- Otra persona de la casa que no es mi pareja 5
- Una persona contratada (que cobra por ello) 6
- Otra situación 7
- No sabe / No contesta 9

→ **N° de persona del hogar:**

P.3b. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a las tareas de la casa tales como fregar, planchar, cocinar, etc., de lunes a viernes?, ¿Y durante los fines de semana?

- De lunes a viernes (por día) • NS/NC 99
- Fines de semana (por día) • NS/NC 99

P.3c. ¿Tiene alguna persona de fuera de la casa que ayude a realizar las tareas domésticas?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.4a. ¿La vivienda que usted ocupa es de propiedad o de alquiler?

- De propiedad 1
- De alquiler 2
- Otra situación, especificar 3
- NS/NC 9

P.4b. ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda? (no contar la cocina, los baños/lavabos o el comedor/sala de estar)

- Habitaciones
- NS/NC 99

P.4c. ¿Cuáles son las instalaciones con las que cuenta su vivienda?

	Sí	No
• Agua corriente	1	2
• Agua caliente.....	1	2
• Ascensor	1	2
• Refrigeración (aire acondicionado, aparatos móviles, NO ventiladores)	1	2

P.4d. ¿De qué tipo de calefacción dispone su vivienda?

- Calefacción colectiva 1
- Calefacción individual (se excluyen aparatos que permiten calentar alguna habitación, como radiadores eléctricos)..... 2
- No tiene instalación de calefacción pero sí algún aparato que permite calentar alguna habitación (ej: radiadores eléctricos). 3
- No tiene calefacción 4

P.4e. ¿Tiene Vd. falta de espacio en su vivienda?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.4f. ¿Posee/tiene Vd. otra vivienda que se pueda utilizar como residencia aunque no la utilice habitualmente?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.5a. La siguiente pregunta se refiere a aspectos del medio ambiente del barrio o zona donde usted reside. Referido al último año, considera usted que

	Mucho	Algo	Nada	NS/NC
• El ruido procedente del exterior de su vivienda le resulta molesto	1	2	3	9
• Su vivienda sufre de malos olores procedentes del exterior	1	2	3	9
• En el barrio donde usted vive la contaminación del aire es elevada	1	2	3	9
• Su barrio se encuentra afectado por alguna industria contaminante	1	2	3	9
• En el barrio donde usted vive hay espacios verdes suficientes	1	2	3	9
• En el barrio donde usted vive hay delincuencia/inseguridad	1	2	3	9
• En el barrio donde usted vive hay tráfico intenso de vehículos de motor....	1	2	3	9

P.5b. En general, la calidad del medio ambiente de su barrio es ...

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3
- Mala 4
- Muy mala 5
- NS/NC 9

P.6. ¿Tienen ustedes coche? (para uso personal, no profesional exclusivamente)

- Uno 1
- Dos 2
- Más de dos 3
- Ningún coche 4
- NS/NC 9

Las preguntas que siguen se refieren a lo que Vd. piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto

P.7. En general, usted diría que su salud es ... (una sola respuesta)

- Excelente 1
- Muy buena 2
- Buena 3
- Regular 4
- Mala 5
- No sabe/no está seguro 8
- Se negó 9

P.8. Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades o cosas que usted podría hacer un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas?. En caso afirmativo, ¿cuánto?

	Sí, me limita MUCHO	Sí, me limita UN POCO	No, no me limita NADA
▪ Esfuerzos moderados como mover una mesa, pasa la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora	1	2	3
▪ Subir varios pisos por la escalera	1	2	3

P.9. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física?

	Sí	No
▪ ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?	1	2
▪ ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas? ..	1	2

P.10. Durante las últimas 4 semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

	Sí	No
▪ ¿Hizo menos de lo que hubiera querido por algún problema emocional?	1	2
▪ ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre por algún problema emocional?	1	2

P.11. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

- Nada 1
- Un poco 2
- Regular 3
- Bastante 4
- Mucho 5

P.12. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ...

	Siempre	Casi Siempre	Muchas Veces	Algunas Veces	Sólo alguna vez	Nunca
▪ Se sintió calmado y tranquilo?	1	2	3	4	5	6
▪ Tuvo mucha energía?	1	2	3	4	5	6
▪ Se sintió desanimado y triste?	1	2	3	4	5	6

P.13. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?

- Siempre 1
- Casi siempre 2
- Algunas veces 3
- Sólo alguna vez 4
- Nunca 5

P.14. En la tarjeta que voy a enseñarle aparecen una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho un/a profesional de la salud (médico/a, enfermero/a) que usted padece actualmente alguna de ellas? (Entrevistador/a: Mostrar TARJETA A). Si responde "Si" hacer P.14a y P.14b:
P.14a. ¿Recibe medicación u otro tipo de terapia por ello?
P.14b. ¿Esa condición le limita alguna de sus actividades?

ENFERMEDAD CRÓNICA	P.14			P.14a		P.14b	
	¿Le ha dicho un/a profesional de la salud si tiene esta condición? (si es 'No', saltar a la siguiente)			¿Recibe medicación u otro tipo de terapia por ello?		¿Esa condición le limita alguna de sus actividades?	
	Si	No	No lo sabe	Si	No	Si	No
• Cáncer (tumor maligno, incluido leucemia, linfoma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Diabetes/azúcar alta en sangre/azúcar en orina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hipertensión/presión arterial alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Colesterol alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Colitis y enfermedades crónicas intestinales/ Enf. inflamatoria intestinal/ Enfermedad de Crohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Úlcera de estómago/duodeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Estreñimiento crónico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Enfermedad crónica del pulmón / enfisema / bronquitis crónica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Asma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Trastornos cardíacos/insuficiencia cardíaca /insuficiencia cardíaca congestiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Infarto de miocardio/ataque al corazón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Angina/dolor de pecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dolor de espalda, cuello, hombro, cintura (cervical/lumbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fibromialgia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Problemas crónicos de la piel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Alergias crónicas (como rinitis, inflamación de ojos, dermatitis, alergia a los alimentos, etc), asma alérgica excluida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Anemia u otra enfermedad de la sangre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Mala circulación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Varices en las piernas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hemorroides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Migrañas/Jaquecas/ Cefaleas crónicas / dolor de cabeza frecuente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Accidente cerebrovascular/hemorragia cerebral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Depresión o ansiedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Otros problemas mentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Hipoacusia / problemas de audición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Cataratas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Artritis o reumatismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Osteoporosis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Cirrosis/enfermedad del hígado / disfunción hepática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Enfermedad del riñón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Incontinencia urinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Esterilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• (SÓLO HOMBRES) Trastornos de próstata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• (SÓLO MUJERES) Dolor menstrual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tiene alguna otra condición crónica que no haya sido mencionada antes? Si es así, por favor especifíquelas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P.15. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido usted algún accidente que le haya causado heridas o lesiones suficientes para limitar su actividad normal y/o para necesitar asistencia sanitaria?

- Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?
- No 2 ⇒ Pasar a P.16

P.15a. ¿Y en los últimos tres meses?

- Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?
- No 2

P.15b. Refiriéndonos en concreto al **ÚLTIMO ACCIDENTE**, ¿dónde tuvo **LUGAR**?

- En su casa 1
- En su centro de formación 2
- En su centro de trabajo 3
- En un lugar de recreo, deporte 4
- En una vía pública, calle, edificio público, edificio comercial, etc. Que no sea accidente de tráfico 5
- En la vía pública: accidente de tráfico como conductor 6
- En la vía pública: accidente de tráfico como pasajero 7
- En la vía pública: accidente de tráfico como peatón 8
- En otro lugar, especificar 9

P.15c. ¿Cuál es la **PRINCIPAL LESIÓN O DAÑO** que le produjo este accidente?

- Envenenamiento o Intoxicación (no alimentarias) 1
- Quemaduras 2
- Fracturas 3
- Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones 4
- Heridas profundas 5
- Otros daños 6
- N/C 9

P.15d. Como consecuencia de este último accidente, ¿**TUVO QUE** ... ?

- Ser ingresado en un hospital o clínica 1
- Acudir a un servicio de urgencias de un hospital o clínica 2
- Consultar a un médico o enfermera (fuera de un hospital o clínica) 3
- No fue necesaria ninguna atención sanitaria 4
- N/C 9

A TODOS/AS

P.16. Y en las **últimas 2 semanas**, ¿ha utilizado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.17
- N/C 9 ⇒ Pasar P.17

P.16a. ¿Qué tipo de medicamento? (entrevistador/a: Mostrar TARJETA B y anotar todos los que cite)

P.16b. Para los medicamentos consumidos, ¿fueron recetados por el médico?

	P.16a		P.16b	
	CONSUMIDO		RECETADO	
	Sí	No	Sí	No
• Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios.....	1	2	1	2
• Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre	1	2	1	2
• Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	1	2	1	2
• Antibióticos	1	2	1	2
• Tranquilizantes, sedantes	1	2	1	2
• Pastillas para dormir	1	2	1	2
• Medicamentos antidepresivos	1	2	1	2
• Medicamentos para la alergia	1	2	1	2
• Medicinas para el reuma	1	2	1	2
• Medicinas para el corazón	1	2	1	2
• Medicinas para la tensión arterial	1	2	1	2
• Medicamentos para la diabetes	1	2	1	2
• Medicinas para alteraciones digestivas	1	2	1	2
• Antidepresivos, estimulantes	1	2	1	2
• Medicamentos para bajar el colesterol	1	2	1	2
• Medicamentos para la diabetes	1	2	1	2
• Hormonas para la menopausia (sólo a mujeres).....	1	2	1	2
• Anticonceptivos (sólo a mujeres)	1	2	1	2
• Otros (especificar)	1	2	1	2
•	1	2	1	2

A TODOS

P.17. Durante los últimos doce meses, hasta el día de ayer, ¿ha acudido a algún Centro de Salud (Consultorio) o Ambulatorio (Centro de Especialidades) de la Seguridad Social/SAS (Servicio Andaluz de Salud) por algo que le pasaba a USTED o acompañando a otra persona?

- Sí, por algo que le pasaba a usted 1
- Sí, por algo que le pasaba a otra persona (familiar, conocido, etc.) 2
- Sí, por ambos motivos 3
- No, no he acudido en los últimos doce meses pero si anteriormente 4
- No, nunca he ido a un Centro de Salud o Ambulatorio de la S. Social/SAS 5
- N/C 9

P.17a. Y, ¿ha CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO (público o privado) por algún problema, molestia o enfermedad suya EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS? Nos referimos a una verdadera consulta, no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis

- Sí 1
- No 2 ➡ Pasar P.18
- N/C 9 ➡ Pasar P.18

P.17b. ¿Cuántas veces ha consultado al médico en las 2 últimas semanas?

--	--	--	--

 veces

- NS/NC 99

P.17c. Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo usted al médico? (conteste en relación con la última consulta)

- Centro de Salud/Consultorio 1
- Ambulatorio/Centro de Especialidades 2
- Consulta externa de un Hospital 3
- Servicio de Urgencia de un Ambulatorio 4
- Servicio de Urgencia de un Hospital 5
- Consulta del médico particular 6
- Consulta del médico de una sociedad 7
- Empresa o lugar de trabajo 8
- En el domicilio de usted 9
- Consulta telefónica 10
- Organizaciones no gubernamentales (ONG,s)..... 11
- Otros lugares 12
- NS/NC 99

P.17d. ¿Cuál fue el motivo principal de la última consulta o visita?

- Diagnóstico y tratamiento 1
- Revisión 2
- Planificación familiar 3
- Control de embarazo 4
- Rehabilitación 5
- Orientación y consejo, problemas familiares y/o sociales 6
- Expedición de recetas 7
- Emisión de partes de bajas, confirmación o alta 8
- Otras 9
- NS/NC 0

P.17e. El médico que consultó o visitó era (una sola respuesta)

- Médico general 1
- Otros 2

¿Cuál?

- Alergología 01
- Aparato digestivo 02
- Cardiología 03
- Cirugía general y digestiva 04
- Cirugía cardiovascular 05
- Cirugía vascular 06
- Dermatología 07
- Endocrinología y nutrición 08
- Geriatria 09
- Ginecología-obstetricia 10
- Internista 11
- Nefrología 12
- Neumología 13
- Neurocirugía 14
- Neurología 15
- Oftalmología 16
- Otorrinolaringología 17
- Oncología 18
- Psiquiatría 19
- Rehabilitación 20
- Reumatología 21
- Traumatología 22
- Urología 23
- Otros 24
- No sabe 88
- No contesta 99

P.17f. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar entre la solicitud de la consulta al centro sanitario y su celebración? (Entrevistador/a: si le dicen "en el mismo día" escriba "0" en el espacio días)

--	--	--	--

 meses

--	--	--	--

 días

- NS/NC 99

P.17g. El médico al que acudió en esta última consulta realizada era ...

- De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas, Adeslas, Asisa) 2
- Médico privado/particular 3
- Mutua de su empresa o médico de su empresa 4
- Otros 5
- NS/NC 9

(Sólo a los que respondieron 2 ó 9 en P.17a)

P.18. ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a usted?

--	--	--	--

 años

--	--	--	--

 meses

- Nunca ha ido al médico 97
- No recuerda 98
- NS/NC 99

A TODOS/AS

P.19. Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos 6 meses, ¿ha ido usted al dentista, protésico o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

- Sí 1
- No 2 ⇒ *Pasar P.19b*
- N/C 9 ⇒ *Pasar P.19b*

P.19a. ¿Cuántas veces? Veces ⇒ *Pasar P.19c*

- NS/NC 99

P.19b. Si no ha ido en los últimos 6 meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico o higienista dental?

- años meses
- Nunca he ido al dentista 97
 - No recuerda 98 } *P.20*
 - NS/NC 99

P.19c. ¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Sí	No	N/C
• Revisión o chequeo	1	2	9
• Limpieza de boca	1	2	9
• Empastes (obturaciones)	1	2	9
• Extracción de algún diente o muela	1	2	9
• Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	1	2	9
• Tratamiento de las enfermedades de las encías	1	2	9
• Ortodoncia	1	2	9
• Selladores, aplicación de flúor ...	1	2	9
• Otros motivos	1	2	9

P.19d. El dentista al que consultó esta última vez era

- De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas, Adeslas, Asisa) 2
- Dentista privado/particular 3
- Otros especificar 4

A TODOS/AS

P.20. Durante los últimos doce meses, hasta el día de ayer, ¿ha estado usted ingresado en un hospital, al menos durante una noche?

- Sí 1
- No 2 ⇒ *Pasar P.21*
- N/C 9 ⇒ *Pasar P.21*

P.20a. ¿Cuántas veces ha estado usted hospitalizado en estos últimos doce meses?

- Veces
- NS/NC 99

P.20b. ¿Estuvo usted en la lista de espera por ese motivo?

- Sí 1
- No 2 ⇒ *Pasar P.21*
- N/C 9 ⇒ *Pasar P.21*

P.20c. ¿Cuánto tiempo en meses? (si menos de un mes contabilizar como "cero" meses)

- meses
- NS/NC 99

A TODOS/AS

P.21. En estos últimos doce meses, ¿ha tenido usted que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia, no de otro familiar?

- Sí, acudí a un centro o servicio 1
- Sí, acudieron a mi domicilio 2
- No 3 ⇒ *P.22*
- NS/NC 9 ⇒ *P.22*

P.21a. Y en total, ¿cuántas veces tuvo usted que utilizar algún servicio de urgencias en estos últimos 12 meses?

- Veces
- NS/NC 99

P.21b. Refiriéndonos a la última vez que utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, ¿dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a ...?

- Un hospital de la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- Un servicio de urgencias no hospitalario de la S.S./S.A.S. 2
- Un servicio privado urgencia 3
- Un sanatorio, hospital o clínica privada ... 4 } *P.22*
- Otras respuestas 5
- NS/NC 9

P.21c. ¿Por qué fue usted a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social?

- Se lo mandó el médico 1
- Usted, sus familiares lo consideraron necesario ... 2
- NS/NC 9

A TODOS

P.22. ¿Podría decirme ahora, si es usted titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que le cito a continuación? (máximo 2 respuestas)

- Seguridad social 1
- Mutualidades del Estado (Muface, Isfas, etc.):
 - Acogidos a la Seguridad Social 2
 - Acogidos a un seguro privado 3
- Seguro Médico concertado individualmente (Sanitas, colegios profesionales, etc.) 4
- Seguro Médico concertado por su empresa 5
- No tengo seguro médico 6
- Otros 7
- NS/NC 9

TABACO

P.23. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)? En caso de que fume o haya fumado, ¿a qué edad empezó a fumar?

- Si, fuma diariamente 1
 - Si fuma pero no diariamente 2 ⇒ P.24a
 - No fuma, pero ha fumado 3 ⇒ P.25
- Edad de inicio: años

- No fuma ni ha fumado nunca de manera habitual 4 ⇒ P.26
- N/C 9 ⇒ P.26

P.24. ¿Qué cantidad de tabaco fuma usted por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

P.24a. Y durante las últimas dos semanas, ¿Ha fumado usted alguno de los siguientes **TIPOS DE TABACO**?

	Sí	No	NC
• Tabaco negro	1	2	9
• Tabaco rubio	1	2	9
• Mezcla de tabaco rubio y negro, picadura o tabaco de liar	1	2	9
• Mezcla de tabaco con marihuana o hachis	1	2	9
• Marihuana o hachis sin mezclar con tabaco)	1	2	9
• Otros	1	2	9

P.24b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

- Más 1
- Igual 2
- Menos 3
- NC 9

P.24c. Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar?

- Sí 1
- No 2
- No he acudido/consultado al médico 3
- NC 9

P.24d. ¿Ha intentado alguna vez dejar de fumar?

- Sí 1
- No 2 ⇒ P.24f
- NC 3 ⇒ P.24f

¿Cuántas veces?

P.24e. Y, ¿cuánto tiempo hace que intentó dejar de fumar? (si fueron varios intentos, de la última vez)

- Hace más de 5 años 1
- Entre 5 y 1 año 2
- Hace menos de 1 año 3
- NS 4

P.24f. ¿Le gustaría dejar de fumar?

- No 1
- Sí, le gustaría 2
- No lo ha pensado 3
- No lo sabe 4
- NC 9

EXFUMADORES: (Hacer P.25 hasta P.25b sólo a los exfumadores, dígito 3 en P.23). Resto, pasar a P.26

P.25. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

Meses años

- NS/NC 9999

P.25a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión?

- Me lo aconsejó el médico 1
- Sentía molestias por causa del tabaco 2
- Aumentó mi preocupación por sus efectos nocivos 3
- Sentí que disminuía mi rendimiento psíquico o físico 4
- Lo decidí por propia voluntad 5
- Otros motivos 6

P.25b. ¿Qué cantidad de tabaco fumaba por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

A TODOS/AS

P.26. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa?

- Sí 1
- No 2
- No procede (vive sola/o) 3
- NC 9

P.27. Fuera de casa, o del trabajo ¿cuánto tiempo al día, de media, pasa en ambientes cargados de humo de tabaco durante los días de diario? ¿Y durante los fines de semana?

	Nunca	Menos de una hora	De 1 a 4 horas	Más de 4 horas	NS/NC
• Días de diario (de lunes a viernes)	1	2	3	4	9
• Fin de semana (sábado y domingo)	1	2	3	4	9

P.28. Cuando tenía usted 12 años, ¿había alguna persona que fumaba habitualmente en el hogar en el que se crió? (Entrevistador/a: Respuesta Múltiple)

- Sí, mi madre 1
- Sí, mi padre 2
- Yo mismo 3
- Otra persona (tío, hermano, abuelo, etc) 4
- Nadie 5
- No sabe/ no recuerda 8
- NC 9

A TODOS/AS: CONSUMO DE ALCOHOL

P.29. Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independiente de su graduación. ¿Consume Vd. algún tipo de bebida alcohólica con una frecuencia de al menos una vez al mes?

- Si 1
 - No, menos de una vez al mes 2
 - No, no consume bebidas alcohólicas 3
 - NS/NC 9
- } Pasar P.33

P.29a. ¿Ha bebido usted en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

- SI 1
- No 2
- NS/NC 9

P.30. Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume?

	P.30.											P.30a. Nº vasos cada vez
	3-4 veces al día	2 veces al día	1 vez al día	5-6 veces semana	3-4 veces semana	1-2 veces semana	2-3 veces mes	1 vez mes	< 1/mes pero al menos 1 vez año	< 1 vez año o Nunca	N/C	
• Vino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Cerveza, sidra, tinto de verano ...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Jerez, vermouth.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Champán, cava.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>

P.30a. ¿Cuál es la cantidad de vasos o copas que toma cada vez que bebe?

P.31. Para cada una de esas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluido viernes por la tarde), sólo en días laborables o en ambos indistintamente?

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	N/C
• Vino	1	2	3	9
• Cerveza, sidra, tinto de verano	1	2	3	9
• Jerez, vermouth	1	2	3	9
• Champán o cava	1	2	3	9
• Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, ..) ...	1	2	3	9
• Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)	1	2	3	9

P.31a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (Entrevistador/a: no se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por sí solo)

años

P.32. ¿Ha pensando alguna vez que debería beber menos?

- Si 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32a. ¿Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber?

- Si 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32b. ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber?

- Si 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32c. ¿Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o para evitar la resaca?

- SI 1
- No 2
- NS/NC 9

SUEÑO

P.33. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme habitualmente?

- 
 Horas
- NS/NC 99

P.33a Las horas que duerme, ¿le permiten descansar lo suficiente?

- SI 1
- No 2
- N/S 8
- N/C 9

EJERCICIO FISICO

P.34. Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. De las siguientes, ¿cuál diría usted que describe mejor su actividad principal?

- Sentado la mayor parte de la jornada 1
- De pie la mayor parte sin grandes desplazamientos o esfuerzos 2
- Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 3
- Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 4
- NS/NC 9

P.34a. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre?. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre

- No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, TV., cine, etc.) ... 1
- Alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar, pasear en bici, jardinería, gimnasia suave, etc.) 2
- Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, etc.) ... 3
- Entrenamiento físico varias veces a la semana (incluye actividad física varias veces a la semana) 4
- NS/NC 9

P.34b. ¿Cuántos días a la semana practica normalmente durante más de 30 minutos? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

- Nº de días/sem
- Caminar 1 
 - Una actividad física ligera como gimnasia suave, juegos que requieren poco esfuerzo y similares 2 
 - Una actividad física moderada como montar en bicicleta, gimnasia, aeróbic, correr, natación 3 
 - Entrenamiento físico deportivo como fútbol, baloncesto, ciclismo, natación de competición, judo, kárate o similares 4 

P.34c. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico?

- SI 1
- No 2
- NS/NC 9

ALIMENTACIÓN

P.35. En relación a sus hábitos alimentarios ¿qué suele desayunar habitualmente?

- Café, leche, té, chocolate, cacao, yogur, etc 1
- Pan, tostadas, galletas, cereales, bollería, etc 2
- Fruta y/o zumo 3
- Alimentos como huevos, queso, jamón, etc 4
- Otro tipo de alimentos 5
- Nada, no suele desayunar 6
- Ns/Nc 9

P.35a. ¿Cuántos litros de agua bebe normalmente al día?

- Menos de medio litro 1
- De medio a 1 litro 2
- De 1 litro a litro y medio 3
- De 1 litro y medio a 2 litros 4
- Más de 2 litros 5
- N/C 9

P.36. Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga con qué frecuencia los consume Ud. (MOSTRAR TARJETA C)

	A diario	Tres o más veces a la semana	Una/dos veces a la semana	Menos de 1 vez semana	Nunca o casi nunca	N/C
• Leche y derivados (yogur, postres lácteos, queso, ...)	1	2	3	4	5	9
• Pan, cereales	1	2	3	4	5	9
• Legumbres (lentejas, judías, garbanzos)	1	2	3	4	5	9
• Pasta (fideos, macarrones, espaguetis, ...) arroz, patatas	1	2	3	4	5	9
• Fruta fresca	1	2	3	4	5	9
• Verduras y hortalizas	1	2	3	4	5	9
• Carne	1	2	3	4	5	9
• Embutidos	1	2	3	4	5	9
• Pescado	1	2	3	4	5	9
• Huevos	1	2	3	4	5	9
• Dulces (galletas, mermelada, chocolate)	1	2	3	4	5	9

A TODOS/AS: PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Las siguientes preguntas se refieren a prácticas preventivas en relación con la salud

P.37. Pasando a otro tema, querríamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña

- Si 1 ⇒ P.37a
- No 2 ⇒ P.38
- NC 3 ⇒ P.38

P.37a. ¿Quién se lo indicó?

- El médico, por mi edad 1
- El médico, por mis enfermedades 2
- Me ponen la vacuna en la empresa/ centro de estudio 3
- Yo solicité la vacuna porque prefiero estar vacunado 4
- El médico, por otras razones 5
- Otros 6
- NS/NC 9

P.38. Ahora me gustaría preguntarle sobre la tensión arterial. ¿Le ha tomado la tensión alguna vez un/a profesional sanitario/a, excluyendo las tomas de tensión en farmacias?

- SI 1 ⇒ P.38a
- No 2 ⇒ P.39
- No sabe/no recuerda 1 ⇒ P.38a
- NC 2 ⇒ P.39

P.38a. La última vez que le tomaron la tensión fue...

- Hace menos de 3 meses 1
- Entre 3 y 5 meses 2
- Entre 6 meses y 1 año 3
- Entre 1 y 3 años 4
- Más de 3 años 5
- No sabe/No recuerda 6
- N/C 9

P.39. Las siguientes preguntas se refieren al colesterol, ¿le han medido alguna vez sus niveles de colesterol por prescripción médica, excluyendo las mediciones en farmacias?

- SI 1 ⇒ P.39a
- No 2 ⇒ P.40
- No sabe/no recuerda 1 ⇒ P.39a
- NC 2 ⇒ P.40

P.39a. La última vez que se los midieron fue:

- Hace menos de 3 meses 1
- Entre 3 y 5 meses 2
- Entre 6 meses y 1 año 3
- Entre 1 y 3 años 4
- Más de 3 años 5
- No sabe/No recuerda 6
- N/C 9

P.40. En los últimos 12 meses, es decir, desde principios de 2010 hasta hoy, ¿diría usted que su estado de salud ha sido ...?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4
- Muy malo 5
- NS/NC 9

P.41a. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (marque sólo una o el más usado)

- No 1 ⇒ P.41b
- Usa píldoras 2
- Tiene DIU 3
- Usa inyecciones 4
- Usa preservativo o condón 5
- Evita los días fértiles, uso método de ritmo de calendario 6
- Usa diafragma, espuma o gel 7
- Se practicó esterilización femenina 8
- Se practicó esterilización masculina 9
- Realiza coito interrumpido 10
- Píldora del día después 11
- Otros, especificar 12

P.42

P.41b. Si usted o su pareja no usan ningún método anticonceptivo, indique cuál es la principal razón para no usarlo (única respuesta)

- No lo necesita (no tiene relaciones, por la edad, infértil, postparto) 1
- Está embarazada 2
- Quiere quedar embarazada 3
- Se opone al uso de anticonceptivos (su religión se lo prohíbe, su pareja se opone, otros se oponen) 4
- Por razones de salud (temor a efectos secundarios, le es incómodo, molesto) 5
- No conoce los métodos anticonceptivos 6
- Por su precio, no puede comprarlo 7
- Otra, especificar 9

(ÚNICAMENTE MUJERES. RESTO, PASAR A P.43f)

P.42 ¿Ha acudido alguna vez a un ginecólogo?

- SI 1 ⇒ P.42a
- No 2 ⇒ P.43
- NC 9 ⇒ P.43

P.42a ¿Cuándo ha efectuado la última visita a un ginecólogo por algún motivo distinto a los relacionados con un embarazo o parto?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4
- Nunca ha ido por motivos diferentes al embarazo o parto 9 ⇒ P.43

P.42b ¿Podría decirme el motivo de la última consulta (que no sea embarazo/parto)?

- Por algún problema ginecológico 1
- Para realizar orientación/planificación familiar 2
- Para revisiones periódicas 3
- Para realizar detección de cáncer de mama 4
- Para realizar detección precoz de cáncer de útero 5
- Otro motivo 6
- NS/NC 9

P.42c. ¿Dónde tuvo lugar esta última consulta?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

P.43. ¿Le han hecho alguna vez una mamografía (radiografía de mama) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.43c**
- NC 9 ⇒ **P.43c**

P.43a. ¿Cuándo le han hecho la última mamografía?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.43b. ¿Dónde le hicieron la última mamografía?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

P.43c. ¿Le han hecho alguna vez una citología vaginal (muestra de células) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.43f**
- NC 9 ⇒ **P.43f**

P.43d. ¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.43e. ¿Dónde le hicieron la última citología vaginal?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

(HOMBRES Y MUJERES DE 50 Y MÁS AÑOS. RESTO, PASAR A P.44)

P.43f. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.44**
- NC 9 ⇒ **P.44**

P.43g. ¿Qué tipo de prueba le han realizado?

- Análisis de sangre 1
- Sangre oculta en heces 2
- Endoscopia (Colonoscopia/Sigmoidoscopia/Rectoscopia) 3
- Otras 4
- No sabe / no recuerda 8
- No contesta 9

P. 43h. ¿En qué año se hizo la última prueba?

- Año: _____
- No sabe/no recuerda 8
- No contesta 9

P.43i. ¿Quién le recomendó la realización de esta prueba?

- Lo solicité yo mismo/a 1
- Me lo sugirió mi médico de cabecera 2
- Me lo sugirió otro médico especialista del SAS 3
- Me lo sugirió otro médico del servicio privado 4
- No sabe/no recuerda 8
- No contesta 9

P.43j. ¿Dónde le hicieron esta última prueba?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

A TODOS/AS: PROTECCION SOLAR

P.44. En el pasado verano, cuando estuvo al aire libre, ¿con qué frecuencia utilizó...?. Piense en una escala de 0 a 10, donde 0 sería nunca y 10 siempre

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre						
• Crema solar con factor de protección de 15 o mayor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Camiseta para protegerse del sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Gorra o sombrero para protegerse del sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Gafas de sol para protegerse del sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• La sombra para evitar el sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Crema solar con factor de protección de 50 o más	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P.44a En el pasado verano, ¿con qué frecuencia (utilizando la misma escala de 0 a 10) se expuso al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde?

Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P.44b ¿Ha utilizado en los últimos 5 años cabinas o lámpara de rayos ultravioleta (uva)?

No, nunca	Sí, alguna vez	Sí, muchas veces
0	1	2

P.44c Una quemadura solar es cualquier enrojecimiento o molestia durante más de 12 horas provocada por el sol u otra fuente de rayos U.V., como cabinas o lámparas solares. ¿Ha sufrido usted alguna quemadura solar en el último año?

- Sí, con ampollas 1
- Sí, sin ampollas 2
- No 3
- NS/NC 9

P.45. Imagínese que toma el sol sin ninguna protección. En ese caso....:

- Se quemaría siempre y no se pondría moreno nunca 1
- Se quemaría fácilmente y se pondría muy poco moreno 2
- Se quemaría moderadamente y se pondría moreno gradualmente 3
- Se quemaría mínimamente y se pondría moreno siempre 4
- Se quemaría raramente y se pondría muy moreno 5
- Nunca se quemaría 8
- NS/NC 9

PESO Y TALLA

P.46. ¿Podría decirme cuánto pesa, aproximadamente, sin zapatos ni ropa? (si está embarazada en la actualidad, debe indicar cuánto pesaba antes del inicio del embarazo)

_____ Kilos

- No sabe 998
- No contesta 999

P.47. ¿Y cuánto mide, aproximadamente, sin zapatos?

_____ Cms.

- No sabe 998
- No contesta 999

P.47a. Y, en relación a su estatura, ¿diría usted que su peso es ...?

- Bastante mayor de lo normal 1
- Algo mayor de lo normal 2
- Normal 3
- Menor de lo normal 4
- NS 8
- NC 9

VISTA Y OIDO

P.48. ¿Oye usted un programa de televisión a un volumen que otros consideran aceptable (con o sin prótesis auditiva o audífono)?

- No 1
- Si 2 ⇒ P.49
- NC 3 ⇒ P.49

P.48a. ¿Puede oírlo al aumentar el volumen?

- Si 1
- No 2
- NS/NC 9

P.49. ¿Ve usted suficientemente bien como para (con gafas o sin gafas o lentillas) reconocer a un amigo a una distancia de cuatro metros (al otro lado de la calle)?

- No 1
- Si 2 ⇒ P.50
- NC 3 ⇒ P.50

P.49a. ¿Puede usted reconocerlo a una distancia de un metro?

- Si 1
- No 2
- NS/NC 9

A TODOS/AS: SEGURIDAD VIAL

P.50. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando conduce...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	Nunca conduce
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.50a. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	No procede
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.51. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	No procede
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.52. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en bicicleta...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	No procede
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.53. Durante el último mes y cuando usted conducía el coche, ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de detrás?

- Siempre 1
- La mayoría de las veces 2
- Algunas veces 3
- Raramente 4
- Nunca 5
- No he conducido con menores de de 5 años/No conduzco 8
- NS/NC 9

SÓLO SI EL ENTREVISTADO/A TIENE 65 AÑOS O MÁS. RESTO PASAR A P.57

P.54. Las preguntas que siguen se refieren a sus actividades cotidianas y cuidados personales

P.54.1. ¿Es usted capaz de hacer las tareas de la casa?	
• Sin ayuda (limpiar, fregar el suelo, etc.)	0
• Con alguna ayuda (puede hacer las cosas menos laboriosas pero necesita ayuda para los trabajos pesados)	3
• No puede realizar las tareas domésticas en absoluto	5
P.54.2. ¿Es usted capaz de prepararse la comida?	
• Sin ayuda (planea y cocina comidas completas por sí mismo)	0
• Con alguna ayuda (puede preparar algunas cosas pero es incapaz de preparar la comida)	2
• No puede prepararse la comida en absoluto	4
P.54.3. ¿Es usted capaz de irse de compras?	
• Sin ayuda (se encarga personalmente de las compras necesarias)	0
• Con alguna ayuda (necesita que alguien le acompañe en todas sus compras)	2
• No puede hacer compras en absoluto	4
P.54.4. ¿Es usted capaz de manejar dinero (pagar facturas, contar dinero)?	
• Sin ayuda (pagar facturas, contar el cambio, etc.)	0
• Con alguna ayuda (aunque puede arreglarse con el dinero en el bolsillo, necesita ayuda para pagar facturas o manejar cheques bancarios)	2
• No puede manejar el dinero en absoluto	4
P.54.5. ¿Es usted capaz de usar el teléfono?	
• Sin ayuda (incluyendo buscar y marcar números)	0
• Con alguna ayuda (puede contestar el teléfono y llamar a números de emergencia -091- o los números más habituales, pero necesita un teléfono especial o ayuda para buscar y marcar números)	1
• No puede usar el teléfono en absoluto	3
P.54.6. ¿Es usted capaz de tomar su medicación?	
• Sin ayuda (las dosis correctas a la hora oportuna)	0
• Con alguna ayuda (puede tomar su medicación si alguien se la prepara y/o se lo recuerda)	2
• Es totalmente incapaz de tomar su medicación	4
P.54.7. ¿Es usted capaz de subir y bajar escaleras?	
• Sin ayuda (se incluyen cualquier instrumento de ayuda para andar)	0
• Con alguna ayuda	2
• Es totalmente incapaz de subir y bajar escaleras	5
P.54.8. ¿Es usted capaz de usar el water (o el sillón con escupidera)?	
• Sin ayuda (puede alcanzar la taza/sillón con escupidera, desvestirse lo necesario, limpiarse y salir)	0
• Con alguna ayuda (puede hacer algunas cosas, incluido limpiarse)	5
• No puede usar la taza/sillón de water	8
P.54.9. ¿Se le escapa la orina? (incontinencia urinaria)	
• No	0
• Pocas veces	6
• A menudo o necesita ayuda con el catéter/sonda de orina	8
P.54.10. ¿Se le escapa la caca? (incontinencia fecal)	
• No	0
• Pocas veces (menos de una vez al día)	6
• A menudo o necesita enemas	9
P.54.11. ¿Es usted capaz de usar el baño o la ducha?	
• Sin ayuda (puede entrar y salir de la bañera o ducharse sin ayuda o supervisión de nadie)	0
• Necesita ayuda para bañarse o ducharse	6
P.54.12. ¿Es usted capaz de arreglarse (por ejemplo peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.)?	
• Sin ayuda (si alguien le da las cosas si fuera necesario)	0
• Con ayuda	5
P.54.13. ¿Es usted capaz de vestirse solo?	
• Sin ayuda (incluido botones, cremalleras, cordones, etc.)	0
• Con ayuda (puede hacerlo a medias sin ayuda)	3
• No puede vestirse solo	6
P.54.14. ¿Es usted capaz de comer solo?	
• Sin ayuda	0
• Con algo de ayuda (para cortar los alimentos, untar la mantequilla, etc.)	5
• No puede comer solo	8
P.54.15. ¿Es usted capaz de salir a caminar?	
• Unos 50 metros o más sin ayudas	0
• Unos cuantos metros (menos de 50 metros)	4
• Es totalmente incapaz de caminar por fuera de casa	6

P.54.16. ¿Es usted capaz de moverse por su casa?	
• Sin ayuda (con bastón o muletas si los usa)	0
• Con alguna ayuda (bajo la supervisión de alguien no especializado)	5
• En silla de ruedas sin ayuda (incluidas puertas y esquinas)	4
• Necesita ayuda física para moverse	7
P.54.17. ¿Es usted capaz de moverse desde la cama hasta una silla que esté al lado de la misma?	
• Sin ayuda	0
• Con alguna ayuda (de alguien que supervise para mayor seguridad)	4
• Con mucha ayuda (de una persona fuerte o entrenada o dos no especializados para sentarse)	6
• Es usted completamente incapaz (no mantiene el equilibrio sentado y necesita dos personas)	7

SÓLO A QUIÉNES CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.54.1. A P.54.7 ó P.54.15 (AVDs INSTRUMENTALES)

P.55. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?	
• Nadie	1
• Su pareja	2
• Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR N° PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL: _____)	3
• Un familiar que no vive con usted	4
• Un amigo o alguien que no cobra por eso	5
• Ayuda privada (pagada)	6
• Ayuda pública:	
• Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales	7
• Enfermera del centro de salud o ambulatorio	8
• Voluntariado	9
• Otro	10

SÓLO A QUIÉNES CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.54.8 A P.54.14 ó P.54.16 ó P.54.17 (AVDs BÁSICAS)

P.56. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?	
• Nadie	1
• Su pareja	2
• Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR N° PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL: _____)	3
• Un familiar que no vive con usted	4
• Un amigo o alguien que no cobra por eso	5
• Ayuda privada (pagada)	6
• Ayuda pública:	
• Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales	7
• Enfermera del centro de salud o ambulatorio	8
• Voluntariado	9
• Otro	10

A TODOS/AS: APOYO AFECTIVO Y PERSONAL

P.57. En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por nosotros o nos proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según la escala de 5 a 1, en la que "5" significa "TANTO COMO DESEA", "4" "casi como desea", "3" "ni mucho ni poco", "2" "menos de lo que desea" y "1" significa "MUCHO MENOS DE LO QUE DESEA" (Mostrar Tarjeta D)

	Tanto como deseo	Casi como deseo	Ni mucho ni poco	Menos de lo que deseo	Mucho menos de lo que deseo
P.57.1. Recibo visitas de mis amigos y familiares	5	4	3	2	1
P.57.2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa	5	4	3	2	1
P.57.3. Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo	5	4	3	2	1
P.57.4. Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede	5	4	3	2	1
P.57.5. Recibo amor y afecto	5	4	3	2	1
P.57.6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo y/o en la casa	5	4	3	2	1
P.57.7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares	5	4	3	2	1
P.57.8. Tengo posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos ..	5	4	3	2	1
P.57.9. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas	5	4	3	2	1
P.57.10. Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida	5	4	3	2	1
P.57.11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama	5	4	3	2	1

P.58. ¿Cuál fue su lugar de nacimiento?

Andalucía 1 Indicar provincia:
 Indicar municipio:
 Resto de España 2 Indicar provincia:
 Año que llegó a Andalucía:
 Extranjero 3 Indicar País:
 Año que llegó a España: Año que llegó a Andalucía:

P.59. ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1 ⇨ P.60
- Soltero/a 2
- Separado/a 3
- Divorciado/a 4
- Viudo/a 5
- NS/NC 9

P.59a. ¿Vive usted actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2
- No contesta 9

P.60. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que usted ha finalizado?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B. Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.61. ¿Cuál es su situación laboral actual?

- Trabaja 1 ⇨ P.63a
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/Invalidez permanente 7
- Otros 8

→ ¿Cuántos meses en paro?

P.62. ¿Percibe usted alguna pensión (pública o privada)?

- Sí 1 ⇨ ¿Cuál?
- No 2
- NC 9

P.63. ¿Ha trabajado anteriormente?

- Sí 1 ⇨ Pasar a P.63a
- No 2 ⇨ Pasar a P.71
- NS/NC 9 ⇨ Pasar a P.71

(Entrevistador: como resultado de las preguntas anteriores, debe quedar clara la situación de la persona entrevistada):

- Trabaja o ha trabajado anteriormente (pasar a P.63a)
- No trabaja ni ha trabajado anteriormente (pasar a P.71)

PARA LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO

P.63a. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba?

.....

P.63b. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?

.....

P.63c. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO, PASAR A P.71

P.64. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?

- Trabaja por su cuenta o no es asalariado 1
- Funcionario/estatutario 2
- Contrato indefinido 3
- Contrato temporal de menos de 6 meses 4
- Contrato temporal de 6 meses a 1 año 5
- Contrato temporal de 1 a 2 años 6
- Contrato temporal de más de 2 años 7
- Contrato temporal sin especificar duración 8
- Sin contrato 9
- Otra relación 10
- NS/NC 99

P.64a. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual empresa?

años meses

P.64b. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

- Jornada partida 1
- Jornada continua de mañana 2
- Jornada continua de tarde 3
- Jornada continua nocturna 4
- Turnos 5
- Por horas 6
- Otra posibilidad 7
- NS/NC 9

P.64c. En total, ¿cuántas horas trabaja usted habitualmente a la semana?

horas

P.64d. ¿Cuánto tiempo tarda en todos sus desplazamientos para ir y volver de trabajar al día?

horas minutos

• Jornada muy variable, según los días 999

P.64e. ¿Cuántas personas trabajan bajo su responsabilidad?

- Ninguna 1
- De 1 a 5 2
- De 6 a 9 3
- De 10 a 20 4
- Más de 20 5
- Ns/Nc 9

P.65. La empresa donde usted trabaja, ¿cuántos empleados/as tiene?

- Ninguno 1
- De 1 a 9 2
- De 10 a 49 3
- De 50 a 99 4
- De 100 a 499 5
- 500 ó más 6
- No sabe 8
- No contesta 9

P.66. Entre las tareas que realiza en su trabajo, ¿en qué medida está usted expuesto a ...?

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Nunca	NS/NC
• Ruido tan alto que tiene que levantar la voz para hablar con otra gente	1	2	3	4	9
• Altas/Bajas temperaturas	1	2	3	4	9
• Respirar vapores, humos, polvo, o sustancias peligrosas como químicos, material infeccioso, etc./ Manejar o tocar sustancias o productos peligrosos/ Radiaciones como rayos X, soldadura, rayos láser	1	2	3	4	9
• Posiciones dolorosas / fatigantes	1	2	3	4	9
• Tareas repetitivas de menos de 10 minutos/ Movimientos repetitivos de manos o brazos	1	2	3	4	9
• Manipular cargas pesadas (más de 15 kgrs)	1	2	3	4	9
• Trabajos al aire libre	1	2	3	4	9

P.67. Elija una sola respuesta de la siguiente escala (leer) para cada una de las siguientes preguntas que le voy a leer:

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca
1. ¿Tiene usted que trabajar muy rápido?	1	2	3	4	9
2. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se le acumule el trabajo?	1	2	3	4	9
3. ¿Tiene usted tiempo de llevar al día su trabajo?	1	2	3	4	9
4. ¿Le cuesta olvidar los problemas del trabajo?	1	2	3	4	9
5. ¿Su trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?	1	2	3	4	9
6. ¿Su trabajo requiere que esconda sus emociones?	1	2	3	4	9
7. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna?	1	2	3	4	9
8. ¿Se tiene en cuenta su opinión cuando se le asignan tareas?	1	2	3	4	9
9. ¿Tiene influencia sobre el orden en el que realiza las tareas?	1	2	3	4	9
10. ¿Puede decidir cuándo hace un descanso?	1	2	3	4	9
11. Si tiene algún asunto personal o familiar, ¿puede dejar su puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?	1	2	3	4	9
12. ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa?	1	2	3	4	9
13. ¿Su trabajo le permite que aprenda cosas nuevas?	1	2	3	4	9
14. ¿Se siente comprometido con su profesión?	1	2	3	4	9
15. ¿Tienen sentido sus tareas?	1	2	3	4	9
16. ¿Habla usted con entusiasmo de su empresa a otras personas?	1	2	3	4	9

P.68. ¿Piensa usted que su trabajo afecta negativamente a su salud?

- Sí 1 ⇒ P.69
- No 2 ⇒ P.70
- NC 3 ⇒ P.70

P.69. ¿De qué forma afecta su trabajo a su salud?

	Sí	No
• Tiene dolores de espalda	1	2
• Se siente nervioso y estresado	1	2
• Se siente agotado a todas horas	1	2
• Tiene dolores musculares	1	2
• Tiene dolores de cabeza	1	2
• Tiene problemas de sueño	1	2
• Otro problema, ¿cuál?	1	

P.70. En los últimos 12 meses, ¿cuántos días ha estado ausente de su trabajo debido a problemas de salud causados por su trabajo?

_____ días

A TODOS/AS: INGRESOS ECONOMICOS DEL HOGAR

P.71. Con los ingresos de su hogar, ¿cómo suele llegar usted, o en su caso, usted y su familia, en la actualidad a fin de mes?

- Con mucha dificultad1
- Con dificultad2
- Con cierta/alguna dificultad3
- Con cierta/alguna facilidad4
- Con facilidad5
- Con mucha facilidad6

P.72. Por favor, indique el intervalo en el que están comprendidos los ingresos totales netos de su hogar, sumando todas las fuentes (si existe más de una) y deduciendo las retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos asimilados (MOSTRAR TARJETA E)

- Hasta 300 € 1
- De 301 a 499 € 2
- De 500 a 999 € 3
- De 1.000 a 1.499 € 4
- De 1.500 a 1.999 € 5
- De 2.000 a 2.499 € 6
- De 2.500 a 2.999 € 7
- De 3.000 a 4.999 € 8
- Más de 5.000 € 9
- No sabe leer, no está seguro 10
- No contesta 99

ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el/la esposo/a o pareja (conviviente) de la persona entrevistada.

P.73. ¿Está usted casado/a y/o vive actualmente en pareja? (Entrevistador/a: anotar según P.59/P.59a)

- Si 1 ⇨ P.74
- No 2 ⇨ P.75
- No contesta 9 ⇨ P.75

P.74. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por su esposo/a y/o pareja?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.74a. ¿Cuál es la situación laboral actual de su esposo/a y/o pareja?

- Trabaja 1 ⇨ P.74.c
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

⇨ ¿Cuántos meses en paro? _____

P.74b. ¿Percibe su esposo/a y/o pareja alguna pensión (pública o privada)?

- Si 1 ⇨ ¿Cuál?
- No 2
- NC 9

P.74c. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o ha trabajado su esposo/a y/o pareja?

P.74d. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado su esposo/a y/o pareja?

P.74e. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba su esposo/a y/o pareja?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

A TODOS/AS

Para finalizar, quedan solo dos preguntas referidas a los estudios y la ocupación de sus padres en el pasado.

P.75. ¿Cuando usted tenía 12 años, cuál era el nivel de estudios de su padre y de su madre?

	Padre	Madre
• No sabía leer o escribir	1	1
• No había estudiado/primaria incompleta pero sabía leer y escribir	2	2
• Estudios primarios completos o equivalentes (hasta 5º EGB, ingreso) ..	3	3
• Secundarios primera etapa (EGB completa, bachiller elemental, graduado escolar, FPI)	4	4
• Secundarios segunda etapa (BUP, B.Superior, FPII, COU, Maestrías) .	5	5
• Estudios universitarios de grado medio	6	6
• Estudios universitarios de grado superior	7	7
• No sabe/No recuerda	8	8
• No contesta	9	9

P.76. Cuando usted tenía 12 años, ¿Cuál era la situación laboral de su padre y de su madre?

	Padre	Madre
• Directivos de la administración pública y de empresas de 10 o más asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario.	1	1
• Directivos de empresas con menos de 10 asalariados. Profesiones asociadas a una titulación de primer ciclo universitario. Técnicos superiores. Artistas y deportistas.	2	2
• Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y financiera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores por cuenta propia. Supervisores de trabajadores manuales.	3	3
• Trabajadores manuales cualificados.	4	4
• Trabajadores manuales semicualificados.	5	5
• Trabajadores no cualificados.	6	6
• No sabe/No recuerda	8	8
• No contesta	9	9

FIN

Anexo B

Definición de Variables



La siguiente tabla muestra las variables estudiadas. La formulación de las preguntas puede consultarse en el cuestionario de la EAS-11 (Anexo A).

I. Nivel de Salud	Variables Cuestionario Adulto EAS 11
Auto-percepción de salud y calidad de vida	P40
Indicadores de salud mental y física (SF-12)	Componente Físico, Componente Mental
Limitación temporal de las actividades cotidianas: limitación en el trabajo habitual y limitación de actividades sociales	P11, P13
Enfermedades crónicas: Alergias, hipertensión, artrosis, nervios, colesterol, varices, diabetes y trastornos cardiacos	P14.16, P14.03, P14.27, P14.23, P14.04, P14.19, P14.02, P14.10.
Discapacidad física, sensorial y psíquica.	P2a
Autonomía personal- ADVs instrumentales y básicas	Q54
Accidente en los últimos tres meses y lugar	P15A, P15B
II. Determinantes de Salud	
Consumo de alcohol: frecuencia de consumo, edad media de inicio al consumo de alcohol y sospecha de alcoholismo (escala CAGE).	P29, Q31a, CAGE
Consumo de tabaco: hábitos de tabaco, edad a la que empezó a fumar, actitud ante el tabaco.	P23, Q23, P24d
Alimentación: consumo de verduras, frutas y lácteos	P36.06, P36.05, P36.01
Peso Corporal: Índice de masa corporal	IMC
Actividad física: actividad física durante el trabajo y durante el tiempo libre	P34, P34a

III. Prácticas preventivas	
Vacunación ante la gripe	P37
Métodos anticonceptivos	P41a
Visitas al ginecólogo	P42
Mamografías	P43
Citologías	P43c
Exposición solar: frecuencia de exposición al sol	Q44a
Higiene buco-dental	P19
Seguridad vial: frecuencia de uso del casco por ciudad y carretera, frecuencia de uso del cinturón por ciudad y carretera, uso de asiento especial para menores.	P51.1, P51.2, P50.1, P50a.1, P50.2, P50a.2, P53
Consejo médico para dejar de fumar	P24c
IV. Medioambiente	
Características de la vivienda	P04a, Q04b
Exposición ambiental a tabaco: fumadores pasivos y tiempo medio en ambientes cargados de tabaco	P26, P27.1, P27.2
Condiciones de trabajo: exposición en el trabajo a riesgos ergonómicos y físico-químicos y grado de afectación negativa del trabajo en la salud	P66.03, P66.04, P68
Apoyo social: escala: DUKE	DUKE

V. Servicios sanitarios	
Consultas médicas: consultas médicas en las últimas dos semanas, lugar, motivo y médico al que visito	P17a, P17c, P17d, P17e
Ingresos hospitalarios	P20, Q20a
Utilización servicio de urgencias: utilización del servicio de urgencias y tipo de servicio usado	P21, P21b
Consultas odontológicas	P19d
Consumo de medicamentos	P16
Cobertura sanitaria: modalidad del seguro sanitario	P22

Agrupaciones de los niveles iniciales de las variables

A continuación se describen algunas de las agrupaciones (recodificaciones) de los niveles iniciales de las variables, previas al análisis de las mismas:

Bloque 1

→ **Mala salud.** La variable estudiada es la unión de las dos opciones más desfavorables: Malo y Muy malo (pregunta 40 del cuestionario).

SF-12. A partir de los ítems que forman el cuestionario se construyen dos puntuaciones resumen: la puntuación física y la puntuación mental. Las puntuaciones estandarizadas basadas en la población normativa (población general española), conocidas como puntuaciones “50/10”, ya que se obtiene una media de 50 y una desviación estándar de 10 en la población general de referencia. Los valores superiores o inferiores a 50 deben interpretarse como mejores o peores, respectivamente de la población de referencia (preguntas 7 a 10 del cuestionario).

→ **Dolor que dificulta el trabajo habitual.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Bastante y Mucho (pregunta 11 del cuestionario).

→ **Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales.** La variable estudiada es la unión de las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre (pregunta 13 del cuestionario).

→ **Discapacidad física, sensorial y psíquica.** Se define limitación física cuando la persona entrevistada responde de forma afirmativa. Se define limitación sensorial cuando la persona entrevistada responde de forma afirmativa. Se define limitación psíquica cuando la persona entrevistada responde de forma afirmativa (pregunta 2a del cuestionario).

→ **Discapacidad física, sensorial y psíquica en hogares.** Se define limitación física cuando algún miembro del hogar entrevistado responde de forma afirmativa. Se define limitación sensorial cuando algún miembro del hogar entrevistado responde de forma afirmativa. Se define limitación psíquica cuando algún miembro del hogar entrevistado responde de forma afirmativa (pregunta 2a del cuestionario).

Bloque 2

- **Sospecha del alcoholismo.** En el cuestionario hay cuatro preguntas que conforman el cuestionario CAGE (Pregunta 32 del cuestionario). Se define la sospecha de alcoholismo cuando alguna de estas cuatro preguntas tiene por lo menos una respuesta afirmativa (preguntas 32, 32a, 32b y 32c del cuestionario).

- **Consumo de lácteos, fruta y verduras.** En estas tres variables se calcula la frecuencia de personas que consumen al menos tres veces a la semana este tipo de productos (pregunta 36 del cuestionario).

- **Sobrepeso y obesidad.** A partir de los datos de peso y altura (preguntas 46 y 47 del cuestionario respectivamente), se calculó el **Índice de Masa Corporal (IMC)**, como variable intermedia, codificándose según propone la OMS en bajo peso (IMC<18,5), peso normal (IMC entre 18,5 y 24,9), sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9) y obesidad (IMC>30). La variable estudiada es la prevalencia para la suma de las categorías sobrepeso y obesidad.

- **Actividad física en el trabajo.** Definimos sedentarismo en el trabajo como la unión de respuestas “Sentado” y “De pie sin esfuerzos” a la pregunta de qué es lo que mejor describe la actividad principal del entrevistado (pregunta 34 del cuestionario).

- **Actividad física en el tiempo libre.** Definimos sedentarismo en el tiempo libre cuando la persona entrevista declara no hacer ningún ejercicio en su tiempo libre (pregunta 34a. del cuestionario).

Bloque 3

- **Exposición solar.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y Casi siempre, en una escala de 0 a 10, puntuación mayor o igual a 7 (pregunta 44a del cuestionario).
- **Uso del cinturón.** La variable estudiada es la agregación de las variables uso del cinturón de seguridad cuando conduce y como acompañante, tanto en ciudad como carretera. La opción seleccionada es Siempre (preguntas 50.1, 50.2, 50a.1, 50a.2 del cuestionario).
- **Uso de asientos especiales para menores.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y “La mayoría de las veces” (pregunta 53 del cuestionario).

Bloque 4

- **Exposición (respirando y manejando) a vapores, humos y otras sustancias peligrosas.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y “Muchas veces” (pregunta 66.03 del cuestionario).
- **Exposición a posiciones fatigantes o dolorosas.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Siempre y “Muchas veces” (pregunta 66.04 del cuestionario).
- **Apoyo social.** A partir de los 11 ítems que forman el cuestionario se construyen dos puntuaciones resumen: apoyo confidencial y apoyo afectivo. Se realiza una escala estandarizada de 0 a 100, con punto de corte en el 50%. Los valores inferiores a 50 deben interpretarse como escaso apoyo confidencial o afectivo, respectivamente, de la población de referencia (pregunta 57 del cuestionario).

Bloque 5

- **Utilización del servicio de urgencias.** La variable estudiada es la agregación de las opciones “Sí acudí a un centro o servicio” y “Sí acudieron a mi domicilio” (pregunta 21 del cuestionario).
- **Cobertura Sanitaria.** Se define la doble cobertura sanitaria cuando la persona entrevistada declara ser titular o beneficiario de más de un seguro sanitario (pregunta 22 del cuestionario).

Además, las **variables de estratificación** fueron:

- **Sexo:** Hombre, Mujer.
- **Edad:** Los grupos de edad: de 16 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45 a 54 años, de 55 a 64 años, de 65 a 74 años y 75 y más años.
- **Provincias:** Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
- **Nivel educativo:** Hasta estudios primarios, estudios secundarios, y estudios universitarios.
- **Nivel de ingresos:** Hasta 999€ mensuales, entre 1000 y 1499€ mensuales, entre 1500 y 2499€ mensuales y más de 2500€ mensuales. Esta variable no se recogió en 1999, por lo que en los resultados desagregados por nivel de ingresos no aparece este año.
- **Clase social:** Se calculó la clase social del entrevistado en función de su ocupación, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994. De esta clasificación resultó la siguiente codificación de la variable:
 - Clases sociales I y II: Directivos, profesiones asociadas a estudios universitarios, artistas y deportistas.

- Clase social III: Empleados de tipo administrativo, profesionales de apoyo a la gestión, trabajadores de los servicios personales y de seguridad, trabajadores por cuenta propia, supervisores de trabajadores manuales.
- Clases sociales IVa, IVb, V y en situación de desempleo: trabajadores manuales cualificados y semi-cualificados, trabajadores no cualificados y personas desempleadas.