



Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD

LA SALUD EN ANDALUCÍA SEGÚN LAS ENCUESTAS ANDALUZAS DE SALUD (EAS): EAS-1999, EAS-2003 Y EAS-2007





Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD


La salud en Andalucía según las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS): EAS-1999, EAS-2003 y EAS-2007

José Juan Sánchez Cruz (Coordinador)
Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada)

Pablo Sánchez Villegas
Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada)

María Natividad Moya Garrido
Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada)

José María Mayoral Cortés
*Secretaría General de Salud Pública y Participación
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (Sevilla)*



Autores

José Juan Sánchez Cruz
Pablo Sánchez Villegas
M^a Natividad Moya Garrido
José María Mayoral Cortés

Edita

Escuela Andaluza de Salud Pública

Cuesta del Observatorio, 4
Campus Universitario de Cartuja.
Apdo. de Correos 2070
18080 Granada, España
Telf: (+34) 958 027 400
FAX: (+34) 958 027 503

Diseño y maquetación

Mailing Andalucía, S.A.

Depósito Legal

GR 3834-2010

ISBN

978-84-693-6457-4

Todos los derechos reservados. De las opiniones expresadas en la presente publicación responden únicamente los autores. Los autores del presente documento declaran no tener ningún tipo de conflicto de interés que pueda afectar al contenido de la publicación.

Financiado por la Secretaría General de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Esta monografía puede citarse como: Sánchez Cruz JJ, Sánchez Villegas P, Moya Garrido MN, Mayoral Cortés JM. La salud en Andalucía según las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS): EAS-1999, EAS-2003 y EAS-2007. [CD-ROM]. 1era ed. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2010.

El documento puede ser reproducido total o parcialmente, por cualquier medio, siempre que se cite explícitamente su procedencia.

PRESENTACIÓN

La publicación que usted tiene en sus manos contiene información sobre el estado de salud y el uso de servicios sanitarios de la población residente en Andalucía, así como sobre su evolución en la última década. Dicha información procede de las tres encuestas andaluzas de salud (EAS) que se han realizado en nuestra Comunidad Autónoma: en 1999, 2003 y 2007, dirigidas por la Escuela Andaluza de Salud Pública y financiadas por la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Debido a la gran cantidad de información contenida en cada una de las mencionadas encuestas, se ha seleccionado aquella considerada más relevante. Quedan, en todo caso, a disposición de los profesionales sanitarios y de la comunidad investigadora las bases de datos correspondientes para quienes deseen indagar, de forma más profunda y pormenorizada, en algunas de los aspectos incluidos en las mismas.

A modo de resumen, puedo avanzarles que, a pesar de que no se han producido grandes cambios en la percepción que la población andaluza tiene sobre su estado de salud, sí que se observa una mejora general en la salud de la ciudadanía, reflejada a través de muchos de los indicadores recogidos. Por citarles sólo alguno de ellos, destacaría el descenso en el porcentaje de hombres y mujeres con escasos recursos afectivos, la disminución de personas que padecen algún tipo de dolor que les dificulta realizar con normalidad sus trabajos habituales, o el porcentaje de personas mayores de 65 años que presentan alguna dificultad para realizar las actividades de la vida diaria.

Por otro lado, sin embargo, no puedo dejar de mostrarles mi preocupación por ciertos resultados puestos en evidencia en estos estudios, como son el inicio en el consumo del alcohol y tabaco en edades cada vez más tempranas o el aumento de la obesidad y sobrepeso entre la ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma.

En la mayoría de los ocasiones, hemos podido constatar la influencia que las características geográficas, culturales y socioeconómicas ejercen en el hecho de que una persona disfrute de una mejor o peor calidad de vida.

Por último, no quiero dejar de agradecer el trabajo de las y los profesionales que han realizado estas investigaciones y la inestimable colaboración de cada uno de los andaluces y andaluzas que, al colaborar en el estudio y responder a los cuestionarios, han permitido disponer de la información que les presento y que, sin duda alguna, ayudará a mejorar nuestro sistema sanitario y la salud de todas las personas que viven en Andalucía.

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía



INDICE DE CONTENIDOS

Página

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	5
METODOLOGÍA	9
RESULTADOS.....	13
RESUMEN DE RESULTADOS	15
NIVEL DE SALUD	17
DETERMINANTES DE SALUD	19
PRÁCTICAS PREVENTIVAS	20
MEDIO AMBIENTE.....	21
SERVICIOS SANITARIOS	22
RESULTADOS DESAGREGADOS	23
BLOQUE I: NIVEL DE SALUD.....	25
BLOQUE II: DETERMINANTES DE LA SALUD	99
BLOQUE III: PRÁCTICAS PREVENTIVAS.....	151
BLOQUE IV: MEDIO AMBIENTE	197
BLOQUE V: SERVICIOS SANITARIOS.....	251
BIBLIOGRAFÍA.....	297
ANEXO I: DEFINICIÓN DE VARIABLES	303
ANEXO II: CUESTIONARIO DE LA EAS-07	309



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este documento contiene un informe descriptivo de un conjunto de variables seleccionadas de los cuestionarios de adultos de las tres encuestas andaluzas de salud (EAS) realizadas hasta el momento: la de 1999 (EAS-1999), 2003 (EAS-2003) y 2007 (EAS-2007). Su objetivo es, pues, describir, de forma básica, los principales aspectos o dimensiones concernientes al estado de salud y a la utilización de los servicios sanitarios de la población adulta (mayor de 16 años de edad) residente en Andalucía, a partir de los datos procedentes de las tres encuestas mencionadas, y compararlos gráficamente, cuando sea posible, a través de su evolución en el tiempo, desde 1999 hasta 2007. El lector debe ser consciente de que el análisis estadístico es meramente descriptivo, con el único propósito de ofrecer una primera y elemental aproximación a la información derivada de estos instrumentos de medida, pero que, para finalidades de estimación o comparación estadística, deberá acudir a las técnicas inferenciales adecuadas (los intervalos de confianza, tests de hipótesis). Y, por supuesto, no olvidar que la verificación de hipótesis de investigación y de modelos de mayor complejidad requieren un tratamiento estadístico, y metodológico en general, adecuado para tal propósito.

La información se presenta atendiendo a cinco grandes bloques temáticos:

BLOQUE I:	Nivel de Salud
BLOQUE II:	Determinantes de Salud
BLOQUE III:	Prácticas Preventivas
BLOQUE IV:	Medio Ambiente
BLOQUE V:	Servicios Sanitarios

La visión global del estado de salud de la población andaluza y de determinados aspectos de los servicios sanitarios que ofrece este documento puede ser un buen punto de partida para futuras investigaciones sobre temas más concretos.



METODOLOGÍA





METODOLOGÍA

Población objeto de estudio

La población de estudio está conformada por las personas mayores de 16 años de edad residentes en Andalucía en los años 1.999, 2.003 y 2.007.

Tipo de muestreo y unidades muestrales

Para cada una de las ediciones de la EAS, el tipo de muestreo utilizado ha sido el muestreo probabilístico, por conglomerados, polietápico y estratificado. Las unidades muestrales fueron:

1ª etapa:	Municipios
2ª etapa:	Secciones censales
3ª etapa:	Viviendas familiares/hogares
4ª etapa:	Individuos

Estratificación y afijación muestral

La Encuesta ha utilizado dos criterios básicos de estratificación, atendiendo al área geográfica: la provincia y el tamaño del hábitat de residencia. De esta forma, la provincia da lugar a 8 estratos. Respecto al hábitat, resultan cinco estratos:

Estrato 1.	Capitales de provincia.
Estrato 2.	Otros municipios con más de 50.000 habitantes.
Estrato 3.	Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes.
Estrato 4.	Municipios de 2.001 a 10.000 habitantes.
Estrato 5.	Municipios de hasta 2.000 habitantes.

La afijación muestral por cada estrato resultante del cruce de hábitat y provincia se ha llevado a cabo de forma proporcional a la población existente en los mismos.

Tamaño muestral

Para un nivel de confianza del 95%, un porcentaje poblacional esperado del 50% ($P=Q$), un error muestral para estimaciones globales de $\pm 1,413$, un efecto de diseño de 1.35, se prefijó un tamaño muestral de 6.496 personas para cada una de las EAS. Tras el trabajo de campo, estas muestras terminaron siendo de 6.484, 6.708 y 6.511 individuos para las EAS99, EAS03 y EAS07, respectivamente.

Análisis de los datos


Para el caso de variables cualitativas se hicieron distribuciones de frecuencias y para el caso de variables cuantitativas se calcularon los valores medios.


Esta información se representó de manera gráfica para comparar los indicadores seleccionados en los años de realización de las tres encuestas (EAS).

Los resultados para cada variable estudiada dentro de cada bloque de información se desagregaron, además, por las variables sexo, edad, provincia, nivel de estudios, nivel de ingresos familiares y clase social.

RESULTADOS







RESULTADOS

- > Resumen de resultados
- Resultados desagregados



NIVEL DE SALUD

De la comparación de las tres encuestas andaluzas de salud (1999, 2003 y 2007) se desprende que:

- La percepción de salud de la población andaluza se mantiene estable en los últimos 9 años (desde 1999 hasta 2007).
- Las mujeres declaran peor salud percibida que los hombres en todo el periodo de estudio.
- La puntuación física de la escala SF-12 se mantuvo estable (alrededor de 51 puntos) en estos años. La puntuación mental de la escala SF-12 sufre una subida de tres puntos desde 1999 hasta 2007, tanto en hombres como en mujeres.
- Existe un descenso en la prevalencia de dolor que dificulta el trabajo habitual: pasa de un 8,2% en 1999 a un 4,4% en 2007. También desciende la prevalencia de problemas que dificultan las actividades sociales: baja ésta de un 6,3% en 1999 a un 3,9% en 2007.
- En cuanto a las enfermedades crónicas, aumentan de manera global la hipertensión, los problemas de nervios y las varices en las piernas, mientras que descienden las alergias y la artrosis o reumatismo. Por lo general, las mujeres presentan mayores prevalencias para casi todas las enfermedades estudiadas que los hombres. A medida que aumenta la edad se aprecia una mayor presencia de enfermedad. Se observan también prevalencias más altas para casi todas las enfermedades en los grupos de menos estudios, menores ingresos y menor clase social.
- En general, desciende casi a la mitad el porcentaje de personas con algún tipo de limitación física: desde un 5,2% en 1999 a un 2,6% en 2007.
- El porcentaje de personas entrevistadas con limitación sensorial también presentan una tendencia descendente: pasa de un 1,3% en 1999 a un 0,8% en 2007.
- No se observa un patrón temporal claro para la prevalencia de limitaciones de tipo psíquico: ésta es en el año 2007 del 0,3%.

- El porcentaje de hogares con algún miembro que padezca limitaciones de tipo físico, sensorial o psíquico ha descendido desde 1999.
- El porcentaje de personas mayores de 65 años que presentan algún tipo de dificultad para la realización de actividades instrumentales de la vida diaria descendió aproximadamente un 2% desde 2003: disminuye del 32,7% en 2003 a un 30,1% en 2007.
- Puede observarse un descenso considerable (de 19,8% en 2003 a 12,2 % en 2007) en el porcentaje de mayores de 65 años que presentan alguna dificultad para las actividades básicas de la vida diaria.
- El porcentaje de personas que sufrieron algún accidente durante los tres meses anteriores a la entrevista fue del 2,3% en 1999 y del 3,2% en 2007.

DETERMINANTES DE SALUD

De la comparación de las tres encuestas andaluzas de salud (1999, 2003 y 2007) se desprende que:

- La prevalencia de consumo de alcohol al menos una vez al mes permanece estable en torno al 40%.
- Desciende la edad de inicio de consumo de alcohol: pasa de los 18,3 años en media en 1999 a los 17,4 años en 2007.
- La prevalencia de consumo diario de tabaco se mantiene estable en el 31% en el periodo estudiado, desde 1999 a 2007.
- Existe un ligero descenso en la edad de inicio del hábito tabáquico: pasa de una edad media de 17,1 años en 1999 a 16,7 en 2007.
- En general, se observa un descenso del número de personas fumadoras que alguna vez intentaron dejar de fumar. En 1999, un 38,5% de las personas que fumaban declararon haber intentado dejarlo en alguna ocasión, mientras que en 2007 este porcentaje descendió hasta el 31,7%.
- El 83% de la población consume lácteos o derivados al menos tres veces por semana. Este porcentaje es de alrededor del 80% y menor del 70% con respecto al consumo de fruta fresca y verduras, respectivamente.
- En general, la prevalencia de obesidad más sobrepeso aumentó un 5% desde 1999. Dicho aumento es más pronunciado en mujeres que en hombres.
- La prevalencia de sedentarismo en el trabajo permanece estable alrededor del 85% en el periodo de tiempo estudiado. Por otra parte, descende el sedentarismo durante el tiempo libre. En el año 1999 éste supuso un 53,7% de las personas entrevistadas, mientras que en 2007 se redujo al 43,1%.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

De la comparación de las tres encuestas andaluzas de salud (1999, 2003 y 2007) se desprende que:

- La proporción de personas que se vacunaron contra la gripe el año de la entrevista es muy parecido en 1999 y 2007 (entre el 14% y el 15%), mientras que en 2003 esta proporción superó el 17%.
- El porcentaje de personas entrevistadas que declaran que ni ellas ni sus parejas utilizan ningún tipo de método anticonceptivo permanece estable entre 2003 y 2007 alrededor del 55%.
- El porcentaje de mujeres que en alguna ocasión ha acudido al ginecólogo ha aumentado, pasando de un 68,3% en 1999 a un 78,7% en 2007.
- Casi el 40% de las mujeres declararon en 2007 haberse hecho alguna vez una mamografía.
- Más del 50% de las mujeres entrevistadas en 2007 declararon haberse hecho alguna vez una citología vaginal.
- El 11% de las personas se expusieron siempre o casi siempre al sol entre las 12 y las 5 de la tarde (durante el verano anterior a la entrevista).
- El porcentaje de personas que acudieron a una consulta dental en los 6 meses anteriores a la entrevista ha aumentado con el tiempo: estos porcentajes son del 21,7%, 25,2% y 28,2% en 1999, 2003 y 2007 respectivamente.
- Existe un claro aumento entre 1999 y 2007 del uso del casco cuando se viaja en motocicleta, tanto por ciudad como por carretera.
- En cuanto al uso del cinturón de seguridad, tanto en ciudad como en carretera, también se refleja un aumento del porcentaje de personas que siempre los usan: del 60,8% en 1999 al 82,8% en 2007 en ciudad, y del 91,3% en 1999 al 97,5% en 2007 en carretera.
- Al igual que con el uso del casco y del cinturón, se observa un claro aumento en el uso de asientos especiales para menores: se incrementa desde un 63,2% de entrevistados que siempre lo usaban en 1999 a un 93,4% en 2007.
- El porcentaje de personas fumadoras a las que el médico o médica les recomendó dejar de fumar ha descendido en el periodo estudiado. De un 28,5% en 1999 se ha pasado a un 19,3% en 2007.

MEDIO AMBIENTE


De la comparación de las tres encuestas andaluzas de salud (1999, 2003 y 2007) se desprende que:

- El 89% de la población andaluza vive en una vivienda de propiedad y el 10% de alquiler. Estos porcentajes permanecen casi inalterados en el periodo de tiempo estudiado.
- El número de habitaciones de la vivienda donde residen las personas entrevistadas en 2007 es de 3,1 de media.
- El 11,3% declara que en el trabajo alguien fuma habitualmente y que le llega el humo.
- El 30,4% de las personas entrevistadas declara se fumadora pasiva en su hogar.
- El 24,2% de las personas entrevistadas pasa más de una hora en media en ambientes cargados de humo los días laborables (fuera de casa y del trabajo).
- Durante los días del fin de semana, casi el 50% de las personas entrevistadas pasa más de una hora en ambientes cargados de humo del tabaco.
- El porcentaje de trabajadores y trabajadoras expuestos a respirar vapores, humos u otras sustancias peligrosas bajó en 2007 (11,8%) respecto a 1999 y 2003 (14,4% y 14,7%, respectivamente).
- Alrededor del 8% de la población trabajadora está expuesta en el trabajo a manejar productos peligrosos. Este porcentaje apenas ha variado en el periodo de tiempo estudiado.
- En 2003 y en 2007 en torno al 35% de las personas trabajadoras estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas/fatigantes en el trabajo. Este porcentaje ha subido respecto a 1999, cuando era del 23,2%.
- La satisfacción media con el trabajo muestra una ligera tendencia al alza en 2007 respecto a 2003: pasa de 5,38 a 5,6, en una escala de 1 a 7.
- En 2007, el 23,8% de la población trabajadora creía que el trabajo les afecta negativamente en su salud. Este indicador experimenta un ligero descenso respecto a 2003.
- Considerando la serie completa (1999 a 2007) disminuyen las personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE): se reduce desde un 14,2% a un 7,3%

SERVICIOS SANITARIOS

De la comparación de las tres encuestas andaluzas de salud (1999, 2003 y 2007) se desprende que:


- El porcentaje de personas que declararon haber consultado al personal de medicina en las últimas dos semanas pasó del 22% en 1999 al 26% en 2007.
- Los lugares donde más frecuentemente se asistió a una consulta médica fueron los Centros de Salud / Consultorios. El porcentaje de personas que consultó en estos centros al médico/a aumentó, desde un 57,5% en 1999 a un 71,4% en 2007.
- Los motivos más frecuentes para consultar a un/a profesional de la medicina fueron en todo el periodo estudiado Diagnóstico y Tratamiento, Revisión y Expedición de recetas, lo que supone en su conjunto más del 85% de las visitas en los tres años estudiados. El principal motivo de visita, que es Diagnóstico y Tratamiento, disminuyó su frecuencia, desde el 56% en 1999 al 45,3% en 2007.
- En 2007 el 80% de las personas que realizaron una visita médica lo hicieron a la consulta de medicina general. Este porcentaje apenas ha variado respecto a los años 1999 y 2003.
- El porcentaje de personas que permanecieron ingresadas el año anterior a la entrevista descendió en algo más del 2%, desde un 8,1% en 1999 a un 5,8% en 2007.
- En torno al 20% de las personas entrevistadas utilizaron algún servicio de urgencias durante el año anterior a la entrevista. No se observan diferencias entre las tres ediciones de la EAS.
- A lo largo del periodo de tiempo estudiado, en torno al 95% de los servicios de urgencias utilizados fueron servicios públicos.
- Entre las personas que acudieron al dentista, el 82,9% fueron a una consulta de odontología privada en 1999. Este porcentaje ascendió hasta el 91% en 2007.
- La prevalencia de consumo de algún tipo de medicamento permanece estable entre 1999 y 2007. Alrededor del 50% de las personas entrevistadas toman algún tipo de medicamento.
- No existen diferencias en el periodo de tiempo estudiado con respecto a el porcentaje de personas



RESULTADOS

**Resumen de resultados
> Resultados desagregados**





**BLOQUE I:
NIVEL DE SALUD**



BLOQUE I: NIVEL DE SALUD

- **Salud general**
 - Percepción de mala salud
 - Puntuación física de la escala SF-12
 - Puntuación mental de la escala SF-12
- **Limitación de las actividades cotidianas**
 - Dolor que dificulta el trabajo habitual
 - Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales
- **Enfermedades crónicas**
 - Artrosis o reumatismo
 - Colesterol
 - Diabetes
 - Hipertensión
 - Problemas de nervios
 - Problemas cardíacos
 - Varices en las piernas
- **Limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas**
 - Limitaciones físicas
 - Limitaciones sensoriales
 - Limitaciones psíquicas
 - Hogares con personas con alguna limitación física, sensorial o psíquica
- **Autonomía personal:**
 - Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental
 - Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico
- **Accidentes en los últimos tres meses**
 - Prevalencia de accidentes en los últimos tres meses
 - Lugar del accidente



RESUMEN DEL BLOQUE I: NIVEL DE SALUD

- La percepción de mala salud permanece estable en el periodo de estudio, con una frecuencia de alrededor del 4%.
- La puntuación física de la escala SF-12 se mantuvo estable en torno a 51 en los últimos 8 años.
- La puntuación mental de la escala SF-12 sufre una subida de tres puntos desde 1999 hasta 2007.
- Existe un descenso generalizado en la prevalencia de dolor que dificulta el trabajo habitual: un 8,2% en 1999 y un 4,4% en 2007.
- Desciende de manera generalizada la prevalencia de problemas que dificultan las actividades sociales: desde el 6,3% en 1999 al 3,9% en 2007.
- En cuanto a las enfermedades crónicas, aumentan de manera global la hipertensión, los problemas de nervios y las varices en las piernas, mientras que descienden las alergias y la artrosis o reumatismo. Por lo general, las mujeres presentan mayores prevalencias para casi todas las enfermedades estudiadas que los hombres. A medida que aumenta la edad se aprecia una mayor presencia de enfermedad. Se observan también prevalencias más altas para casi todas las enfermedades en los grupos de menos estudios, menores ingresos y menor clase social.
- En general, desciende a la mitad el porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física, desde un 5,2% en 1999 a un 2,6% en 2007.
- El porcentaje de personas que presentan limitación sensorial también desciende, desde el 1,3% en 1999 al 1,8% en 2007.
- No se observa un patrón temporal claro para la prevalencia de limitaciones de tipo psíquico. En 2007 ésta fue del 0,3%.
- El porcentaje de hogares con algún miembro que padezca limitaciones de tipo físico, sensorial o psíquico ha descendido desde 1999.
- El porcentaje de personas mayores de 65 años que presentan algún tipo de dificultad para la realización de actividades de la vida diaria (instrumentales), descendió aproximadamente un 2% desde 2003: un 32,7% en 2003 y un 30,1% en 2007.

- Puede observarse un descenso considerable (de 19,8% en 2003 a 12,2 % en 2007) en el porcentaje de mayores de 65 años que presentan alguna dificultad para las actividades básicas de la vida diaria.
- El porcentaje de personas que sufrieron algún accidente durante los tres meses anteriores a la entrevista ha sufrido un ligero aumento: el 2,3% en 1999 y el 3,2% en 2007.
- Entre las personas que sufrieron algún accidente durante los tres meses anteriores a la fecha de en la que se les realizó la encuesta, se observan algunas diferencias desde 1999 respecto a los lugares en los que éstos tuvieron lugar. Los accidentes producidos en el domicilio disminuyeron de 30,7% en 1999 a un 24,9% en 2007, mientras que los ocurridos en el centro de trabajo y los accidentes de tráfico aumentaron ligeramente (alrededor de un 6% desde 1999).

Salud general: Percepción de mala salud

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2.007 el 4,1% de la población residente en Andalucía declaró tener una mala o muy mala percepción de su salud. La proporción de personas que valoraban negativamente su estado de salud en el caso de las mujeres era mayor que en el de los hombres (5,7% y 2,5% respectivamente).

Por otro lado, se observa que cuanto más desfavorecido es el perfil socioeconómico de una persona peor percibe su salud general, de tal manera que a mayor edad, menor niveles de estudios, renta familiar y clase social inferior, peor es el estado de salud percibido. Así, por ejemplo, en el año 2.007 las personas que pertenecían a la clase social más baja declaraban tener una mala percepción de salud casi dos veces más frecuentemente (4,1%) que las clases sociales más altas (2,1%).


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En relación a años anteriores, no parece haber grandes diferencias a nivel global, aunque en el caso de los varones si que se observa una disminución en la prevalencia de mala salud.

En lo concerniente al análisis por áreas geográficas, se observa que mientras que en los años 1.999 y 2.003 eran Almería (7,1% y 6,7%) y Granada (6,2% y 7,6%) las provincias con peores cifras de salud autopercebida, en el año 2.007 son Huelva (6,5%) y Jaén (5,6%) las zonas en las que la percepción de tener mala salud es más alta.


Por último, el análisis en función de los ingresos económicos señala un mayor incremento en la percepción de mala salud en el año 2007 con respecto a las cifras del año 2.003 para el caso de las personas que perciben menos de 1.500€ mensuales.

Figura 1. Prevalencia de mala salud percibida por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 2. Prevalencia de mala salud percibida por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 3. Prevalencia de mala salud percibida por provincia. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 4. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 5. Prevalencia de mala salud percibida por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 6. Prevalencia de mala salud percibida por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Salud general: Puntuación física de la escala SF-12

Para medir la dimensión física de la salud general de la población, se utilizó el cuestionario SF-12, con el que las personas entrevistadas contestaron a una serie de preguntas relacionadas con su estado de salud. Una vez codificadas todas las respuestas aportadas, los valores se trasladaron a una escala de 0 a 100, en la que valores mayores indican mejores resultados de salud.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007, la puntuación física de la escala SF-12 para la población andaluza fue de 51,5: peor la salud física de las mujeres (50,4) que la de los hombres (52,7).

Conforme aumenta la edad se observa una disminución en el componente físico de la escala del SF-12. El grupo más joven presentó una puntuación media de 55,3, mientras que en el grupo de mayor edad esta puntuación fue de 39,8 (lo que indica un peor estado de salud físico).


Los datos desagregados en función de la situación socioeconómica indica que son las personas con menor formación académica, menores ingresos mensuales y pertenecientes a las clases sociales más desfavorecidas las que presentan menores puntuaciones y, por tanto, peor salud física percibida.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa unos valores medios similares del estado de salud físico: se pasa de una puntuación media de 52,2 en el año 1999 al 51,5 en el año 2007. Durante todo el periodo estudiado los varones tuvieron mejor estado de salud física que las mujeres: esta diferencia por género se mantiene constante alrededor de dos puntos en todos los años estudiados.


Las diferencias entre provincias y años son prácticamente imperceptibles.

Figura 7. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 8. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por grupo de edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 9. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 10. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 11. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 12. Valores medios en la puntuación física para la escala SF-12 por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Salud general: Puntuación mental de la escala SF-12

Tal y como se comentó en el apartado anterior, la dimensión mental de la salud general de la población se midió a través de las preguntas realizadas a las personas entrevistadas correspondientes al cuestionario de salud SF-12. Los valores obtenidos se cuantificaron en un rango que va del 0 (el peor estado de salud) hasta 100 (el mejor estado de salud), lo que indica que cuanto mayor es la puntuación obtenida mejor es el estado de salud en la ciudadanía en la dimensión analizada.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el 2007 el valor medio en la escala de salud mental fue de 51,7 puntos para el total de la población. Estos valores fueron superiores, mejores, para los hombres (52,6) que para las mujeres (50,8).

Se observa una mejor salud mental entre las personas más jóvenes, con mayor nivel de estudios, con ingresos mensuales más altas y pertenecientes a clases sociales más favorecidas.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


En general la puntuación mental de la escala SF-12 experimenta una subida de tres puntos desde el año 1999 hasta el 2007. En todo el periodo los hombres presentan mayor puntuación que las mujeres y, por tanto, mejor salud mental.

Para todos los grupos de edad en el año 2007 se registraron mejores cifras en los niveles de salud mental que en año 1999, y siempre mejor salud mental entre las personas más jóvenes.

Por provincias, se observa en todas un aumento en las puntuaciones referidas a la salud mental con respecto al año 1999.


Con respecto al nivel de estudio, renta y clase social, apenas se observan cambios en los patrones comentados para el año 2007.

Figura 13. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 14. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 15. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 16. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 17. Valores medios en la puntuación mental para la escala SF-12 por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 18. Valores medios por clase social en la puntuación mental para la escala SF-12. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Limitación de las actividades cotidianas: Dolor que dificulta el trabajo habitual

El estudio de la limitación para el desarrollo normal de las actividades cotidianas se realizó preguntando a las personas encuestadas en las 4 semanas previas a la fecha de la encuesta por la existencia de algún dolor que les dificultara el trabajo habitual (que incluía el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas).

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 un 4,4% de las personas declararon haber tenido algún tipo de dolor que les dificultaba la realización de las actividades cotidianas: el 3,6% y el 5,1%, en hombres y mujeres, respectivamente.

Esta prevalencia fue menor en la población más joven y crece de manera progresiva con el aumento de la edad. Además, las personas socialmente menos favorecidas fueron las que más sufrieron este tipo de limitaciones: se presentan estas situaciones más frecuentemente entre la ciudadanía con un menor nivel de estudios, con menores rentas mensuales y de clases sociales más bajas.

En relación al estudio por provincias, los datos del 2007 señalan a Sevilla y Cádiz como las zonas más afectadas (5,9% y 5,8%), frente a Córdoba y Jaén donde se recogieron los porcentajes más bajos (1,7% y 2,4%).


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Tanto en hombres como en mujeres se ha producido un descenso generalizado en la prevalencia de dolor que dificulta el trabajo habitual, aunque en el caso de ellas esta disminución ha sido más acusada (del 11,2% en el 1999 al 5,1% en el año 2007 en mujeres, frente al 5,1% en 1999 y al 3,6% en 2007 en varones).

Con respecto a los otros parámetros analizados se observa el mismo patrón en las tres ediciones realizadas de la encuesta: en todos los casos es más frecuente la presencia de dolor limitante para la realización de actividades habituales en la población de mayor edad, con menor nivel de estudios, con rentas inferiores y pertenecientes a las clases sociales más bajas.


Por provincias, los mayores descensos de población afectada se produjeron en las provincias de Córdoba y Granada.

Figura 19. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 20. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 21. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 22. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 23. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 24. Prevalencia de personas que han padecido dolor que limitó el trabajo habitual por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Limitación de las actividades cotidianas: Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales

Además de la existencia de dolor que dificultó la realización del trabajo habitual, desarrollada en el apartado anterior, el estudio de la limitación para el desarrollo normal de las actividades cotidianas se completó analizando con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales de las personas entrevistadas habían dificultado sus actividades sociales durante las 4 semanas previas a la realización de la encuesta.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2.007 un 3,9% de las personas declararon haber tenido algún tipo de problema de salud físico o emocional que les dificultó la realización de las actividades sociales durante el mes anterior a la realización de la encuesta: el 3,1% en los hombres y el 4,7% en las mujeres.

Como en el caso de la dificultad de realizar el trabajo habitual por causa del dolor, la prevalencia de personas en las que algún problema de salud limitó sus relaciones sociales fue mayor en la población más adulta y en aquellas con menores niveles de estudios, con poder adquisitivo más bajo y en las clases sociales más bajas.

Por provincias, los datos del 2.007 muestran los mismos resultados en el caso de la presencia de dolor estudiada anteriormente, señalando a Cádiz y Sevilla (5,4% y 5,1%) como las zonas más afectadas, frente a Jaén y Córdoba donde se recogieron los porcentajes más bajos (0,9% y 1,6%).


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Tanto en hombres como en mujeres se ha producido un descenso en la prevalencia de personas con limitación para el desarrollo de la vida social por alguna causa física o emocional, siendo mayor el descenso en el caso de las mujeres (del 8,2% en el 1999 al 4,7% en el año 2007 en mujeres, frente al 4,5% en 1999 al 3,1% en 2007 en varones).

En los tres años estudiados fue más frecuente tener alguna dificultad para realizar actividades sociales debido a problemas físicos o emocionales en las personas de mayor edad, con menor nivel de estudios, con rentas inferiores y pertenecientes a las clases sociales más bajas.


Por provincias, los mayores descensos de población afectada se produjeron en las provincias de Almería y Córdoba.

Figura 25. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 26. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 27. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 28. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 29. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 30. Prevalencia de personas en las que los problemas de salud física o emocional dificultan las actividades sociales por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Enfermedades crónicas

La información relacionada con las presencia de enfermedades crónicas se obtuvo preguntándoles directamente a las personas entrevistadas si su médico o médica les había dicho que padecían alguno de los problemas crónicos que uno a uno se les fue mencionando.

De todos ellos en este documento se recoge únicamente el análisis de las patologías que resultaron ser más prevalentes: artrosis o reumatismo, colesterol, diabetes, hipertensión, problemas de nervios, problemas cardíacos y varices en extremidades inferiores.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 las enfermedades crónicas más prevalentes en la población andaluza fueron la alergia (8,1%), artrosis (12,6%), colesterol (9,2%), diabetes (6,4%), hipertensión (6,4%), problemas de nervios (10,4%), problemas cardíacos (4,3%) y varices en las piernas (13,3%). Todas ellas se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, salvo los problemas cardíacos, los cuales son más comunes en los hombres.

En general las patologías descritas las padecen con más frecuencia las personas con mayor edad, exceptuando las alergias, más frecuentes en personas jóvenes, y los problemas de nervios, que son más característicos en las personas de mediana edad.


En cuanto a las características sociodemográficas de la población, se observa que, salvo en el caso de las alergias, en las que no existen grandes diferencias por grupos, para el resto de enfermedades las personas más afectadas suelen ser las pertenecientes a los grupos socioeconómicos más desfavorecidos (menor nivel de estudios y de renta y clase social más baja).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa que tanto en hombres como en mujeres ha aumentado la prevalencia de enfermedades como colesterol, hipertensión, problemas de nervios y varices en las piernas. En el caso de los hombres, además de las señaladas, también se ha producido un aumento en la presencia de diabéticos, mientras que en el caso de las mujeres las cifras de diabéticas se han mantenido prácticamente estables a lo largo del tiempo. Por último, las enfermedades en las que se observa un descenso de personas afectadas con respecto a años anteriores son las alergias, artrosis o reumatismos y problemas cardíacos.


..... **Alergias crónicas**

Figura 31. Prevalencia de personas con alergia crónica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 32. Prevalencia de personas con alergia crónica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 33. Prevalencia de personas con alergia crónica por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 34. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 35. Prevalencia de personas con alergia crónica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.


Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 36. Prevalencia de personas con alergia crónica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.

Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Artrosis o reumatismo

Figura 37. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 38. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 39. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 40. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 41. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 42. Prevalencia de personas con artrosis o reumatismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Colesterol

Figura 43. Prevalencia de personas con colesterol alto por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 44. Prevalencia de personas con colesterol alto por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 45. Prevalencia de personas con colesterol alto por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 46. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 47. Prevalencia de personas con colesterol alto por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 48. Prevalencia de personas con colesterol alto por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Diabetes

Figura 49. Prevalencia de personas diabéticas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 50. Prevalencia de personas diabéticas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 51. Prevalencia de personas diabéticas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 52. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 53. Prevalencia de personas diabéticas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 54. Prevalencia de personas diabéticas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 57. Prevalencia de personas hipertensas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 58. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 59. Prevalencia de personas hipertensas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.


Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 60. Prevalencia de personas hipertensas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.

Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


..... **Problemas de nervios**

Figura 61. Prevalencia de personas con problemas de nervios por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 62. Prevalencia de personas con problemas de nervios por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 63. Prevalencia de personas con problemas de nervios por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 64. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 65. Prevalencia de personas con problemas de nervios por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 66. Prevalencia de personas con problemas de nervios por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Problemas cardiacos

Figura 67. Prevalencia de personas con problemas cardiacos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 68. Prevalencia de personas con problemas cardiacos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 69. Prevalencia de personas con problemas cardiacos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 70. Prevalencia de personas con problemas cardiacos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 71. Prevalencia de personas con problemas cardiacos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 72. Prevalencia de personas con problemas cardiacos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Varices en las piernas

Figura 73. Prevalencia de personas con varices en las piernas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 74. Prevalencia de personas con varices en las piernas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 75. Prevalencia de personas con varices en las piernas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 76. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 77. Prevalencia de personas con varices en las piernas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 78. Prevalencia de personas con varices en las piernas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas

El estudio de las limitaciones de la población residente en la Comunidad Autónoma se ha orientado tanto a las personas que tienen cualquier limitación física como aquellas en las que ésta es de tipo sensorial o psíquica. Además, se hace un análisis de los hogares andaluces en los que habita alguna persona con alguna de estas características.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 las limitaciones más frecuentes detectadas fueron las de tipo físico (2,6% de la población andaluza), mientras que las proporciones de personas con limitaciones sensoriales o psíquicas resultaron minoritarias (0,8% y 0,3% respectivamente). En los tres grupos estudiados, las prevalencias más altas de afectación aparecieron en los hombres.

En relación a la edad, estas patologías se presentan con mayor frecuencia en los grupos más longevos, aunque en el caso de las limitaciones psíquicas el número de personas afectadas no aumenta gradualmente con la edad.

Los grupos con menor nivel de estudios y menor nivel de renta son los más vulnerables. En el caso de la clase social no se identifica una tendencia clara: la clase inferior es la que presenta mayor prevalencia de personas con limitación física, mientras que los casos de limitaciones sensoriales aparecen con mayor frecuencia en las clase social intermedia (III) y las limitaciones psíquicas parecen afectar por igual a las clases sociales extremas.


Evolución desde Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa una disminución gradual en el porcentaje de personas con limitación física y sensorial, mientras que se mantienen prácticamente estables las cifras de limitaciones psíquicas.

En general se observa un importante descenso en la presencia de estas dolencias entre las personas de mayor edad. Con respecto al nivel económico, se observa un aumento en la proporción de personas con limitaciones físicas y sensoriales entre la población con rentas más bajas. Por último, la limitación física disminuye para todas las clases sociales, aumenta la limitación sensorial en la clase social intermedia (III) y disminuye ligeramente la limitación psíquica en este mismo grupo.


Limitaciones físicas

Figura 79. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 80. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 81. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 82. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 83. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 84. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación física por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


..... **Limitaciones sensoriales**

Figura 85. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación sensorial por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 86. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación sensorial por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 87. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación sensorial por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 88. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación sensorial por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 89. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación sensorial física por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 90. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación sensorial por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Limitaciones psíquicas

Figura 91. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 92. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 93. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 94. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 95. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 96. Porcentaje de personas entrevistadas con algún tipo de limitación psíquica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

••••• Hogares con personas con alguna limitación física, sensorial o psíquica

En el año 2007 era más frecuente la presencia en el hogar de una persona con limitación física (5,5%) que sensorial (1,6%) o psíquica (1%). En todos los casos, se observa un descenso desde el año 1999.

Figura 97. Porcentaje de hogares con algún miembro que padezca alguna limitación psíquica, física o sensorial. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Autonomía personal

El estudio de la autonomía personal de la población residente en Andalucía se realizó identificando la proporción de personas que tenían alguna dificultad para realizar actividades cotidianas tanto de tipo instrumental como básico. Para ello, a las personas entrevistadas se les preguntó si en ese momento su salud les limitaba para el desempeño de actividades que conllevaran esfuerzos físicos moderados u otras actividades cotidianas como, por ejemplo, subir un tramo de escaleras.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 las limitaciones más frecuentes que reducían la autonomía individual de las personas fueron las de tipo instrumental (el 30,1% de la población estudiada, frente al 12,2% que presentaron limitaciones de tipo básico). En ambos casos existe mayor limitación de la autonomía personal en el grupo de mujeres que en el de los hombres y, además, son más frecuente en la población de mayor edad.

Las personas con estudios secundarios, con rentas intermedias (entre 1.000 y 2.490 euros mensuales) y de clase social media (clase III) son las que declararon tener una mayor autonomía personal.

Por provincias, Jaén es donde se registraron mayores prevalencias de personas con dificultades para la realización de actividades de tipo instrumental (37,9%), mientras que los valores más altos de limitaciones para la realización de actividades básicas se recogieron en Sevilla (19,2%).


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa una disminución en el porcentaje de personas con limitación de la autonomía personal. Dicho descenso es más acusado en el caso de las personas que manifestaron tener dificultades para la realización de actividades básicas. En líneas generales se ha producido un descenso en todos los grupos de edad.

El análisis por nivel de estudios señala un aumento en el porcentaje de personas con estudios universitarios que manifestaron tener limitaciones para realizar actividades de tipo instrumental, mientras que la presencia de limitaciones para realizar actividades básicas disminuyó en todos los grupos.


••••• Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo instrumental

Figura 98. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 99. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 100. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 101. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 102. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 103. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo instrumental por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


••••• Dificultades en las actividades de la vida diaria de tipo básico

Figura 104. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 105. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 106. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 107. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 108. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 109. Porcentaje de personas que presentan alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria de tipo básico por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Accidentes en los últimos tres meses

En un primer momento, a todas las personas entrevistadas se les preguntó si, en los doce meses previos a la realización de la entrevista, tuvieron algún accidente que les causara heridas o lesiones suficientes que limitaran la actividad normal y/o que requiriesen asistencia sanitaria. Posteriormente, entre las personas que declararon haber sufrido este tipo de percance, se identificó cuál era la proporción que correspondía a accidentes en el último trimestre.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 3,2% de la población andaluza tuvo un accidente en los últimos tres meses: éstos fueron más frecuentes en los varones (3,7%) que en las mujeres (2,7%). Los grupos en los que se aprecia una mayor tasa de accidentes son los correspondientes a las edades extremas (el 5,1% en las personas mayores de 75 años y el 4,4% en los menores de 25 años), los de estudios secundarios (3,8%), los de ingresos entre 1.500€ a 2499€ mensuales y los de clase social más desfavorecida (3,6%).

Por áreas, Cádiz fue la provincia que tuvo una menor prevalencia de accidentes (1,7%), frente a Granada que alcanzó las cifras más altas (4,0%).


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un incremento en el porcentaje de personas que sufrieron algún tipo de accidente: aumenta desde el 2,3% en el año 1999 al 3,2% en el año 2007. Aunque se produjo en todos los grupos etáreos, este incremento es más notable tanto en las personas más jóvenes como en las de mayor edad.

El análisis por nivel de estudios señala un aumento de la frecuencia de accidentes para todos los grupos estudiados, mientras que el desglose por clase social refleja el incremento de los accidentes entre las personas pertenecientes a las clases sociales más desfavorecidas y la disminución de la misma en las clases sociales más altas.


En función del nivel de renta, los accidentes se mantienen más o menos estables, salvo en el caso de las personas con renta de entre 1500€ y 2499€ mensuales, en las que prácticamente se duplicó la prevalencia de accidentes en el periodo estudiado (2,8% en 2003 y 4,2% en 2007).

Figura 110. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 111. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 112. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 113. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 114. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 115. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente en los tres meses anteriores a la entrevista por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


••••• Accidentes en los últimos tres meses: Lugar del accidente

A las personas que sufrieron algún accidente durante los tres meses anteriores a la entrevista se les preguntó por el lugar en el que éste ocurrió. Si en los años 1999 y 2003 el mayor número de accidentes se producía en el hogar de la persona entrevistada, en el año 2007 pasa a ser el segundo lugar (24,88%), situándose por detrás de los accidentes de tráfico (26,79%). Desde 1999 se observa además un incremento de los accidentes de tráfico y de los accidentes producidos en el centro de trabajo.

Figura 116. Porcentaje de personas que sufrieron algún accidente de tráfico, en casa o en el centro de trabajo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.



**BLOQUE II:
DETERMINANTES DE LA SALUD**



BLOQUE II: DETERMINANTES DE LA SALUD

- **Consumo de alcohol:**
 - Frecuencia de consumo
 - Edad de inicio al consumo de alcohol
 - Sospecha de alcoholismo
- **Consumo de tabaco:**
 - Frecuencia de consumo
 - Edad de inicio al consumo de tabaco
 - Actitud ante el tabaquismo
- **Alimentación:**
 - Consumo de lácteos
 - Consumo de fruta fresca
 - Consumo de verduras
- **Peso corporal: Sobrepeso y obesidad**
- **Actividad física:**
 - Sedentarismo en el trabajo
 - Sedentarismo en el tiempo libre



RESUMEN DEL BLOQUE II: DETERMINANTES DE SALUD

- La prevalencia de consumo de alcohol al menos una vez al mes permanece estable en general en torno al 40%.
- Desciende la edad de inicio de consumo de alcohol, que pasa de los 18,3 años en media en 1999 a los 17,4 años en 2007.
- El porcentaje de sospecha de alcoholismo desciende en general, desde el 5% de 1999 hasta el 1,5% de 2007.
- La prevalencia de consumo diario de tabaco se mantiene estable en el 31% en el periodo estudiado, desde 1999 a 2007.
- La edad media de inicio al hábito tabáquico se mantiene en torno a los 17 años en el periodo estudiado.
- En general, se observa un descenso del número de fumadores/as que alguna vez intentaron dejar de fumar. En 1999, un 38,5% de los fumadores/as declararon haber intentado dejar de fumar en alguna ocasión, mientras que en 2007 este porcentaje descendió hasta el 31,7%.
- El 83% de la población consume lácteos o derivados al menos tres veces por semana. Este porcentaje es de alrededor del 80% y menor del 70% con respecto al consumo de fruta fresca y verduras, respectivamente.
- En general, la prevalencia de obesidad y sobrepeso aumentó un 5% desde 1999.
- La prevalencia de sedentarismo en el trabajo permanece estable alrededor del 85% en el periodo de tiempo estudiado. Por otra parte, desciende el sedentarismo durante el tiempo libre. En el año 1999 éste representó a un 53,7% de las personas entrevistadas, mientras que en 2007 el porcentaje fue del 43,1%.

Consumo de alcohol: Frecuencia de consumo

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 41,8% de la población andaluza manifestó consumir alcohol al menos una vez al mes: porcentaje doble de hombres (57,4%) que de mujeres (26,5%).

Por grupos, el consumo de alcohol es más frecuente entre las personas más jóvenes, donde se alcanza los mayores porcentajes en el rango de edad de 25 a 44 años (50,6%). Además de en los jóvenes, las prevalencias más altas de consumo de alcohol aparecen entre las personas con mayores niveles de estudios, con rentas mensuales más altas y de clases sociales más favorecidas.


Por provincias, Jaén (55,2%), Granada (49,7%) y Sevilla (48,1%) son las áreas en las que se recogen mayores proporciones de personas que declaran que al menos una vez al mes beben alcohol.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

Desde 2003 se observa un aumento en el porcentaje de personas que beben alcohol al menos una vez al mes, siendo más pronunciados los incrementos en las mujeres que en los hombres. El periodo estudiado refleja una tendencia ascendente en las prevalencias de consumo de alcohol y afecta a todos los grupos de edad, a todas las clases sociales y a cualquiera de los niveles de estudios analizados.


En relación a las rentas percibidas, el consumo de alcohol disminuye en el grupo con menores ingresos y entre aquellas personas que ingresan entre 1500 y 2499 euros mensuales, mientras que en el resto de grupos es mayor la proporción de personas que manifiestan tomar algún tipo de bebida alcohólica al menos una vez al mes.

Figura 117. Prevalencia de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 118. Prevalencia de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 119. Prevalencia de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 120. Prevalencia de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 121. Prevalencia de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 122. Prevalencia de personas que consumen alcohol al menos una vez al mes por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consumo de alcohol: Edad de inicio al consumo de alcohol

Encuesta Andaluza de Salud de 2007


En el año 2007 la edad media de inicio al consumo de alcohol era de 17,1 años en los varones y de 18,1 años en las mujeres. El estudio por grupos etarios señala cómo cada vez más comienza a tomarse alcohol a

edades más tempranas. En relación a otros parámetros como el nivel de estudios, los ingresos económicos mensuales, la clase social o las diferentes provincias, la edad de inicio al consumo de alcohol muestra patrones bastantes similares entre los diferentes grupos poblacionales.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


Desde el año 1999 se ha venido produciendo un descenso en la edad de inicio al consumo de alcohol (18,3 años en media en el año 1999 y los 17,4 años en el 2007). Este descenso se ha producido por igual en todos los grupos de edad, niveles de renta, clases sociales, niveles de estudios y provincias.

Figura 123. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 124. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 125. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 126. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 127. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 128. Edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consumo de alcohol: Sospecha de alcoholismo

Una vez que se preguntó si la persona bebía alcohol de manera habitual, la edad de inicio a éste y la frecuencia y cantidades consumidas, se realizaron otra serie de preguntas relacionadas con la actitud ante el consumo de alcohol, pertenecientes al test CAGE. Se consideró sospecha de alcoholismo los casos en los que al menos una de las cuatro preguntas realizadas tenía respuesta afirmativa.

Encuesta Andaluza de Salud 2007

En el año 2007 un 2,4% de los hombres y un 0,6% de las mujeres eran sospechosos de alcoholismo. El perfil era el de personas jóvenes (entre 16 y 24 años), con altos ingresos mensuales (2500€ mensuales o superiores) y de clases sociales más bajas (clases IV, V y en desempleo). Por nivel de estudios, sin embargo, apenas existen diferencias relevantes por grupos.


En cuanto al análisis provincial, Almería (2,9%) y Sevilla (2,4%) son las zonas en las que se recogieron mayores frecuencias de personas sospechosas de alcoholismo.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde el año 1999 se observa un importante descenso en la prevalencia de personas con problemas de alcoholismo, decremento más acentuado en hombres (de un 8,2% en el año 1999 al 2,4% en el año 2007) que en mujeres (de un 1,8% en el año 1999 al 0,6% en el año 2007).


El descenso en la sospecha de alcoholismo se ha producido de manera análoga en todos los grupos de edad, niveles de renta, clases sociales, niveles de estudios y provincias.

Figura 129. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 130. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 131. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 132. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 133. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 134. Porcentaje de personas con sospecha de alcoholismo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consumo de tabaco: Frecuencia de consumo

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 casi un tercio (31,1%) de la población andaluza manifestó consumir tabaco a diario, porcentaje superior en hombres (39,4%) que en mujeres (23,1%).


En función de las características sociodemográficas, los mayores porcentajes de población fumadora se identifican con personas de 25 a 44 años (43%), con estudios secundarios (36,6%), con ingresos al mes de entre 1500€ y 2499€ y pertenecientes a las clases sociales más desfavorecidas o en situación de desempleo (39%).

Por áreas geográficas, Granada (33,8%) y Huelva (33,7%) son las zonas en las que se recogen mayores porcentajes de personas que fumadoras, aunque las diferencias entre las 8 provincias son pequeñas.


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 la prevalencia de consumo de tabaco diario se ha mantenido prácticamente estable, en torno al 31%.

El análisis por edad muestra un descenso en el porcentaje de personas fumadoras a partir de los 55 años en adelante. Asimismo, se observa una disminución del consumo de tabaco entre las personas con mayores niveles de estudios, de clases sociales más favorecidas (I y II) y con ingresos mensuales inferiores a los 2.500 euros.


Figura 135. Prevalencia de personas que fuman a diario por sexo. Andalucía. Años 1999; 2003 y 2007.

Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 136. Prevalencia de personas que fuman a diario por edad. Andalucía. Años 1999; 2003 y 2007.


Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 137. Prevalencia de personas que fuman a diario por provincias. Andalucía Años 1999; 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 138. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999; 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 139. Prevalencia de personas que fuman a diario por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999; 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 140. Prevalencia de personas que fuman a diario por clase social. Andalucía. Años 1999; 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consumo de tabaco: Edad de inicio al consumo de tabaco

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 la edad media de inicio del consumo de tabaco se situó en 16,3 años en los varones y de 17,4 años en las mujeres. El estudio por grupos etarios señala cómo cada vez más los jóvenes, hombres y mujeres, comienzan a fumar a edades más tempranas. Así, los menores de 24 años declaran haber empezado a fumar con unos 15,7 años, mientras que el grupo de entre 66 a 74 años lo hizo con 17,5 años de edad. Además, las personas que empiezan a fumar antes son las que tienen menor nivel de estudios y las pertenecientes a las clases sociales menos favorecidas.


Evolución desde la Encuesta de Salud de 1999

Desde el año 1999 se ha venido produciendo un ligero descenso en la edad de inicio del consumo de tabaco: pasa de los 17,1 años en media en el año 1999 a los 16,7 años en el 2007.

Este descenso se ha producido por igual en todos los grupos de edad, a excepción de las personas con 65 a 77 años, en las que la edad en la que se empezó a fumar aumentó desde los 16,5 años de media en 1999 a los 17,5 años en 2007.


También se observa que empiezan a fumar antes las personas que sólo tienen estudios primarios, los que perciben más de 1000 euros al mes y los de clases sociales medias y bajas.

Figura 141. Edad media de inicio al consumo de tabaco por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 142. Edad media de inicio al consumo de tabaco por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 143. Edad media de inicio al consumo de tabaco por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 144. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 145. Edad media de inicio al consumo de tabaco por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 146. Edad media de inicio al consumo de tabaco por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consumo de tabaco: Actitud ante el tabaquismo

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 31,7% de la población fumadora residente en Andalucía manifestó haber intentado dejar de fumar en alguna ocasión: este porcentaje es superior en mujeres (34,2%) que en hombres (30,2%).

El análisis por edades muestra que a medida que éstas aumentan es más común que los fumadores y fumadoras hayan intentado dejar de fumar alguna vez: los porcentajes máximos se alcanzan entre las personas de 65 a 74 años de edad (53,1%).

Por otro lado, las personas con estudios universitarios (34,9%), con rentas mensuales superiores a los 2500€ (40,7%) y pertenecientes a las clases sociales más altas (40%), se identifican como los grupos de personas fumadoras que más se han planteado dejar el consumo de tabaco.


Por áreas geográficas, Málaga (37,9%) es la provincia con mayor porcentaje de personas que intentan dejar de fumar y Almería (21,3%) la que menos.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

Desde 2003 se observa un descenso del número de fumadores, hombres y mujeres, que alguna vez intentaron dejar de fumar. En 1999, este porcentaje fue del 38,5% mientras que en 2007 disminuyó hasta el 31,7%.


Se observa, asimismo, una mayor disminución en la intención de dejar de fumar entre las personas más jóvenes, con menores niveles de estudios y pertenecientes a clases sociales menos favorecidas.

Figura 147. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 148. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 149. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 150. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 151. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 152. Porcentaje de personas fumadoras que alguna vez han intentado dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Alimentación

Para estudiar los hábitos alimenticios de las personas entrevistadas se les pidió que dijeran la frecuencia con la que consumían una serie de alimentos, recogidos en una tarjeta que la persona que realizaba la encuesta les mostraba. La información que a continuación se expone se refiere al porcentaje de personas que en el año 2007 declararon tomar lácteos, fruta fresca y verduras al menos tres veces por semana.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 93,6%, 78,9% y el 67% de la población residente en Andalucía manifestó consumir al menos tres veces a la semana productos lácteos, fruta fresca y verduras, respectivamente. Para los tres productos estudiados se observa un mayor porcentaje de consumo en el caso de las mujeres que en el de los hombres.


El perfil de personas que siguen los hábitos dietéticos señalados se ajusta al de personas de mayor edad, con estudios universitarios y de clases sociales más altas (I y II).

En cuanto al nivel de ingresos, mientras que el consumo de lácteos aumenta paralelamente al nivel adquisitivo, el consumo frecuente de fruta fresca y verdura es más habitual entre las personas con rentas inferiores.

Córdoba destaca como la provincia en la que mayor porcentaje de habitantes consumen lácteos (96,1%) y verduras (75,2%) con al menos una periodicidad de tres veces semanales, mientras que el consumo de fruta fresca es más frecuente entre la población residente en Granada (86,7%).


Consumo de lácteos

Figura 153. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 154. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 155. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 156. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 157. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 158. Porcentaje de personas que consumen lácteos al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.


Consumo de fruta fresca

Figura 159. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 160. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 161. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 162. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 163. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 164. Porcentaje de personas que consumen fruta fresca al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Consumo de verduras

Figura 165. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 166. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 167. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 168. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 169. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 170. Porcentaje de personas que consumen verdura al menos tres veces por semana por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Peso corporal: Sobrepeso y obesidad

A partir de los datos referidos por las personas entrevistadas sobre su altura y peso, se calculó el indicador del Índice de Masa Corporal, el cual posibilita identificar a las personas que tienen peso insuficiente, normal, sobrepeso u obesidad. Los datos que a continuación se presentan corresponden al conjunto de población identificado con sobrepeso y obesidad.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 53,5% de la población andaluza tenía un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad), mayor en hombres (59,8%) que en mujeres (47,3%).

Por grupos, los porcentajes de sobrepeso y obesidad son mayores en las personas de más edad, con menor nivel de estudios, con rentas familiares inferiores y en las clases sociales medias y bajas.


Huelva (58,9%) y Granada (57,3%) son las provincias en las que se registraron mayores porcentajes de personas con sobrepeso u obesidad.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa, tanto en hombres como en mujeres, un aumento en el porcentaje de personas con exceso de peso (48,9% en 1999 y 53,5% en 2007). Este incremento se refleja en todos los grupos de edad, niveles de estudios y clases sociales.


En función del nivel económico, la proporción de personas con sobrepeso u obesidad aumentó entre quienes tenían rentas inferiores a los 1.500 euros mensuales y disminuyó en los grupos con mayores ingresos de los mencionados.

Figura 171. Prevalencia de personas con índice de masa corporal superior al normopeso (sobrepeso más obesidad) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 172. Prevalencia de personas con índice de masa corporal superior al normopeso (sobrepeso más obesidad) por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 173. Prevalencia de personas con índice de masa corporal superior al normopeso (sobrepeso más obesidad) por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 174. Prevalencia de personas con índice de masa corporal superior al normopeso (sobrepeso más obesidad) por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 175. Prevalencia de personas con índice de masa corporal superior al normopeso (sobrepeso más obesidad) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 176. Prevalencia de personas con índice de masa corporal superior al normopeso (sobrepeso más obesidad) por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Actividad física

Para estudiar la actividad física de las personas entrevistadas se les pidió que dijeran qué tipo de ejercicio físico implicaba su trabajo o actividad habitual y cuál era el ejercicio que practicaban en el tiempo libre.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 83,3% de la población andaluza ejercía un trabajo sedentario, entendido éste como aquel que se realiza sentado o de pie sin realizar esfuerzos, siendo más frecuente este tipo de trabajos entre las mujeres (89,2%) que en los hombres (77,2%).

Durante el tiempo libre, el sedentarismo alcanzó el 43,1% de la población, mayor también entre las mujeres (45,5%) que entre los hombres (40,7%).

En el desempeño de la actividad habitual, los menores niveles de sedentarismo se dan entre la población de 45 a 54 años (76%), mientras que en el tiempo libre el grupo menor de 24 años es el más activo (32,8%).

Las personas con mayor nivel de estudios y clase social más alta son las que tienen menor sedentarismo durante su tiempo de ocio, mientras que las personas con rentas más pequeñas son las más sedentarias tanto en el trabajo como en el ámbito privado.


Cádiz es la provincia que presentó mayores porcentajes de sedentarismo en el tiempo de trabajo (87,4%) y Huelva en el tiempo de ocio (58,5%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

En general desde 1999 se observa un descenso en los niveles de sedentarismo tanto en el desempeño de las actividades diarias como en el tiempo personal. En el periodo estudiado este aumento de la actividad física ha sido superior en las mujeres que en los hombres.


En función de la edad, el sedentarismo disminuye en todos los grupos durante el tiempo libre y aumenta entre los grupos de edades extremas en lo que se refiere al desarrollo las actividades diarias.

Figura 179. Prevalencia de sedentarismo en el trabajo por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 180. Prevalencia de sedentarismo en el trabajo por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 181. Prevalencia de sedentarismo en el trabajo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 182. Prevalencia de sedentarismo en el trabajo por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 185. Prevalencia de sedentarismo en el tiempo libre por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 186. Prevalencia de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 187. Prevalencia de sedentarismo en el tiempo libre por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 188. Prevalencia de sedentarismo en el tiempo libre por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.





**BLOQUE III:
PRÁCTICAS PREVENTIVAS**



BLOQUE III: PRÁCTICAS PREVENTIVAS

- Vacunación ante la gripe
- Métodos anticonceptivos
- Visitas médicas de ginecología
- Mamografías
- Citologías
- Exposición solar
- Higiene bucodental: Visitas odontológicas
- Seguridad vial:
 - Uso del casco
 - Uso del cinturón de seguridad
 - Uso de asientos especiales para menores
- Consejo médico para dejar de fumar

RESUMEN DEL BLOQUE III: PRÁCTICAS PREVENTIVAS

- La proporción de personas que se vacunaron contra la gripe el año de la entrevista es muy parecido en 1999 y 2007 (entre el 14% y el 15%), mientras que en 2003 esta proporción superó el 17%.
- El porcentaje de entrevistados que declaran que ni ellos ni sus parejas utilizaban ningún tipo de método anticonceptivo permaneció estable entre 2003 y 2007 en alrededor del 55%.
- El porcentaje de mujeres que en alguna ocasión ha acudido a una consulta ginecológica ha aumentado: pasa de un 68,3% en 1999 a un 78,7% en 2007.
- Casi el 40% de las mujeres declararon en 2007 haberse hecho alguna vez una mamografía.
- Más del 50% de las mujeres entrevistadas en 2007 declararon haberse hecho alguna vez una citología vaginal.
- El 11% de las personas se expusieron siempre o casi siempre al sol entre las 12 y las 5 de la tarde (durante el verano anterior a la entrevista).
- El porcentaje de personas que acudieron a una consulta odontológica en los 6 meses anteriores a la entrevista aumentó con el tiempo: estos porcentajes fueron del 21,7%, 25,2% y 28,2% en 1999, 2003 y 2007, respectivamente.
- Existe un claro aumento entre 1999 y 2007 del uso del casco cuando se viaja en motocicleta, tanto por ciudad como por carretera.
- En cuanto al uso del cinturón de seguridad, tanto en ciudad como en carretera, también se refleja un aumento del porcentaje de personas que siempre los usan: del 60,8% en 1999 al 82,8% en 2007 en ciudad, y del 91,3% en 1999 al 97,5% en 2007 en carretera.
- Al igual que con el uso del casco y del cinturón, se observa un claro aumento en el uso de asientos especiales para menores. Pasamos de un 63,2% de entrevistados que siempre lo usaban en 1999 a un 93,4% en 2007.
- El porcentaje de fumadores/as a los que el médico o médica recomendó dejar de fumar ha descendido en el periodo estudiado desde un 28,5% en el año 1999 a un 19,3% en 2007.

Vacunación ante la gripe

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 14,3% de los hombres y el 15,5% de las mujeres declararon haberse vacunado contra la gripe en la última campaña, lo que supuso un 14,9% de la población residente en Andalucía. Los mayores porcentajes de vacunación se presentaron entre las personas de mayor edad (64,1%), con menores niveles de estudios (19,2%), con rentas mensuales más pequeñas (30,5%) y pertenecientes a las clases sociales medias (15,2%) y bajas (14,1%). Por provincias, Huelva (17,4%) y Córdoba (17,1%) fueron las zonas en las que tuvieron lugar mayores proporciones de vacunación.


Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 la proporción de personas que dijeron vacunarse contra la gripe sufrió un ligero ascenso (14,6%), aunque estos porcentajes de vacunación registrados en el 2007 (14,9%) no llegaron a alcanzar las cifras de la campaña del 2003 (17,3%).

En líneas generales se ha producido un descenso en la administración de la vacunación antigripal en todos los grupos de edad, salvo en el grupo de mayores de 75 años, en el que los porcentajes pasaron del 47,9% en el año 1999 al 64,1% en el año 2007.


El análisis por estatus socioeconómico indica un descenso en todos los grupos salvo en los más desfavorecidos en los que se incrementaron las proporciones de vacunación. Así, con respecto al año 1999, en el 2007 aumentó el porcentaje de personas con menores niveles de estudios, menores rentas mensuales y clases sociales más bajas que decidieron vacunarse.

Figura 189. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 190. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 191. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 192. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 193. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 194. Porcentaje de personas que se vacunaron contra la gripe en la última campaña por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Métodos anticonceptivos

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el porcentaje de personas que declararon que ni ellas ni sus parejas utilizaban ningún tipo de método anticonceptivo fue del 55,2% (51,0% en varones y 59,2% en mujeres). Las personas mayores prácticamente no usaban medidas profilácticas y entre las personas de menor edad estas medidas preventivas no se adoptan en 27,1% de los casos.

En cuanto al perfil socioeconómico de las personas que menos utilizan la profilaxis en sus relaciones sexuales, éste es el de personas con estudios primarios o inferiores, con rentas mensuales por debajo de los 1000 € y de clases sociales bajas o en desempleo.


Por provincias, Huelva (65,8%) y Sevilla (58,0%) son las áreas en las que menos se usan métodos anticonceptivos.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

El porcentaje de personas entrevistadas que declaran que ni ellas ni sus parejas utilizan ningún tipo de método anticonceptivo permanece prácticamente estable entre 2003 y 2007 (54,9% y 55,2%, respectivamente).


En cuanto a la edad, se produce un aumento en el uso de anticonceptivos entre las personas más jóvenes. Sin embargo, en los grupos con menor nivel de estudios, menores ingresos y de clases sociales desfavorecidas estas prácticas preventivas es aún menos frecuente que en el año 2003.

Figura 195. Porcentaje de personas que no usan ningún método anticonceptivo por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 196. Porcentaje de personas que no usan ningún método anticonceptivo por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 197. Porcentaje de personas que no usan ningún método anticonceptivo por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 198. Porcentaje de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 199. Porcentaje de personas que no usan ningún método anticonceptivo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 200. Porcentaje de personas que no usan ningún método anticonceptivo por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Visitas médicas de ginecología

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 78,7% de las mujeres de 16 años en adelante habían acudido en alguna ocasión a un ginecólogo: estos porcentajes fueron menores entre las mujeres pertenecientes a los grupos etarios extremos (42,7% en menores de 25 años y 57,2% en mujeres de 75 años en adelante).

Se observa un claro gradiente de mujeres que visitan al ginecólogo cuanto más favorecida es la situación socioeconómica de éstas (mayor nivel de estudios (87,4%), rentas más altas (86%) y clases social más acomodada (90,4%)).


Por provincias, las mujeres de Málaga (83,6%) y Cádiz (81,5%) fueron las que mayores proporciones de haberse realizado una revisión ginecológica registraron.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

El porcentaje de mujeres entrevistadas que manifestaron haber acudido a una consulta de ginecología en alguna ocasión aumentó en el periodo estudiado desde el 68,3% en el año 1999 al 78,7% en el 2007.


En todas las edades, niveles de estudios y clases sociales se ha producido un incremento de mujeres que fueron revisadas por los profesionales de la ginecología. Sin embargo, con respecto al nivel de ingresos, este aumento tan sólo tuvo lugar entre las mujeres de rentas más altas, produciéndose un descenso en el resto.

Figura 201. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 202. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 203. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 204. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 205. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 206. Porcentaje de mujeres que han acudido alguna vez al ginecólogo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Mamografías


Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 32,8% de las mujeres de 16 años en adelante se había realizado en alguna ocasión una mamografía: estos porcentajes son mayores entre las mujeres de 55 a 64 años (75,8%).

Las mujeres con menores ingresos (39,7%), de clases sociales más favorecidas (46,2%) y con estudios primarios o inferiores (42%) son las que manifiestan haberse realizado la prueba diagnóstica en mayor proporción.


Por provincias, las mujeres de Huelva (30,6%) fueron las que menor porcentaje registraron, frente al mayor porcentaje de las malagueñas (43,8%).

Figura 207. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 208. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 209. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 210. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 211. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una mamografía por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Citologías


Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 más de la mitad de las mujeres andaluzas (53,6%) de 16 años en adelante se había realizado en alguna ocasión una citología vaginal. El mayor porcentaje se dio entre las mujeres de 45 a 54 años (72,3%).

Las mujeres con mayores ingresos económicos (61,1%), de clases sociales más favorecidas (73,4%) y con estudios universitarios (68,5%) son las que manifestaron haberse realizado la prueba diagnóstica con mayor frecuencia.


Por provincias, las mujeres de Huelva (41,2%) fueron las que menores porcentajes registraron y los mayores en las de Málaga (63,8%).

Figura 212. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 213. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 214. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 215. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 216. Porcentaje de mujeres que alguna vez se han hecho una citología por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Exposición solar

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007, el 11% de la población residente en Andalucía (12,4% en hombres y 9,7% en mujeres) se expuso siempre o casi siempre al sol, durante la franja horaria de las 12 a las 5 de la tarde, en el verano anterior a la entrevista.


En función de la edad, la exposición al sol disminuyó desde un 19,4% en el grupo de menor edad hasta un 2,7% en el de mayor edad.

Con respecto al nivel de estudios, las personas menos expuestas fueron aquellas con estudio primarios o inferiores (10%).

Por otro lado, la exposición solar en las horas centrales del día fue más frecuente entre las personas con mayores ingresos familiares (15,9%) y en las clases sociales más altas (12,1%).


Sevilla (18,3%) aparece como la provincia en la que las personas entrevistadas estuvieron más expuestas al sol entre las 12 y las 5 de la tarde.

Figura 217. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 218. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 219. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 220. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 221. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 222. Porcentaje de personas que durante el verano anterior se expusieron siempre o casi siempre al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Higiene buco-dental: Visitas odontológicas

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007, el 31,4% de las mujeres y el 25,0% de los hombres habían acudido al dentista en los 6 meses anteriores a la entrevista: estas consultas fueron más frecuentes entre la población de menor edad (32,8%).


El análisis de datos muestra cómo a medida que aumenta el nivel de estudios, los ingresos familiares y la clase social aumenta el porcentaje de personas que acudieron al dentista.

Por áreas geográficas, Málaga (33,7%) y Cádiz (31,9%) fueron las provincias en las que se registraron mayores prevalencias de personas que se realizaron una revisión bucodental.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


Desde 1999 ascendió el porcentaje de personas que acudieron a la consulta de un profesional de odontología en los 6 meses previos a la realización de la entrevista. Estos incrementos se observan en todos los grupos con independencia de la edad, nivel de estudios, rentas familiares y clase social de pertenencia.

Figura 223. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 224. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 225. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 226. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 227. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 228. Porcentaje de personas que acudieron al dentista en los últimos 6 meses por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Seguridad vial

El estudio de la seguridad vial se realizó preguntando por la adopción de medidas como el uso casco (en el caso de haber ido en moto), cinturón de seguridad o asientos especiales para menores en los desplazamientos.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En 2007, el porcentaje de hombres que siempre usaron casco cuando viajaron en moto o motocicleta fue del 69% en ciudad y 90,5% en carretera, mientras que en mujeres fue del 67,3% y 85,3%, respectivamente.

En cuanto al uso del cinturón de seguridad, las mujeres dicen usar siempre el cinturón en ciudad un 8% más que los hombres. En carretera, tanto mujeres como hombres usan el cinturón siempre en más del 97% de los casos estudiados (97,1% en hombres y 97,9% en mujeres).

El uso de asientos especiales para menores fue un 6% más frecuente en las mujeres que en los hombres.

En líneas generales, el uso de medidas de seguridad vial se adopta con mayor frecuencia entre las personas con mayores niveles de estudios y clases sociales más altas.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


Desde 1999 se observa un mayor uso del casco, cinturón de seguridad y sillas adaptadas para menores.

En el caso de la conducción de motos y motocicletas el uso del casco fue en el año 1999 del 56,7% y 80,9%, en ciudad y carretera, respectivamente, frente al 68,4% y 88,9% registrados en el año 2007.

Con respecto al uso del cinturón de seguridad y de sillas, los porcentajes son del 60,8% en ciudad y del 91,3% en carretera en el 1999, y del 82,8% y 97,5% para los mismos conceptos en el año 2007.


El uso de sillas adaptadas para menores ha pasado del 63,2% al 93,4% en los años 1999 y 2007, respectivamente.

Figura 231. Porcentaje de personas que siempre utilizan casco cuando viajan en motocicleta por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 232. Porcentaje de personas que siempre utilizan casco cuando viajan en motocicleta por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 233. Porcentaje de personas que siempre utilizan casco cuando viajan en motocicleta por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 234. Porcentaje de personas que siempre utilizan casco cuando viajan en motocicleta por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 237. Porcentaje de personas que siempre utilizan cinturón de seguridad cuando viajan en coche por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 238. Porcentaje de personas que siempre utilizan cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 239. Porcentaje de personas que siempre utilizan cinturón de seguridad cuando viajan en coche por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 240. Porcentaje de personas que siempre utilizan cinturón de seguridad cuando viajan en coche por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 243. Porcentaje de personas que utilizan asientos especiales para menores por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 244. Porcentaje de personas que utilizan asientos especiales para menores por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 245. Porcentaje de personas que utilizan asientos especiales para menores por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 246. Porcentaje de personas que utilizan asientos especiales para menores por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consejo médico para dejar de fumar

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el porcentaje de personas fumadoras a las que su médico les aconsejó dejar de fumar fue del 19,4% (19,5% en varones y 19,2% en mujeres). Por grupos de edad, se observa que cuanto mayor era la edad de las persona fumadora mayor es la probabilidad de que los profesionales de la medicina les aconsejara el abandono de este hábito. Este consejo parece ser también más frecuente en aquellos colectivos de menor nivel de estudios (22,1%), con ingresos mensuales más pequeños (34,2%) y de clases sociales más altas (22%).


Por provincias, Sevilla (25,6%) y Cádiz (25%) fueron las provincias en las que la recomendación se ofreció con mayor frecuencia.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un descenso en el porcentaje de personas fumadoras a las que se les ha recomendado dejar de fumar (28,5% en 1999 y 19,4% en 2007).


Los pocos incrementos producidos se localizan entre las personas de mayor edad y en las de menores niveles de ingresos. Para el resto de grupos y variables socioeconómicas estudiadas la tendencia ha sido descendente.

Figura 247. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 248. Porcentaje de utilizan personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 249. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 250. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 251. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 252. Porcentaje de personas fumadoras que han recibido consejo médico para dejar de fumar por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.



**BLOQUE IV:
MEDIO AMBIENTE**



BLOQUE IV: MEDIO AMBIENTE

- **Características de la vivienda:**
 - Propiedad de la vivienda
 - Número de habitaciones de la vivienda
- **Exposición ambiental al tabaco:**
 - Personas fumadoras pasivas en el trabajo
 - Personas fumadoras pasivas en el hogar
 - Personas fumadoras pasivas fuera de casa y del trabajo entre semana
 - Personas fumadoras pasivas fuera de casa y del trabajo durante el fin de semana
- **Condiciones de trabajo:**
 - Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas
 - Exposición a sustancias y productos peligrosos
 - Exposición a posiciones fatigantes o dolorosas
 - Satisfacción con el trabajo
 - Percepción de afectación negativa del trabajo en la salud
- **Apoyo social:**
 - Apoyo confidencial
 - Recursos afectivos

RESUMEN DEL BLOQUE IV: PRÁCTICAS MEDIO AMBIENTE

- El 89% de la población andaluza vive en una vivienda de propiedad, y el 10% de alquiler. Estos porcentajes permanecen casi inalterados en el periodo de tiempo estudiado.
- El número de habitaciones en 2007 de la vivienda donde residen las personas entrevistadas es de 3,1 en media.
- El 11.3% de la población residente en Andalucía declara que en el trabajo alguien fuma habitualmente y que le llega el humo del tabaco.
- El 30,4% de las personas entrevistadas declara se fumador o fumadora pasiva en su hogar.
- El 24,2% de las personas entrevistadas pasa, en promedio, más de una hora en ambientes cargados de humo los días laborables (fuera de casa y del trabajo).
- Durante los días del fin de semana, casi el 50% de las personas entrevistadas pasa más de una hora en ambientes cargados de humo del tabaco.
- El porcentaje de personas trabajadoras expuestas a respirar vapores, humos u otras sustancias peligrosas bajó en 2007 (11,8%) respecto a 1999 y 2003 (14,4% y 14,7% respectivamente).
- Alrededor del 8% de los trabajadores, hombres y mujeres, están expuestos en el trabajo a manejar productos peligrosos. Este porcentaje apenas ha variado en el periodo de de tiempo estudiado.
- En 2003 y en 2007 en torno al 35% de la población trabajadora estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas/fatigantes en el trabajo: este porcentaje se incrementó respecto al año 1999, cuando era del 23,2%.
- La satisfacción media con el trabajo aumentó ligeramente en 2007 respecto a 2003: pasa de 5,38 a 5,6 en una escala de 1 a 7.
- En 2007, el 23,8% de la población trabajadora cree que el trabajo les afecta negativamente en su salud.
- Considerando la serie completa (1999 a 2007), disminuyen las personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE), desde un 14,2% a un 7,3%

Características de la vivienda: propiedad de la vivienda

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 casi nueve de cada diez personas (89,8% en mujeres y 88% en hombres) tenían una vivienda en propiedad, mientras que el porcentaje restante (9,3%) declararon vivir en régimen de alquiler. Esta última situación es más habitual entre la ciudadanía más joven (de 16 a 24 años), seguida del grupo de 25 a 44 años. En función del nivel de estudios de cada persona, se observa cómo, a medida que aumenta el nivel formativo de éstas, es menos frecuente tener una vivienda en propiedad y, precisamente, es entre las personas con más estudios en las que se presentan probabilidades más altas de vivir en una vivienda alquilada.


Por otro lado, cuando el nivel de ingresos es mayor, existe más probabilidad de tener una vivienda en propiedad. Así, el 93,9% de las personas que ingresan más de 2500€ mensuales reside en una vivienda propia, frente al 83,3% de quienes ingresan entre 1.000 y 1.499 euros. Este último grupo es el que vive más frecuentemente en alquiler (15,6%), seguido del que cobra menos de 1000€ al mes (13,8%).

En función de la clase social, las personas pertenecientes a clases medias (clase III) son las mayores propietarias (90,7%) y las de clases sociales más desfavorecidas y en desempleo son las que tienen más probabilidad de vivir en alquiler (12,1%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


En general, desde 1999 casi no se observan modificaciones en cuanto a los porcentajes de personas que residen en una vivienda propia. Mientras que en el grupo con menor nivel de estudios se ha producido un incremento de quienes tienen vivienda propia, entre aquellas personas que tienen estudios secundarios o superiores aumentó el hecho de vivir de alquiler. Sólo en el grupo de personas que cobran más de 2500 euros mensuales ha aumentado la frecuencia de tener vivienda en propiedad; en el resto el incremento se ha producido a la hora de vivir de alquiler.

Figura 253. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 254. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 255. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 256. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 257. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 258. Porcentaje de personas con vivienda en propiedad o alquiler por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Características de la vivienda: Número de habitaciones de la vivienda


Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007, 3,1 era el número medio de habitaciones que tenían las viviendas en las que residía la población andaluza. Las viviendas de mayores dimensiones se encontraban entre aquellas personas de mediana edad, con mayor nivel de estudios, con rentas más altas y de clases sociales más favorecidas.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


En general, desde 1999 se observa una tendencia a tener viviendas algo más pequeñas. En función del resto de variables estudiadas, en la mayoría de los casos apenas se aprecian diferencias a lo largo del periodo estudiado, y la tendencia es en todos los casos a disminuir ligeramente el número de habitaciones de las viviendas.

Figura 259. Número medio de habitaciones de la vivienda de residencia por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 260. Número medio de habitaciones de la vivienda de residencia por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 261. Número medio de habitaciones de la vivienda de residencia por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 262. Número medio de habitaciones de la vivienda de residencia por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 263. Número medio de habitaciones de la vivienda de residencia por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 264. Número medio de habitaciones de la vivienda de residencia por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Exposición ambiental al tabaco: Personas fumadoras pasivas en el trabajo y en el hogar

Para evaluar la exposición ambiental al tabaco en los ámbitos laboral y doméstico, a las personas entrevistadas se les preguntó si en el trabajo tenían algún compañero, hombre o mujer, que fumara habitualmente, de manera que le llegara el humo del tabaco, o si algún miembro de la familia fumaba habitualmente en casa.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

Según los datos del año 2007 puede decirse que en el ámbito laboral el 11,3% de la población residente en Andalucía (16,2% de hombres y 6,6% de mujeres) eran fumadoras pasivas, mientras que en el ámbito doméstico el porcentaje de personas que respiraban el humo del tabaco ascendió al 30,4% de la ciudadanía (26,7% en hombres y 34,1% en mujeres).

En cualquier caso, las personas de mayor edad son siempre las menos expuestas al humo del tabaco y los grupos en los que se identifican mayores proporciones de personas fumadoras pasivas son los de 25 a 44 años, cuando hablamos del ámbito laboral (16,4%), y los menores de 24 años si nos referimos a la exposición dentro del hogar (46,6%).

Por provincias Sevilla es la que presentó el porcentaje más alto de fumadores pasivos en el trabajo (20,9%), frente Córdoba, que con un 4,7% es el área que tuvo menor prevalencia. En el ámbito doméstico Almería con un 33,8% es donde se registra mayor porcentaje de fumadores pasivos en el hogar, frente a Huelva, que fue la zona con menor porcentaje (25,5%).


El análisis en función del nivel de estudios muestra que, en el trabajo, quienes mayor nivel de exposición tienen son las personas con estudios universitarios (12,7%), mientras que, en el hogar, las personas más expuestas son las que tienen estudios secundarios (35%).

En cuanto al poder adquisitivo, a medida que aumenta el nivel de ingresos familiares, también aumenta el porcentaje de personas fumadoras pasivas, tanto en el trabajo como en el hogar.

Por clase social los grupos más favorecidos son los más expuestos al humo del tabaco en el ámbito laboral (16,8%), mientras que en los hogares de clase social más desfavorecidos es donde más se fuma (32,5%).


••••• **Personas fumadoras pasivas en el trabajo**

Figura 265. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el trabajo por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 266. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el trabajo por edad. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 267. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el trabajo por provincias. Andalucía. Año 2007.

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 268. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el trabajo por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.


Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 269. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el trabajo por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 270. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el trabajo por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.


Personas fumadoras pasivas en el hogar

Figura 271. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 272. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 273. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 274. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 275. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 276. Porcentaje de personas fumadoras pasivas en el hogar por clase social. Andalucía. Año 2007.

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública.

Exposición ambiental al tabaco: Personas fumadoras pasivas fuera de casa y del trabajo entre semana y durante el fin de semana

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

El 24,2% de las personas entrevistadas pasa como media más de una hora en ambientes cargados de humo los días laborables (fuera de casa y del trabajo). Dicho porcentaje asciende hasta el 48,4% durante los días del fin de semana. Los hombres están más tiempo expuestos al humo del tabaco que las mujeres.

Independientemente del día de la semana, la exposición al humo del tabaco en entornos diferentes al laboral y doméstico disminuye con el aumento de la edad.


Cuando sólo consideramos el porcentaje total de personas expuestas al humo del tabaco (sin desagregar por tiempo de exposición), se observa que las personas con estudios secundarios son las que más frecuentemente están en contacto con el humo del tabaco, tanto entre semana como en sábado y domingo, y las que como máximo tienen estudios primarios son las menos expuestas.

Por otro lado, cuanto menores son los niveles de ingresos familiares, menor es la exposición al humo del tabaco fuera del trabajo o el hogar, en cualquiera de los días de la semana. Mientras que el análisis en función de la clase social identifica a la clase social más baja como la más expuesta al humo del tabaco en los días laborables, y a la clase social más alta como la más expuesta a ambientes cargados de humo en fin de semana.

Sevilla y Huelva son las provincias donde, en cualquiera de los días de la semana, es mayor la exposición al humo del tabaco durante periodos de más de cuatro horas diarias fuera del trabajo y del hogar.


Personas fumadoras pasivas fuera de casa y del trabajo entre semana

Figura 277. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 278. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 279. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 280. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 281. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Figura 282. Porcentaje de personas que en días laborables se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.


Personas fumadoras pasivas fuera de casa y del trabajo durante el fin de semana

Figura 283. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por sexo. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 284. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por edad. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 285. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por provincias. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 286. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de estudios. Andalucía. Año 2007.




Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 287. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por nivel de ingresos. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Figura 288. Porcentaje de personas que durante los días del fin de semana se exponen al humo de tabaco (tanto fuera de casa como en el trabajo) de una a cuatro horas o más por clase social. Andalucía. Año 2007.



Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2007. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública.

Condiciones de trabajo: Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el porcentaje de personas trabajadoras expuestas a respirar vapores, humos u otras sustancias peligrosas fue del 11,8% (15,2% en hombres y 5,6% en mujeres). Por grupos de edad, se observa que son las personas de 55 años en adelante las más expuestas a este tipo de sustancias.

En cuanto al perfil socioeconómico, los datos de la encuesta del 2007 indican que la población con menor nivel de estudios, con menores ingresos familiares y pertenecientes a las clases sociales más bajas son las que en el trabajo más frecuentemente se exponen a vapores, humos y otras sustancias peligrosas.


Sevilla (15,8%) y Cádiz (14,8%) fueron las provincias en las que la exposición a estas sustancias de las personas trabajadoras tuvo lugar con mayor frecuencia.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un descenso en el porcentaje de personas trabajadoras en contacto con las sustancias indicadas. En general, en casi todos los grupos la tendencia ha sido ligeramente descendente, salvo en los grupos de mayor edad y en las clases sociales más bajas, en las que ha tenido lugar un pequeño aumento en el porcentaje de personas expuestas con respecto al año 1999.


Por último, destaca el importante descenso producido en las provincias de Huelva y Granada.

Figura 289. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 290. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 291. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 292. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 293. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 294. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a respirar vapores, humos y otras sustancias peligrosas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Condiciones de trabajo: Exposición a sustancias y productos peligrosos

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007, el 9,8% de los hombres estuvo expuesto laboralmente al manejo de sustancias peligrosas, mientras que este porcentaje en mujeres fue del 4,4%. Por grupos de edad se observa que son las personas de entre 55 años y 64 años las más expuestas laboralmente a este tipo de sustancias (11,8%).

Por otro lado, cuantos más bajos son los niveles de estudios, de ingresos mensuales y de clase social, más probabilidad existe de estar en contacto con sustancias peligrosas en el trabajo.

Sevilla (10,3%) y Córdoba (9,6%) fueron las provincias en las que fue mayor la exposición en el lugar de trabajo a sustancias peligrosas.


Evolución desde la Encuesta de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un descenso en el porcentaje de personas trabajadoras en contacto con sustancias peligrosas.

En el periodo estudiado se ha producido un incremento en la exposición laboral a éste tipo de sustancias entre las personas más desfavorecidas (mayores de 55 años, menores niveles de estudios, menores ingresos y clases sociales más bajas).


En las provincias de Huelva y Sevilla ha producido un importante descenso en la exposición laboral a sustancias peligrosas entre las personas trabajadoras.

Figura 295. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a manejar sustancias o productos peligrosos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 296. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a manejar sustancias o productos peligrosos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 297. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a manejar sustancias o productos peligrosos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 298. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 299. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a manejar sustancias o productos peligrosos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 300. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a manejar sustancias o productos peligrosos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Condiciones de trabajo: Exposición a posiciones fatigantes o dolorosas

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 35,5% de la población trabajadora estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas/fatigantes en el trabajo, más los hombres (40,7%) que las mujeres (25,7%).

En general, la población que en su trabajo tienen más frecuentemente posiciones fatigantes o dolorosas se ajustan al perfil de personas de 45 a 54 años (40,9%), con estudios primarios o inferiores (48,8%), con rentas de 1000 a 1499€ mensuales (43,8%) y de clase social baja (48,2%).


Por provincias, Málaga (44,5%) y Cádiz (40,4%) fueron las áreas en las que era más frecuente que las personas trabajadoras tuvieran posiciones fatigantes o dolorosas.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999 se observa un aumento en el porcentaje de personas trabajadoras que desarrollan su trabajo con posturas fatigantes o dolorosas. Este incremento se ha producido en todos los grupos de edad, nivel de estudios, ingresos mensuales (salvo en el caso de rentas inferiores) y clases sociales.


Por último se ha experimentado un importante descenso en la exposición laboral a este tipo de posturas entre las personas trabajadoras de las provincias de Huelva, Jaén y Córdoba.

Figura 301. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 302. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 303. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 304. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 305. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 306. Porcentaje de personas trabajadoras muy expuestas a posiciones dolorosas o fatigantes en el trabajo por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Condiciones de trabajo: Satisfacción con el trabajo

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 la satisfacción con el trabajo fue, en una escala de 1 a 7, de 5,6 puntos como media. En general, y aunque se aprecian pocas diferencias entre los grupos, puede decirse que el nivel de satisfacción aumenta a medida que aumenta la edad, el nivel de estudios, los ingresos familiares y la clase social.


Por provincias, Huelva es la zona donde se alcanzaron los niveles más altos de satisfacción (5,8) y Córdoba y Almería (5,3 en ambos casos) las que registraron los valores medios más bajos.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003

La satisfacción media con el trabajo aumentó ligeramente en 2007 con respecto al año 2003, pasando de 5,38 puntos de media a 5,6 (en una escala de 1 a 7). Este ligero aumento se ha producido por igual en todos los grupos independientemente del sexo, edad, nivel de estudios, rentas mensuales o clase social.


Por provincias, el nivel de satisfacción laboral ha ascendido en toda la Comunidad Autónoma a excepción de Almería, donde la satisfacción pasó del 5,7 en el año 2003 al 5,3 en el año 2007.

Figura 307. Satisfacción media con el trabajo (en una escala de 1 a 7) por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 308. Satisfacción media con el trabajo (en una escala de 1 a 7) por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 309. Satisfacción media con el trabajo (en una escala de 1 a 7) por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 310. Satisfacción media con el trabajo (en una escala de 1 a 7) por nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 311. Satisfacción media con el trabajo (en una escala de 1 a 7) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 312. Satisfacción media con el trabajo (en una escala de 1 a 7) por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Condiciones de trabajo: Percepción de afectación negativa del trabajo en la salud

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 el 23,8% de las personas trabajadoras creían que el trabajo les afectaba negativamente en su salud: esta percepción fue más alta entre los hombres (24,8%) que entre las mujeres (22%).


En general, fue más frecuente que se percibiera el trabajo como una influencia negativa sobre la salud cuanto más avanzada era la edad de la persona, cuando se tenían niveles de estudios más básicos, si se pertenecía a la clase social más desfavorecida o cuando los niveles de ingresos fueron menores.

Por zonas, Málaga (26,2%), Cádiz (25,5%) y Almería (25,5%) son las provincias donde más frecuentemente las personas trabajadoras pensaron que el trabajo les afectaba negativamente a su salud y Huelva (18,7%) la que registró los valores más bajos.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


Desde 1999 observa un descenso en la proporción de personas que creen que el trabajo les afecta negativamente a la salud, siendo este descenso mayor en las mujeres que en los hombres. Salvo en la población menor de 24 años y en la residente en Málaga, este decremento se ha registrado en el resto de grupos de edad, nivel de estudios, ingresos familiares, clase social y provincias.

Figura 313. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por sexo. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 314. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por edad. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 315. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por provincias. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 316. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud nivel de estudios. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 317. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 318. Porcentaje de personas trabajadoras a las que el trabajo afecta negativamente a su salud por clase social. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Apoyo social: Apoyo confidencial y apoyo afectivo

El apoyo social de la población andaluza se recogió a través de la escala de apoyo social de DUKE, que por un lado mide la posibilidad de contar con personas para comunicarse (apoyo emocional) y por otro las demostraciones de amor, cariño y empatía que recibe una persona (apoyo afectivo).

Encuesta Andaluza de Salud 2007

En el año 2007, el 4,7% de la población presentó un escaso apoyo confidencial y un 7,3% tuvo falta de apoyo afectivo, siendo siempre estas prevalencias más notables en mujeres que en hombres.

A medida que aumentó la edad la proporción de personas con falta de apoyo afectivo y confidencial fue mayor, observándose también una mayor carencia confidencial y afectiva cuando empeoraba el nivel socioeconómico. Así, las personas de mayor edad, de menor nivel de estudios, con ingresos económicos inferiores y de clase social más baja, presentaron más falta de apoyo confidencial y afectivo que el resto.

Por otro lado, en función del área geográfica Almería destaca como la provincia donde con porcentajes del 25,%% y 13% su población tuvo menores tasas de apoyo confidencial y afectivo respectivamente.

Evolución desde 1999

Desde 1999 se aprecia una mejora general en el índice de apoyo social, tanto en el componente de confidencialidad como en el de afecto, en hombres y en mujeres.


Esta mejora se produce para todos los grupos de edad, niveles de estudios, niveles de renta y clases sociales en las dos dimensiones analizadas.

Finalmente, todas las provincias han experimentado un descenso en relación a la falta de apoyo social de su población, exceptuando Almería y Cádiz en las que se ha producido un aumento en la falta de apoyo confidencial.

El detalle pormenorizado de esta información es el que se recoge en las *Figuras 319 a 330*.


Apoyo confidencial

Figura 319. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 320. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 321. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 322. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 323. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 324. Porcentaje de personas con escaso apoyo confidencial (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Recursos afectivos

Figura 325. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 326. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 327. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 328. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 329. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 330. Porcentaje de personas con escasos recursos afectivos (escala DUKE) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.



**BLOQUE V:
SERVICIOS SANITARIOS**



BLOQUE V: SERVICIOS SANITARIOS

- Consultas médicas:
 - Frecuencia
 - Lugar de consulta
 - Motivos de consulta
 - Profesional de la medicina visitada/o
- Ingresos hospitalarios:
 - Frecuencia
 - Número medio de hospitalizaciones
- Utilización de servicios de urgencias:
 - Frecuencia
 - Tipo de servicio usado
- Consultas odontológicas: Tipo de dentista visitada/o
- Consumo de medicamentos
- Cobertura sanitaria

RESUMEN DEL BLOQUE V: SERVICIOS SANITARIOS

- El porcentaje de personas que declararon haber consultado al médico pasó del 22% en 1999 al 26% en 2007.
- Los lugares donde más frecuentemente tuvieron lugar las consultas médicas fueron los Centros de Salud / Consultorios: el 57,5% en el año 1999 y el 71,4% en el año 2007.
- Los motivos más frecuentes para acudir al profesional de la medicina fueron en todo el periodo estudiado Diagnóstico y Tratamiento, Revisión y Expedición de recetas, lo que supuso en su conjunto más del 85% de las visitas en los tres años estudiados. El principal motivo de visita, que es Diagnóstico y Tratamiento, disminuyó su frecuencia en el periodo: pasó del 56% en 1999 al 45,3% en 2007.
- En 2007 el 80% de las personas que visitaron al médico lo hicieron en las consultas de medicina general. Este porcentaje apenas ha variado respecto a los años 1999 y 2003.
- El porcentaje de personas que permanecieron ingresadas el año anterior a la entrevista descendió en algo más del 2%: desde un 8,1% en 1999 a un 5,8% en 2007.
- El número medio de ingresos hospitalarios (entre las personas que fueron ingresadas) aumentó de 1,24 veces en 1999 a 1.45 veces en 2007.
- En torno al 20% de las personas entrevistadas utilizaron algún servicio de urgencias durante el año anterior a la entrevista. No se observan diferencias entre las tres ediciones de la EAS.
- A lo largo del periodo de tiempo estudiado, alrededor del 95% de los servicios de urgencias utilizados fueron servicios públicos.
- Entre las personas que acudieron al dentista, el 82,9% fueron a una consulta privada en el año 1999, mientras que en el año 2007 este porcentaje ascendió hasta el 91%.
- La prevalencia de consumo de algún tipo de medicamento permaneció estable entre 1999 y 2007: alrededor al 50% de las personas entrevistadas tomó algún tipo de medicamento.
- No existen diferencias en el periodo estudiado con respecto al porcentaje de personas con doble cobertura sanitaria (en torno al 6% estaban doblemente aseguradas).

Consultas médicas: Frecuencia, lugar de consulta, motivos de consulta y profesional de la medicina visitado/a

A continuación se expone la información correspondiente al uso de servicios médicos (públicos o privados) en las dos semanas previas a la realización de las entrevistas. A las personas encuestadas se les pidió que indicaran si habían tenido alguna consulta médica durante el periodo señalado y, en caso afirmativo, cuál fue el lugar, motivo y nivel asistencial de las mismas.

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

Durante el año 2007 el 25,8% de la población (31% mujeres y 20,6% hombres) declaró haber consultado al médico en las dos semanas previas a la realización de la entrevista. La mayoría de estas visitas tuvieron como finalidad la consulta a un profesional de Atención Primaria (80,3%), se realizaron en el centro de salud o consultorio y fue el diagnóstico o tratamiento el principal motivo de consulta que, junto con la revisión y expedición de recetas, supusieron más del 85% de las visitas realizadas.

Con respecto a la edad, existió una tendencia clara que indicaba que cuanto mayor era la edad de la población, más frecuente era solicitar una consulta médica y más habitual es acudir a los servicios sanitarios en busca de la expedición de recetas (porcentaje más alto en el grupo de 65 a 74 años). Por último, a medida que aumentó la edad, con mayor frecuencia el profesional visitado era de medicina general.


En función del perfil socioeconómico, se observó que a menor nivel de estudios, ingresos y clases social eran mayores los porcentajes de personas que asistían a un cita médica y más frecuentemente éstas tenían lugar en un centro de salud o consultorio para consultar a un profesional de medicina general.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999, la demanda de consultas médicas ha sufrido un aumento: han pasado del 21,8% en el año 1999 hasta el 25,8% en el año 2007 y este incremento ha sido superior en mujeres que en hombres. A pesar ello, los principales lugares y motivos de las consultas siguen siendo los centros de salud y el diagnóstico y tratamiento, respectivamente.


..... **Frecuencia**

Figura 331. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 332. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 333. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 334. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 335. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por nivel de ingresos. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 336. Porcentaje de personas que consultaron al médico/a en las últimas dos semanas por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Lugar de consulta

Figura 337. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 338. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 339. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 340. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 341. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 342. Porcentaje de personas que acudieron al centro de salud, al ambulatorio o a consultas externas hospitalarias para su última consulta médica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Motivos de consulta

Figura 343. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 344. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 345. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por provincias Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 346. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 347. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 348. Porcentaje de motivos principales por el que se acudió a la última consulta médica por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 351. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 352. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 353. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 354. Porcentaje de personas cuya última visita médica fue a la consulta de medicina general por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Ingresos hospitalarios: Frecuencia y número medio de hospitalizaciones

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

Durante el año 2007 el 5,8% de la población residente en Andalucía (7,3% mujeres y 4,2% hombres) tuvo algún ingreso hospitalario en los 12 meses previos a la realización de la entrevista.

La mayor proporción de éstos tuvieron lugar entre las personas de mayor edad (9,8% en mayores de 75 años), observándose también en este grupo un mayor número de ingresos por persona (2,1 veces).

En función del perfil socioeconómico se observa que a menor nivel de estudios, ingresos económicos y clase social son mayores los porcentajes de personas que fueron ingresadas y, en general, en mayor número de ocasiones que el resto de la población.


Las provincias con mayor porcentaje de ingresos en 2007 fueron Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga, donde alrededor del 7% de las personas entrevistadas fueron ingresadas durante una noche al menos. Por otro lado, Granada es el área en la que el número medio de veces que las personas entrevistadas fueron ingresadas fue mayor (2,14 veces).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999, el porcentaje de personas que permanecieron ingresadas el año anterior a la entrevista descendió en algo más del 2%: desde un 8,1% en el año 1999 a un 5,8% en el 2007. El número medio de ingresos hospitalarios, sin embargo, ha aumentado en el periodo estudiado (de 1,24 veces en el año 1999 a 1,45 veces en el 2007).


Tanto el descenso en la proporción de personas ingresadas, como el ligero aumento en el número de ingresos medios, se han producido prácticamente por igual en todos los grupos socioeconómicos analizados.

Figura 357. Porcentaje de personas que estuvieron ingresados al menos una noche durante el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 358. Porcentaje de personas que estuvieron ingresados al menos una noche durante el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 359. Porcentaje de personas que estuvieron ingresados al menos una noche durante el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


Figura 360. Porcentaje de personas que estuvieron ingresados al menos una noche durante el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.


••••• Número medio de hospitalizaciones

Figura 361. Número medio de ingresos en el último año (sólo para las personas que fueron ingresadas) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 362. Número medio de ingresos en el último año (sólo para las personas que fueron ingresadas) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 363. Número medio de ingresos en el último año (sólo para las personas que fueron ingresadas) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 364. Número medio de ingresos en el último año (sólo para las personas que fueron ingresadas) por nivel educativo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 365. Número medio de ingresos en el último año (sólo para las personas que fueron ingresadas) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 366. Número medio de ingresos en el último año (sólo para las personas que fueron ingresadas) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Utilización de servicios de urgencias: Frecuencia

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

Durante el año 2007 el 20,8% de la población residente en Andalucía (24,4% mujeres y 17,1% hombres) acudió alguna vez a algún servicio de urgencias en los 12 meses previos a la realización de la entrevista. Estos servicios en el 96,2% de los casos fueron de carácter público.

La mayor demanda de atención urgente se produjo por las personas mayores de 65 años (24,9% en el grupo de 65 a 74 años y 29,2% en mayores de 75 años) y en las provincias de Jaén (26,3%) y Granada (24,9%).


Cuanto mayores fueron los niveles de estudios, rentas y clases social menos frecuente fue el uso de los servicios de urgencias y más posibilidades mostraron de acudir a la sanidad privada.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999

Desde 1999, se ha producido un ligero incremento en el porcentaje de personas que utilizaron los servicios de urgencia: más evidente este aumento entre las personas de mayor edad, que pasaron de demandar estos servicios el 23,7% en el año 1999 al 29,2% en el año 2007.


En el resto de grupos se produjeron pocos cambios, a excepción de aquellas personas con mayores niveles de ingresos, entre las que descendió el uso de servicios de urgencia (del 27,2% en 2003 al 13,3% en 2007).

Figura 369. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 370. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 371. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 372. Porcentaje de personas que utilizaron algún tipo de servicio de urgencias en el último año por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 375. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quines usaron algún servicio de urgencias) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 376. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quines usaron algún servicio de urgencias) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 377. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quines usaron algún servicio de urgencias) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 378. Porcentaje de personas que utilizó algún servicio público de urgencias (entre quines usaron algún servicio de urgencias) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consultas odontológicas: Tipo de dentista visitada/o

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

Durante el año 2007 el 91,0% de la población que acudió al dentista lo hizo en una consulta privada, siendo más frecuente las visitas a un odontólogo de la sanidad pública entre los grupos de más edad.


El tipo de dentista visitado no presenta diferencias reseñables según la provincia.

En los grupos con menos estudios, ingresos inferiores y clases sociales más bajas, tras la consulta privada, el segundo tipo de dentista visitado más frecuentemente es el de la sanidad pública, mientras que en el grupo de más estudios, mayores ingresos y clases sociales más altas, después del dentista privado en primer lugar, se suele acudir a un profesional de odontología perteneciente a alguna sociedad médica.

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 2003


Desde 2003, se ha producido un descenso en los porcentajes de personas que acudieron a las consultas odontológicas de la sanidad pública, disminución que se observa en todos los grupos, al mismo tiempo que se ha producido un aumento en la proporción de hombres y mujeres que visitaron las consultas de odontología privadas.

Figura 379. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 380. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 381. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 382. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-99: Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 383. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quienes acudieron al dentista) por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. Elaboración: Escuela Andaluza de Salud Pública. EAS-03: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; EAS-07: Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 384. Porcentaje de personas que acudieron a los distintos tipos de consultas dentales (entre quines acudieron al dentista) por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Consumo de medicamentos

Encuesta Andaluza de Salud de 2007


En el año 2007 la mitad de la población andaluza (50,2%) consumió algún tipo de medicamento durante las dos semanas previas a la realización de la entrevista (41,5% hombres y 58,6% en mujeres). Este consumo fue mucho mayor entre la población de mayor edad, de tal manera que en la población mayor de 75 años, 9 de cada 10 personas estaban medicadas (91,8%).

Por otro lado, las personas que más medicamentos consumieron fueron las de menor nivel de estudios (57,6%), las de ingresos económicos más bajos (69,5%) y las de clase social media (51,3%), mientras que los menores consumidores fueron las personas de estudios medios (36,5%), las de mayores niveles de renta (39,8%) y las de clase social alta (45,6%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


Desde 1999, se ha producido un ligero incremento en el porcentaje de personas que consumen algún tipo de medicación: desde un 48,7% en el año 1999 a un 50,2% en el año 2007. Estos aumentos han sido más notables entre la población de mayor edad y en la de menores ingresos económicos.

Figura 385. Prevalencia de personas consumidoras de medicamentos por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 386. Prevalencia de personas consumidoras de medicamentos por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 387. Prevalencia de personas consumidoras de medicamentos por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 388. Prevalencia de personas consumidoras de medicamentos por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 389. Prevalencia de personas consumidoras de medicamentos por nivel de ingresos. Andalucía. Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 390. Prevalencia de personas consumidoras de medicamentos por clase social. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Cobertura sanitaria

Encuesta Andaluza de Salud de 2007

En el año 2007 en torno al 6% de las personas entrevistadas tenían doble cobertura sanitaria (6,7% hombres y 5,5% en mujeres).

A medida que aumentaba la edad ascendió el porcentaje de personas con cobertura pública y privada, pero sólo hasta los 44 años: A partir de los 65 años el porcentaje de personas con doble cobertura sanitaria descendió drásticamente.


Cuanto mayor era el nivel de estudios, ingresos y más alta la clase social a la que se pertenece, mayor fue la frecuencia de la doble cobertura sanitaria: ésta alcanza el 14,7%, 21,2% y 13,9% para las personas con estudios universitarios, que ingresan más de 2500€ mensuales y de clase social alta, respectivamente.

Huelva (15,3%), seguida de Sevilla (11,1%) , son las provincias en la que son más altos los porcentajes de población doblemente asegurada, mientras Jaén destaca por ser el área con menor porcentaje (0,9%).

Evolución desde la Encuesta Andaluza de Salud de 1999


Desde 1999, apenas se han producido variaciones en el porcentaje de personas que tienen una doble cobertura sanitaria aunque, a nivel desagregado, se observan ligeros incrementos en los grupos poblacionales de mediana edad, con estudios universitarios, con mayores ingresos económicos y pertenecientes a las clases sociales más altas.

Figura 391. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por sexo. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 392. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por edad. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.




Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 393. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por provincias. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

Figura 394. Porcentaje de personas que poseen doble cobertura sanitaria por nivel de estudios. Andalucía. Años 1999, 2003 y 2007.



Fuente: Encuestas Andaluzas de Salud. **Elaboración:** Escuela Andaluza de Salud Pública. **EAS-99:** Encuesta Andaluza de Salud del año 1.999; **EAS-03:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.003; **EAS-07:** Encuesta Andaluza de Salud del año 2.007.

BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA

Sánchez-Cruz JJ., Daponte A, García M^a del Mar. 2.007. Tercera Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz JJ., Daponte A, García M^a del Mar. 2.003. Segunda Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Sánchez-Cruz JJ., Daponte A, García M^a del Mar. 1.999. Primera Encuesta Andaluza de Salud. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Rodríguez-Martos A, Navarro RM, Vecino C, Pérez R. Validación de los cuestionarios KFA (CBA) y CAGE para el diagnóstico del alcoholismo. *Drogalcohol* 1986; 11: 132-9

Mayfield DG, McLeod G, Hall P. The CAGE questionnaire: Validation of a new alcoholism screening instrument. *Am J Psychiatry* 1974; 131: 1121-3.

Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C y de la Fuente L. Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36. *Med Clin Barc* 1998; 111:410-416.

Ware JE Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. *Med Care*. 1996;34:220-33.

Versión española del Cuestionario de Salud SF-12 adaptada por J. Alonso y cols. Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM-IMAS)

Broadhead WE, Gehlbach SH, Degruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNK functional social support questionnaire: measurement of social support in family medicine patients. *Med Care* 1988; 26: 709-23.

Bellón JA, Delgado A, Luna J, Lardelli P. Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. *Aten Primaria*, 1996; 18: 153-63.


De la Revilla L, Bailón E, Luna J, Delgado A, Prados MA, Fleitas L. Validación de una escala de apoyo social funcional para su uso en la consulta del médico de familia. *Aten Primaria*, 1991; 8: 688-92.


Philp I 2000 EASY-Care: A systematic approach to the assessment of older people. *Geriatric Medicine*, 2000, 30(5), 15-19.



ANEXOS







ANEXOS

> **Anexo I: Definición de variables**

Anexo II: Cuestionario de la EAS 07

ANEXO I: DEFINICIÓN DE VARIABLES

La siguiente tabla muestra las variables estudiadas. La formulación de las preguntas puede consultarse en el cuestionario de la EAS-07 (Anexo II).

I.- Nivel de Salud	Variables Cuestionario Adulto EAS 07
Auto-percepción de salud y calidad de vida	P38
Indicadores de salud mental y física (SF-12)	Componente Físico, Componente Mental
Limitación temporal de las actividades cotidianas: limitación en el trabajo habitual y limitación de actividades sociales	P11, P13
Enfermedades crónicas: Alergias, hipertensión, artrosis, nervios, colesterol, varices, diabetes y trastornos cardiacos	P14.1, P14.5, P14.2, P14.13, P14.8, P14.6, P14.4, P14.12
Discapacidad física, sensorial y psíquica	P2a.3, P2a.4, P2a.5
Autonomía personal – AVDs instrumentales y básicas	P54
Accidentes en los últimos tres meses y lugar	P15a, P15b
II.-Determinantes de Salud	
Consumo de alcohol: frecuencia de consumo, edad media de inicio al consumo de alcohol y sospecha de alcoholismo (escala CAGE)	P29, P31a, CAGE
Consumo de tabaco: hábitos de tabaco, edad a la que empezó a fumar, actitud ante el tabaco	P23, P23a, P24d
Alimentación- consume de verduras , frutas y lácteos	P36.1, P36.5, P36.6
Peso corporal: Índice de masa corporal	IMC
Actividad física: actividad física durante el trabajo y durante el tiempo libre	P34, P34a
III.- Practicas preventivas	
Vacunación ante la gripe	P37
Métodos anticonceptivos	P38a
Visitas al ginecólogo	P39
Mamografías	P40
Citologías	P41
Exposición solar: frecuencia de exposición al sol	P42a
Higiene buco-dental	P19
Seguridad vial: frecuencia de uso del casco por ciudad y carretera, frecuencia de uso del cinturón por ciudad y carretera, uso de asiento especial para menores	P51a.1, P51a.2, P52a.1, P52a.2, P53a
Consejo médico para dejar de fumar	P24c
IV.- Medioambiente:	
Características de la vivienda	P4a, P4b
Exposición ambiental a tabaco: fumadores pasivos y tiempo medio en ambientes cargados de tabaco	P26, P27, P28
Condiciones de trabajo: exposición en el trabajo a riesgos ergonómicos y fisico-químicos, grado de satisfacción en el trabajo y grado de afectación negativa del trabajo en la salud	P65.5, P65.6
Apoyo social: escala DUKE	DUKE
V.- Servicios sanitarios	
Consultas médicas: consultas medicas en las ultimas dos semanas, lugar, motivo y medico al que visito	P17a, P17c, P17d, P17e
Ingresos hospitalarios	P20, P20a
Utilización servicio de urgencias: utilización del servicio de urgencias y tipo de servicio usado	P21, P21b
Consultas odontológicas	P19.d
Consumo de medicamentos	P16
Cobertura sanitaria- modalidad del seguro sanitario	P22


A continuación se describen algunas de las recodificaciones/ tratamientos de las variables previas al análisis de las mismas:


- **Actividad física en el tiempo libre.** Definimos sedentarismo en el tiempo libre cuando la persona entrevistada declara no hacer ningún ejercicio en su tiempo libre (pregunta 34a. del cuestionario).
- **Actividad física en el trabajo.** Definimos el sedentarismo en el trabajo como la unión de respuestas "Sentado" y "De pie sin esfuerzos" a la pregunta de qué es lo que mejor describe la actividad principal del entrevistado (pregunta 34 del cuestionario).
- **Cobertura sanitaria.** Se define la doble cobertura sanitaria cuando la persona entrevistada declara ser titular o beneficiario de más de un seguro sanitario (pregunta 22 del cuestionario).
- **Consumo de lácteos, fruta fresca y verduras.** En estas tres variables se calcula la frecuencia de personas que consumen al menos tres veces a la semana este tipo de productos (pregunta 36 del cuestionario).
- **Dolor que dificulta el trabajo habitual.** La variable estudiada es la agregación de las opciones Bastante y Mucho (pregunta 11 del cuestionario).
- **Mala salud.** La variable estudiada es la unión de las dos opciones más desfavorables: Malo y Muy malo (pregunta 38 del cuestionario). **Problemas de salud física o emocionales que dificultan las actividades sociales.** La variable estudiada es la unión de las opciones de respuesta Siempre y Casi siempre (pregunta 13 del cuestionario).
- **SF-12.** A partir de los ítems que forman el cuestionario se construyen dos puntuaciones resumen: la puntuación física y la puntuación mental. Las puntuaciones del SF-12 son puntuaciones estandarizadas basadas en la población normativa (población general española), conocidas como puntuaciones "50/10", ya que se obtiene una media de 50 y una desviación estándar de 10 en la población general de referencia. Los valores superiores o inferiores a 50 deben interpretarse como mejores o peores, respectivamente que la población de referencia (preguntas 7 a 10 del cuestionario).
- **Sobrepeso y obesidad:** A partir de los datos de peso y altura (preguntas 47 y 47a. del cuestionario respectivamente), se calculó el **Índice de Masa Corporal (IMC)**, como variable intermedia, codificándose según propone la OMS en bajo peso ($IMC < 18,5$), normopeso (IMC entre 18,5 y 24,9), sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9), y obesidad ($IMC > 30$). La variable estudiada es la prevalencia para la suma de las categorías sobrepeso y obesidad.

- **Sospecha de alcoholismo.** En el cuestionario hay cuatro preguntas que conforman el cuestionario CAGE (Pregunta 32 del cuestionario EAS-07). Se define la sospecha de alcoholismo cuando alguna de estas cuatro preguntas tiene por lo menos una respuesta afirmativa (preguntas 32, 32a., 32b. y 32c. del cuestionario).

Además las variables de estratificación fueron:

- **Sexo:** Hombre, Mujer.
- **Edad:** los grupos de edad estudiados fueron de 16 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45 a 54 años, de 55 a 64 años, de 65 a 74 años, y 75 y más años.
- **Provincia:** Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
- **Nivel educativo** del entrevistado: hasta primarios, estudios secundarios, estudios universitarios.
- **Nivel de estudios:** Hasta estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios.
- **Nivel de ingresos:** hasta 999€ mensuales, entre 1000 y 1499€ mensuales, entre 1500 y 2499€ mensuales y más de 2500€ mensuales. Esta variable no se recogió en 1999, por lo que en los resultados desagregados por nivel de ingresos no aparece este año.
- **Clase social:** se calculó la clase social del entrevistado en función de su ocupación, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994. De esta clasificación resultó la siguiente codificación de la variable:
 - Clases sociales I y II: Directivos, profesiones asociadas a estudios universitarios, artistas y deportistas.
 - Clase social III: Empleados de tipo administrativo, profesionales de apoyo a la gestión, trabajadores de los servicios personales y de seguridad, trabajadores por cuenta propia, supervisores de trabajadores manuales
 - Clases sociales IVa, IVb, V y en situación de desempleo: trabajadores manuales cualificados y semicualificados, trabajadores no cualificados y personas desempleadas.





ANEXOS
Anexo I: Definición de variables
> Anexo II: Cuestionario
de la EAS 07



CUESTIONARIO NÚMERO



ADULTOS

RUTA: DISTRITO: SECCIÓN:

MUNICIPIO: PROVINCIA:

Buenos días/tardes, soy ..., entrevistador/a para la empresa DEMOMETRICA. En estos momentos estamos realizando la III Encuesta Andaluza de Salud por encargo de la Junta de Andalucía a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La encuesta va dirigida a conocer el estado de salud de la población andaluza y su utilización de servicios sanitarios. La **carta de presentación** que le muestro contiene una breve información introductoria de los objetivos de la encuesta, junto a la solicitud de su colaboración en la misma respondiendo a un sencillo cuestionario.

Entregar carta de presentación

La selección de los hogares a los que se solicita la colaboración voluntaria en el estudio es estrictamente aleatoria, por lo que su colaboración resulta especialmente valiosa. Toda la información que Vd. nos facilite está sujeta a las especificaciones de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus modificaciones posteriores. Los datos que le solicitamos se tratarán informáticamente para realizar análisis estadísticos de una forma totalmente ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales.

GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN

COMPOSICIÓN DEL HOGAR:

HOGAR: Persona o conjunto de personas que conviven/ocupan en común la vivienda seleccionada, o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

MIEMBROS DEL HOGAR: Se consideran miembros del hogar todas las personas que, sin ocupar otra vivienda principal, dependen económicamente del hogar seleccionado.

CABEZA DE FAMILIA: Se considera cabeza de familia, el miembro del hogar que aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar.

(Continuación)										
MIEMBROS DEL HOGAR:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P. 2b. ¿Requiere algún tipo de dedicación o de cuidados especiales? (Entrevistador/a: esta pregunta debe realizarse para todas las personas con algún código 1 a 5 en P.2a, y para todos los miembros menores de 16 años o mayores de 64 años, aunque no cumplan ninguna de las condiciones de P.2a)										
▪ Sí	<input type="checkbox"/> 1									
▪ No	<input type="checkbox"/> 2									
▪ No lo sabe, no está seguro	<input type="checkbox"/> 8									
▪ No contesta	<input type="checkbox"/> 9									
SÓLO PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR CON CÓDIGO 1 EN P.2b y PARA TODOS LOS MIEMBROS MENORES DE 16 AÑOS ó MAYORES DE 64 AÑOS										
P. 2c. Y, ¿quién se encarga HABITUALMENTE de su cuidado? (nos referimos a la persona que se ocupa con más frecuencia y/o dedica más tiempo a cuidar a la persona referenciada), (marcar una sola opción de respuesta por cada miembro del hogar que requiere cuidados)										
▪ Habitualmente se cuida él/ella mismo/a	<input type="checkbox"/> 1									
Habitualmente lo/la cuido yo (la persona entrevistada):										
▪ Yo solo/sola	<input type="checkbox"/> 2.1									
▪ Mi pareja y yo	<input type="checkbox"/> 2.2									
▪ Yo, junto a otra persona que no es mi pareja	<input type="checkbox"/> 2.3									
▪ Otra opción	<input type="checkbox"/> 2.4									
▪ Habitualmente lo cuida otra persona que no reside en el hogar	<input type="checkbox"/> 3									
▪ Habitualmente lo cuida otra persona del hogar	<input type="checkbox"/> 4									
En caso de que el cuidador sea otra persona del hogar anotar el número de miembro que le corresponde en el cuadro										

HACER P.2d y P.2e SÓLO SI LA PERSONA ENTREVISTADA **CUIDA A ALGUIEN DEL HOGAR** (ES DECIR, QUE SE HAYA MARCADO ALGUNA "X" EN P2C EN LA OPCIÓN "HABITUALMENTE LO CUIDO YO (LA PERSONA ENTREVISTADA)". RESTO, PASAR DIRECTAMENTE A P3a.

P.2d. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a cuidar a las personas de esta casa que lo necesitan? (nos referimos a tareas como prestar ayuda para el aseo, la alimentación, vestirse, dar medicinas, etc.)

- De lunes a viernes (por día) ▪ NS/NC 99
- Fines de semana (por día) ▪ NS/NC 99

P.2e. ¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en el cuidado de esta/s persona/as? (admite respuesta múltiple)

- Sí, una persona contratada para ello 1
- Si, profesionales de los servicios Sociales o sanitarios 2
- Si, otras personas(familiares, Amigos/as, vecinos/as, otros) .. 3
- No, no viene ninguna persona .. 4
- No contesta 9

A TODOS

P.3a. En su casa, ¿quién se ocupa principalmente de las tareas domésticas tales como fregar, planchar, cocinar, etc.? (una sola respuesta)

- Yo solo/a 1
- Mi pareja 2
- Mi pareja y yo 3
- Yo, junto a otra persona que no es mi pareja 4
- Otra persona de la casa que no es mi pareja 5
- Una persona contratada (que cobra por ello) 6
- Otra situación 7
- No sabe / No contesta 9

→ **Nº de persona del hogar:**

P.3b. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedica usted a las tareas de la casa tales como fregar, planchar, cocinar, etc., de lunes a viernes?, ¿Y durante los fines de semana?

- De lunes a viernes (por día) ▪ NS/NC 99
- Fines de semana (por día) ▪ NS/NC 99

P.3c. ¿Tiene alguna persona de fuera de la casa que ayude a realizar las tareas domésticas?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.4a. ¿La vivienda que usted ocupa es de propiedad o de alquiler?

- De propiedad 1
- De alquiler 2
- Otra situación, especificar 3
- 9
- NS/NC 9

P.4b. ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda? (no contar la cocina, los baños/lavabos o el comedor/sala de estar?)

- Habitaciones
- NS/NC 99

P.4c. ¿Cuáles son los servicios y equipamientos con los que cuenta su vivienda?

	Sí	No		No quiere	No puede permitírsele
▪ Ducha o bañera	1	2	→	3	4
▪ Calefacción central/individual	1	2	→	3	4
▪ Aire acondicionado	1	2	→	3	4
▪ Ascensor	1	2	→	3	4
▪ Lavadora	1	2	→	3	4
▪ Lavavajillas	1	2	→	3	4
▪ Horno microondas	1	2	→	3	4
▪ Televisor	1	2	→	3	4
▪ Teléfono	1	2	→	3	4
▪ Ordenador	1	2	→	3	4
▪ Agua corriente	1	2	→	3	4
▪ Agua caliente	1	2	→	3	4

P.5a. La siguiente pregunta se refiere a aspectos del medio ambiente del barrio o zona donde usted residen. Referido al último año, considera usted que

	Mucho	Algo	Nada	NS/NC
▪ El ruido procedente del exterior de su vivienda le resulta molesto	1	2	3	9
▪ Su vivienda sufre de malos olores procedentes del exterior	1	2	3	9
▪ En el barrio donde usted vive la contaminación del aire es elevada	1	2	3	9
▪ Su barrio se encuentra afectado por alguna industria contaminante	1	2	3	9
▪ En el barrio donde usted vive hay espacios verdes suficientes	1	2	3	9

P.5b. En general, la calidad del medio ambiente de su barrio es ...

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3
- Mala 4
- Muy mala 5
- NS/NC 9

P.6. ¿Tienen ustedes coche? (para uso personal, no profesional exclusivamente)

- Uno 1
- Dos 2
- Más de dos 3
- Ningún coche 4
- NS/NC 9

Las preguntas que siguen se refieren a lo que Vd. piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto

P.7. En general, usted diría que su salud es ... (una sola respuesta)

- Excelente 1
- Muy buena 2
- Buena 3
- Regular 4
- Mala 5
- No sabe/no está seguro 8
- Se negó 9

P.8. Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades o cosas que usted podría hacer un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas?. En caso afirmativo, ¿cuánto?

	Sí, me limita MUCHO	Sí, me limita UN POCO	No, no me limita NADA
▪ Esfuerzos moderados como mover una mesa, pasa la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora	1	2	3
▪ Subir varios pisos por la escalera	1	2	3

P.9. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física?

	Sí	No
▪ ¿Hizo menos de lo hubiera querido hacer?	1	2
▪ ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas? .	1	2

P.10. Durante las últimas 4 semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

	Sí	No
▪ ¿Hizo menos de lo que hubiera querido por algún problema emocional?	1	2
▪ ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre por algún problema emocional?	1	2

P.11. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

- Nada 1
- Un poco 2
- Regular 3
- Bastante 4
- Mucho 5

P.12. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ...

	Siempre	Casi Siempre	Muchas Veces	Algunas Veces	Sólo alguna vez	Nunca
▪ Se sintió calmado y tranquilo?	1	2	3	4	5	6
▪ Tuvo mucha energía?	1	2	3	4	5	6
▪ Se sintió desanimado y triste?	1	2	3	4	5	6

P.13. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?

- Siempre 1
- Casi siempre 2
- Algunas veces 3
- Sólo alguna vez 4
- Nunca 5

P.14. En la tarjeta que voy a enseñarle aparece una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho un médico que usted padece actualmente alguna de ellas? (entrevistador/a: Mostrar TARJETA A)

	Le ha dicho el médico	
	Sí	No
▪ Alergias crónicas	1	2
▪ Artrosis o reumatismo	1	2
▪ Bronquitis crónica	1	2
▪ Diabetes	1	2
▪ Hipertensión	1	2
▪ Varices en las piernas	1	2
▪ Colesterol	1	2
▪ Migrañas/Jaquecas	1	2
▪ (SÓLO HOMBRES) Trastornos de próstata	1	2
▪ Dolor o molestias de espalda, cuello, hombro, espalda, cintura	1	2
▪ Mala circulación	1	2
▪ Trastornos cardíacos	1	2
▪ Depresión y/o ansiedad	1	2
▪ Otros problemas mentales.....	1	2
▪ Anemia	1	2
▪ Incontinencia urinaria	1	2
▪ Osteoporosis	1	2
▪ (SÓLO MUJERES) Dolor menstrual	1	2
▪ Otras enfermedades crónicas (especificar, máximo dos)		

P.15. ¿Ha tenido usted algún accidente que le haya causado heridas o lesiones suficientes para limitar su actividad normal y/o para necesitar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses?

- Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?
- No 2 → **Pasar a P.16**

P.15a. ¿Y en los últimos tres meses?

- Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?
- No 2 → **Pasar a P.16**

P.15b. Refiriéndonos en concreto al ÚLTIMO ACCIDENTE, ¿dónde tuvo LUGAR?

- En su casa 1
- En su centro de formación 2
- En su centro de trabajo 3
- En un lugar de recreo, deporte 4
- En una vía pública, calle, edificio público, edificio comercial, etc. Que no sea accidente de tráfico 5
- En la vía pública; accidente de tráfico como conductor 6
- En la vía pública: accidente de tráfico como pasajero 7
- En la vía pública: accidente de tráfico como peatón 8
- En otro lugar, especificar 9

P.15d. ¿Ha sido en un desplazamiento DENTRO DE SU JORNADA LABORAL?

- Sí 1
- No 2

P.15e. ¿Cuál es la PRINCIPAL LESIÓN O DAÑO que le produjo este accidente?

- Envenenamiento o Intoxicación (no alimentarias) . 1
- Quemaduras 2
- Fracturas 3
- Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones . 4
- Heridas profundas 5
- Otros daños 6
- N/C 9

P.15f. Como consecuencia de este último accidente, ¿TUVO QUE ... ?

- Ser ingresado en un hospital o clínica 1
- Acudir a un servicio de urgencias de un hospital o clínica 2
- Consultar a un médico o enfermera (fuera de un hospital o clínica) 3
- No fue necesaria ninguna atención sanitaria 4
- N/C 9

P.15c. ¿Y se ha producido este accidente a la ida o vuelta al trabajo?

- Sí 1
- No 2

A TODOS

P.16. Y en las últimas 2 semanas, ¿ha utilizado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

- Sí 1
- No 2 → **Pasar P.17**
- N/C 9 → **Pasar P.17**

P.16a. ¿Qué tipo de medicamento? (entrevistador/a: Mostrar TARJETA B y anotar todos los que cite)

	P.16a		P.16b	
	CONSUMIDO		RECETADO	
	Sí	No	Sí	No
▪ Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios.....	1	2	1	2
▪ Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre	1	2	1	2
▪ Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	1	2	1	2
▪ Antibióticos	1	2	1	2
▪ Tranquilizantes, sedantes	1	2	1	2
▪ Pastillas para dormir	1	2	1	2
▪ Medicamentos antidepresivos	1	2	1	2
▪ Medicamentos para la alergia	1	2	1	2
▪ Medicinas para el reuma	1	2	1	2
▪ Medicinas para el corazón	1	2	1	2
▪ Medicinas para la tensión arterial	1	2	1	2
▪ Medicamentos para la diabetes	1	2	1	2
▪ Medicinas para alteraciones digestivas	1	2	1	2
▪ Antidepresivos, estimulantes	1	2	1	2
▪ Medicamentos para bajar el colesterol	1	2	1	2
▪ Medicamentos para la diabetes	1	2	1	2
▪ Hormonas para la menopausia (sólo a mujeres).....	1	2	1	2
▪ Anticonceptivos (sólo a mujeres)	1	2	1	2
▪ Otros (especificar)	1	2	1	2
▪	1	2	1	2

P.16b. ¿Y los medicamentos que ha consumido fueron recetados por el médico?

A TODOS

P.17. Durante los últimos doce meses, hasta el día de ayer, ¿ha acudido a algún Centro de Salud (Consultorio) o Ambulatorio (Centro de Especialidades) de la Seguridad Social/SAS (Servicio Andaluz de Salud) por algo que le pasaba a USTED o acompañando a otra persona?

- Sí, por algo que le pasaba a usted..... 1
- Sí, por algo que le pasaba a otra persona (familiar, conocido, etc.)..... 2
- Sí, por ambos motivos..... 3
- No, no he acudido en los últimos doce meses pero sí anteriormente 4
- No, nunca he ido a un Centro de Salud o Ambulatorio de la S. Social/SAS 5
- N/C 9

P.17a. Y, ¿ha CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO (público o privado) por algún problema, molestia o enfermedad suya EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS? Nos referimos a una verdadera consulta, no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis

- Sí 1
- No 2 ⇒ **Pasar P.18**
- N/C 9 ⇒ **Pasar P.18**

P.17b. ¿Cuántas veces ha consultado al médico en las 2 últimas semanas?

--	--	--

 veces

- NS/NC 99

P.17c. Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo usted al médico? (conteste en relación con la última consulta)

- Centro de Salud/Consultorio 1
- Ambulatorio/Centro de Especialidades 2
- Consulta externa de un Hospital 3
- Servicio de Urgencia de un Ambulatorio 4
- Servicio de Urgencia de un Hospital 5
- Consulta del médico particular 6
- Consulta del médico de una sociedad 7
- Empresa o lugar de trabajo 8
- En el domicilio de usted 9
- Consulta telefónica 10
- Organizaciones no gubernamentales (ONG,s) ... 11
- Otros lugares 12
- NS/NC 99

P.17d. ¿Cuál fue el motivo principal de la última consulta o visita?

- Diagnóstico y tratamiento 1
- Revisión 2
- Planificación familiar 3
- Control de embarazo 4
- Rehabilitación 5
- Orientación y consejo, problemas familiares y/o sociales 6
- Expedición de recetas 7
- Emisión de partes de bajas, confirmación o alta 8
- Otras 9
- NS/NC 0

P.17e. El médico que consultó o visitó era (una sola respuesta)

- Médico general 1
- Otros 2

¿Cuál?

- Alergología 01
- Aparato digestivo 02
- Cardiología 03
- Cirugía general y digestiva 04
- Cirugía cardiovascular 05
- Cirugía vascular 06
- Dermatología 07
- Endocrinología y nutrición 08
- Geriátría 09
- Ginecología-obstetricia 10
- Internista 11
- Nefrología 12
- Neumología 13
- Neurocirugía 14
- Neurología 15
- Oftalmología 16
- Otorrinolaringología 17
- Oncología 18
- Psiquiatría 19
- Rehabilitación 20
- Reumatología 21
- Traumatología 22
- Urología 23
- Otros 24
- No sabe 88
- No contesta 99

P.17f. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar entre la solicitud de la consulta al centro sanitario y su celebración? (Entrevistador/a: si le dicen "en el mismo día" escriba "0" en el espacio días)

--	--	--

 meses

--	--	--

 días

- NS/NC 99

P.17g. El médico al que acudió en esta última consulta realizada era ...

- De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas, Adeslas, Asisa) 2
- Médico privado/particular 3
- Mutua de su empresa o médico de su empresa .. 4
- Otros 5
- NS/NC 9

(Sólo a los que respondieron 2 ó 9 en P.17a)

P.18. ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a usted?

--	--	--

 años

--	--	--

 meses

- Nunca ha ido al médico 97
- No recuerda 98
- NS/NC 99

A TODOS

P.19. Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos 6 meses, ¿ha ido usted al dentista, protésico o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.19b
- N/C 9 ⇒ Pasar P.19b

P.19a ¿Cuántas veces? Veces ⇒ Pasar P.19c

- NS/NC 99

P.19b. Si no ha ido en los últimos 6 meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico o higienista dental?

años meses

- Nunca he ido al dentista 97
- No recuerda 98 } P.20
- NS/NC 99

P.19c. ¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Sí	No	N/C
▪ Revisión o chequeo	1	2	9
▪ Limpieza de boca	1	2	9
▪ Empastes (obturaciones)	1	2	9
▪ Extracción de algún diente o muela	1	2	9
▪ Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	1	2	9
▪ Tratamiento de las enfermedades de las encías	1	2	9
▪ Ortodoncia	1	2	9
▪ Selladores, aplicación de flúor ...	1	2	9
▪ Otros motivos	1	2	9

P.19d. El dentista al que consultó esta última vez era

- De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas, Adeslas, Asisa) 2
- Dentista privado/particular 3
- Otros especificar 4

A TODOS

P.20. Durante los últimos doce meses, hasta el día de ayer, ¿ha estado usted ingresado en un hospital, al menos durante una noche?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.21
- N/C 9 ⇒ Pasar P.21

P.20a. ¿Cuántas veces ha estado usted hospitalizado en estos últimos doce meses?

- Veces
- NS/NC 99

P.20b. ¿Estuvo usted en la lista de espera por ese motivo?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.21
- N/C 9 ⇒ Pasar P.21

P.20c. ¿Cuánto tiempo en meses? (si menos de un mes contabilizar como "cero" meses)

meses

- NS/NC 99

A TODOS

P.21. En estos últimos doce meses, ¿ha tenido usted que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia, no de otro familiar?

- Sí, acudí a un centro o servicio 1
- Sí, acudieron a mi domicilio 2
- No 3 ⇒ P.22
- NS/NC 9 ⇒ P.22

P.21a. Y en total, ¿cuántas veces tuvo usted que utilizar algún servicio de urgencias en estos últimos 12 meses?

Veces

- NS/NC 99

P.21b. Refiriéndonos a la última vez que utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, ¿dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a ...?

- Un hospital de la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud) 1
- Un servicio de urgencias no hospitalario de la S.S./S.A.S. 2
- Un servicio privado urgencia 3
- Un sanatorio, hospital o clínica privada 4 } P.22
- Otras respuestas 5
- NS/NC 9

P.21c. ¿Por qué fue usted a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social?

- Se lo mandó el médico 1
- Usted, sus familiares lo consideraron necesario 2
- NS/NC 9

A TODOS

P.22. ¿Podría decirme ahora, si es usted titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que le cito a continuación? (máximo 2 respuestas)

- Seguridad social 1
- Mutualidades del Estado (Muface, Isfas, etc.):
 - Acogidos a la Seguridad Social 2
 - Acogidos a un seguro privado 3
- Seguro Médico concertado individualmente (Sanitas, colegios profesionales, etc.) 4
- Seguro Médico concertado por su empresa 5
- No tengo seguro médico 6
- Otros 7
- NS/NC 9

P.23. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)?. En caso de que fume o haya fumado, ¿a qué edad empezó a fumar?

- Sí, fuma diariamente 1
 - Sí fuma pero no diariamente 2 ⇒ **P.24a**
 - No fuma, pero ha fumado 3 ⇒ **P.25**
- Edad de inicio: años

- No fuma ni ha fumado nunca de manera habitual 4 ⇒ **P.26**
- N/C 9 ⇒ **P.26**

P.24. ¿Qué cantidad de tabaco fuma usted por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

P.24a. Y durante las últimas dos semanas, ¿Ha fumado usted alguno de los siguientes **TIPOS DE TABACO**?

	Sí	No	NC
▪ Tabaco negro	1	2	9
▪ Tabaco rubio	1	2	9
▪ Mezcla de tabaco rubio y negro, picadura o tabaco de liar	1	2	9
▪ Mezcla de tabaco con marihuana o hachis	1	2	9
▪ Marihuana o hachis sin mezclar con tabaco)	1	2	9
▪ Otros	1	2	9

P.24b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

- Más 1
- Igual 2
- Menos 3
- NC 9

P.24c. Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar?

- Sí 1
- No 2
- No he acudido/consultado al médico 3
- NC 9

P.24d. ¿Ha intentado alguna vez dejar de fumar?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.24f**
- NC 3 ⇒ **P.24f**

¿Cuántas veces?

P.24e. Y, ¿cuánto tiempo hace que intentó dejar de fumar? (si fueron varios intentos, de la última vez)

- Hace más de 5 años 1
- Entre 5 y 1 año 2
- Hace menos de 1 año 3
- NS 4

P.24f. ¿Le gustaría dejar de fumar?

- No 1
- Sí, le gustaría 2
- No lo ha pensado 3
- No lo sabe 4
- NC 9

(Hacer P.25 hasta P.25b sólo a los exfumadores, dígito 3 en P.23). Resto, pasar a P.26

P.25. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

Meses años

- NS/NC 9999

P.25a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión?

- Me lo aconsejó el médico 1
- Sentía molestias por causa del tabaco 2
- Aumentó mi preocupación por sus efectos nocivos 3
- Sentí que disminuía mi rendimiento psíquico o físico 4
- Lo decidí por propia voluntad 5
- Otros motivos 6

P.25b. ¿Qué cantidad de tabaco fumaba por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

A TODOS

P.26. ¿Tiene algún compañero de trabajo que fuma habitualmente en su lugar de trabajo, de manera que le llega el humo del tabaco?

- Sí 1 ⇒ **P.26a**
- No 2
- No procede (no trabaja o trabaja sola/o) 3
- NC 9

P.26a. ¿Cuántas personas fuman habitualmente cerca de usted en el trabajo?

Personas

P.27. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa?

- Sí 1 ⇒ **P.27a**
- No 2
- No procede (vive sola/o) 3
- NC 9

P.27a. ¿Cuántas personas fuman habitualmente en su casa?

Personas

P.28. Fuera de casa, o del trabajo ¿cuánto tiempo al día, de media, pasa en ambientes cargados de humo de tabaco durante los días de diario) ¿y durante los fines de semana?

	Nunca	Menos de una hora	De 1 a 4 horas	Más de 4 horas	NS/NC
▪ Días de diario (de lunes a viernes)	1	2	3	4	9
▪ Fin de semana (sábado y domingo)	1	2	3	4	9

A TODOS

P.29. Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independiente de su graduación. ¿Consumes Vd. algún tipo de bebida alcohólica con una frecuencia de al menos una vez al mes?

- Sí 1
 - No, menos de una vez al mes 2
 - No, no consume bebidas alcohólicas..... 3
 - NS/NC 9
- } Pasar P.33

P.29a. ¿Ha bebido usted en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.30. Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume?

	P.30.										P.30a.	
	3-4 veces al día	2 veces al día	1 vez al día	5-6 veces semana	3-4 veces semana	1-2 veces semana	2-3 veces mes	1 vez mes	< 1/mes pero al menos 1 vez año	< 1 vez año o Nunca	N/C	Nº vasos cada vez
• Vino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Cerveza, sidra, tinto de verano ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Jerez, vermouth.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Champán, cava.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>
• Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input type="text"/>

P.30a. ¿Cuál es la cantidad de vasos o copas que toma cada vez que bebe? _____

P.31. Para cada una de esas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluido viernes por la tarde), sólo en días laborables o en ambos indistintamente?

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	N/C
• Vino	1	2	3	9
• Cerveza, sidra, tinto de verano	1	2	3	9
• Jerez, vermouth	1	2	3	9
• Champán o cava.....	1	2	3	9
• Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, ..) ...	1	2	3	9
• Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)	1	2	3	9

P.31a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular?
(Entrevistador/a: no se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por sí solo)

años

P.32. ¿Ha pensando alguna vez que debería beber menos?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32a. ¿Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32b. ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.32c. ¿Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o para evitar la resaca?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

A TODOS

P.33. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme habitualmente?

- Horas
 ▪ NS/NC 99

P.34. Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. De las siguientes, ¿cuál diría usted que describe mejor su actividad principal?

- Sentado la mayor parte de la jornada 1
- De pie la mayor parte sin grandes desplazamientos o esfuerzos 2
- Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 3
- Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 4
- NS/NC 9

A TODOS

P.35. En relación a sus hábitos alimentarios ¿qué suele desayunar habitualmente?

- Café, leche, té, chocolate, cacao, yogur, etc..... 1
- Pan, tostadas, galletas, cereales, bollería, etc2
- Fruta y/o zumo 3
- Alimentos como huevos, queso, jamón, etc ... 4
- Otro tipo de alimentos 5
- Nada, no suele desayunar 6
- Ns/Nc 9

P.36. Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga con qué frecuencia los consume Ud. (MOSTRAR TARJETA C)

	A diario	Tres o más veces a la semana	Una/dos veces a la semana	Menos de 1 vez semana	Nunca o casi nunca	N/C
• Leche y derivados (yogur, postres lácteos, queso, ...)	1	2	3	4	5	9
• Pan, cereales	1	2	3	4	5	9
• Legumbres (lentejas, judías, garbanzos)	1	2	3	4	5	9
• Pasta (fideos, macarrones, espaguetis, ...) arroz, patatas	1	2	3	4	5	9
• Fruta fresca	1	2	3	4	5	9
• Verduras y hortalizas	1	2	3	4	5	9
• Carne	1	2	3	4	5	9
• Embutidos	1	2	3	4	5	9
• Pescado	1	2	3	4	5	9
• Huevos	1	2	3	4	5	9
• Dulces (galletas, mermelada, chocolate)	1	2	3	4	5	9

P.37. Pasando a otro tema, querríamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña

- Sí 1 ⇨ **P.37a**
- No 2 ⇨ **P.38**
- NC 3 ⇨ **P.38**

P.34a. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre?. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre

- No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, TV., cine, etc.) .. 1
- Alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar, pasear en bici, jardinería, gimnasia suave, etc.) 2
- Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, etc.) .. 3
- Entrenamiento físico varias veces a la semana (incluye actividad física varias veces a la semana) 4
- NS/NC 9

P.34b. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.37a. ¿Quién se lo indicó?

- El médico, por mi edad 1
- El médico, por mis enfermedades 2
- Me ponen la vacuna en la empresa/ centro de estudio 3
- Yo solicité la vacuna porque prefiero estar vacunado 4
- El médico, por otras razones 5
- Otros 6
- NS/NC 9

A TODOS (Las siguientes preguntas se refieren a prácticas preventivas en relación con la salud)

P.38. En los últimos 12 meses, es decir, desde finales de de 2006 hasta hoy, ¿diría usted que su estado de salud ha sido ...?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4
- Muy malo 5
- NS/NC 9

P.38a. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (marque sólo una o el más usado)

- No 1 ⇒ **P.38b**
 - Usa píldoras 2
 - Tiene DIU 3
 - Usa inyecciones 4
 - Usa preservativo o condón 5
 - Evita los días fértiles, uso método de ritmo de calendario 6
 - Usa diafragma, espuma o gel 7
 - Se practicó esterilización femenina ... 8
 - Se practicó esterilización masculina .. 9
 - Realiza coito interrumpido 10
 - Otros, especificar 11
- P.39**

P.38b. Si usted o su pareja no usan ningún método anticonceptivo, indique cuál es la principal razón para no usarlo (única respuesta)

- No lo necesita (no tiene relaciones, por la edad, infértil, postparto) 1
- Está embarazada 2
- Quiere quedar embarazada 3
- Se opone al uso de anticonceptivos (su religión se lo prohíbe, su pareja se opone, otros se oponen) 4
- Por razones de salud (temor a efectos secundarios, le es incómodo, molesto) 5
- No conoce los métodos anticonceptivos 6
- Por su precio, no puede comprarlo 7
- Otra, especificar

ÚNICAMENTE MUJERES. RESTO, PASAR A P.42

P.39 ¿Ha acudido alguna vez a su ginecólogo?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.40**
- NC 3 ⇒ **P.40**

P.39a ¿Cuándo ha efectuado la última visita a un ginecólogo por algún motivo distinto a los relacionados con un embarazo o parto?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 años 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4
- Nunca ha ido por motivos diferentes al embarazo o parto 9

P.39b ¿Podría decirme el motivo de la última consulta (que no sea embarazo/parto)?

- Algún problema Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4
- Nunca ha ido por motivos diferentes al embarazo o parto 9

P.40. ¿Le han hecho alguna vez una mamografía (radiografía de mama) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.40**
- NS/NC 9 ⇒ **P.40**

P.40a. ¿Cuándo le han hecho la última mamografía?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.41. ¿Le han hecho alguna vez una citología vaginal (muestra de células) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.42**
- NS/NC 9 ⇒ **P.42**

P.41a. ¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

A TODOS

P.42 En el pasado verano, cuándo estuvo al aire libre, ¿con qué frecuencia utilizó...?. Piense en una escala de 0 a 10, donde 0 sería nunca y 10 siempre

	Nunca	Casi nunca			Algunas veces			Casi siempre			Siempre
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Crema solar con factor de protección de 15 o mayor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Camiseta para protegerse del sol.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Gorra o sombrero para protegerse del sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ Gafas de sol para protegerse del sol.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▪ La sombra para evitar el sol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P.42a En el pasado verano, ¿con qué frecuencia (utilizando la misma escala de 0 a 10) se expuso al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde?

Nunca	Casi nunca			Algunas veces			Casi siempre			Siempre
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P.43 ¿Ha utilizado en los últimos 5 años cabinas o lámpara de rayos ultravioleta (uva)?

No, nunca	Si, alguna vez	Si, muchas veces
0	1	2

SÓLO SI EL ENTREVISTADO/A TIENE 65 AÑOS O MÁS. RESTO PASAR A P.57

P.54. Las preguntas que siguen se refieren a sus actividades cotidianas y cuidados personales	
P.54.1. ¿Es usted capaz de hacer las tareas de la casa?	
▪ Sin ayuda (limpiar, fregar el suelo, etc.)	0
▪ Con alguna ayuda (puede hacer las cosas menos laboriosas pero necesita ayuda para los trabajos pesados) ..	3
▪ No puede realizar las tareas domésticas en absoluto	5
P.54.2. ¿Es usted capaz de prepararse la comida?	
▪ Sin ayuda (planea y cocina comidas completas por sí mismo)	0
▪ Con alguna ayuda (puede preparar algunas cosas pero es incapaz de preparar la comida)	2
▪ No puede prepararse la comida en absoluto	4
P.54.3. ¿Es usted capaz de irse de compras?	
▪ Sin ayuda (se encarga personalmente de las compras necesarias)	0
▪ Con alguna ayuda (necesita que alguien le acompañe en todas sus compras)	2
▪ No puede hacer compras en absoluto	4
P.54.4. ¿Es usted capaz de manejar dinero (pagar facturas, contar dinero)?	
▪ Sin ayuda (pagar facturas, contar el cambio, etc.)	0
▪ Con alguna ayuda (aunque puede arreglarse con el dinero en el bolsillo, necesita ayuda para pagar facturas o manejar cheques bancarios)	2
▪ No puede manejar el dinero en absoluto	4
P.54.5. ¿Es usted capaz de usar el teléfono?	
▪ Sin ayuda (incluyendo buscar y marcar números)	0
▪ Con alguna ayuda (puede contestar el teléfono y llamar a números de emergencia –091- o los números más habituales, pero necesita un teléfono especial o ayuda para buscar y marcar números)	1
▪ No puede usar el teléfono en absoluto	3
P.54.6. ¿Es usted capaz de tomar su medicación?	
▪ Sin ayuda (las dosis correctas a la hora oportuna)	0
▪ Con alguna ayuda (puede tomar su medicación si alguien se la prepara y/o se lo recuerda)	2
▪ Es totalmente incapaz de tomar su medicación	4
P.54.7. ¿Es usted capaz de subir y bajar escaleras?	
▪ Sin ayuda (se incluyen cualquier instrumento de ayuda para andar)	0
▪ Con alguna ayuda	2
▪ Es totalmente incapaz de subir y bajar escaleras	5
P.54.8. ¿Es usted capaz de usar el water (o el sillón con escupidera)?	
▪ Sin ayuda (puede alcanzar la taza/sillón con escupidera, desvestirse lo necesario, limpiarse y salir)	0
▪ Con alguna ayuda (puede hacer algunas cosas, incluido limpiarse)	5
▪ No puede usar la taza/sillón de water	8
P.54.9. ¿Se le escapa la orina? (incontinencia urinaria)?	
▪ No	0
▪ Pocas veces	6
▪ A menudo o necesita ayuda con el catéter/sonda de orina	8
P.54.10. ¿Se le escapa la caca? (incontinencia fecal)	
▪ No	0
▪ Pocas veces (menos de una vez al día)	6
▪ A menudo o necesita enemas	9
P.54.11. ¿Es usted capaz de usar el baño o la ducha?	
▪ Sin ayuda (puede entrar y salir de la bañera o ducharse sin ayuda o supervisión de nadie)	0
▪ Necesita ayuda para bañarse o ducharse	6
P.54.12. ¿Es usted capaz de arreglarse (por ejemplo peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.)?	
▪ Sin ayuda (si alguien le da las cosas si fuera necesario)	0
▪ Con ayuda	5
P.54.13. ¿Es usted capaz de vestirse solo?	
▪ Sin ayuda (incluido botones, cremalleras, cordones, etc.)	0
▪ Con ayuda (puede hacerlo a medias sin ayuda)	3
▪ No puede vestirse solo	6
P.54.14. ¿Es usted capaz de comer solo?	
▪ Sin ayuda	0
▪ Con algo de ayuda (para cortar los alimentos, untar la mantequilla, etc.)	5
▪ No puede comer solo	8

P.58. ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1 ⇒ **P.59**
- Soltero/a 2
- Separado/a 3
- Divorciado/a 4
- Viudo/a 5
- NS/NC 9

P.58a. ¿Vive usted actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2
- No contesta 9

P.59. ¿Cuál fue su lugar de nacimiento?

Provincia:

Extranjero: País:

P.60. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso)..... 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) ... 4
- Estudios de FP I 5
- Estudios de FP II 6
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 7
- Estudios universitarios de grado medio 8
- Estudios universitarios de grado superior 9
- Otros estudios, especificar 10

P.61. ¿Cuál es su situación laboral actual?

- Trabaja 1 ⇒ **P.63a**
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

→ **¿Cuántos meses en paro?**

P.62. ¿Percibe usted alguna pensión (pública o privada)?

- Sí 1 ⇒ **¿Cuál?**
- No 2
- NC 9

P.63. ¿Ha trabajado anteriormente?

- Sí 1 ⇒ **Pasar a P.63a**
- No 2 ⇒ **Pasar a P.71**
- NS/NC 9 ⇒ **Pasar a P.71**

(Entrevistador: como resultado de las preguntas anteriores, debe quedar clara la situación de la persona entrevistada:

- Trabaja o ha trabajado anteriormente (pasar a P.63a)
- No trabaja ni ha trabajado anteriormente (pasar a P.71)

PARA LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO

P.63a. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba?

P.63b. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?

P.63c. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados .. 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO, PASAR A P.71

P.64. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?

- Trabaja por su cuenta o no es asalariado 1
- Funcionario/estatutario 2
- Contrato indefinido 3
- Contrato temporal de menos de 6 meses 4
- Contrato temporal de 6 meses a 1 año 5
- Contrato temporal de más de 1 a 2 años 6
- Contrato temporal de más de 2 años 7
- Contrato temporal sin especificar duración 8
- Sin contrato 9
- Otra relación 0
- NS/NC x

P.64a. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual empresa?

 años meses

P.64b. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

- Jornada partida 1
- Jornada continua de mañana 2
- Jornada continua de tarde 3
- Jornada continua nocturna 4
- Turnos 5
- Otra posibilidad 6
- NS/NC 9

P.64c. En total, ¿cuántas horas trabaja usted habitualmente a la semana?

 horas

P.64d. ¿Cuánto tiempo tarda en todos sus desplazamientos para ir y volver de trabajar al día?

 horas minutos

P.54.15. ¿Es usted capaz de salir a caminar?		
▪ Unos 50 metros o más sin ayudas		0
▪ Unos cuantos metros (menos de 50 metros)		4
▪ Es totalmente incapaz de caminar por fuera de casa		6
P.54.16. ¿Es usted capaz de moverse por su casa?		
▪ Sin ayuda (con bastón o muletas si los usa)		0
▪ Con alguna ayuda (bajo la supervisión de alguien no especializado)		5
▪ En silla de ruedas sin ayuda (incluidas puertas y esquinas)		4
▪ Necesita ayuda física para moverse		7
P.54.17. ¿Es usted capaz de moverse desde la cama hasta una silla que esté al lado de la misma?		
▪ Sin ayuda		0
▪ Con alguna ayuda (de alguien que supervise para mayor seguridad)		4
▪ Con mucha ayuda (de una persona fuerte o entrenada o dos no especializados para sentarse)		6
▪ Es usted completamente incapaz (no mantiene el equilibrio sentado y necesita dos personas)		7
SÓLO A LOS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.54.1. A P.54.7 ó P.54.15 (AVDs INSTRUMENTALES)		
P.55. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?		
▪ Nadie		1
▪ Su pareja		2
▪ Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL: _____).....		3
▪ Un familiar que no vive con usted		4
▪ Un amigo o alguien que no cobra por eso		5
▪ Ayuda privada (pagada)		6
▪ Ayuda pública:		
▪ Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales		7
▪ Enfermera del centro de salud o ambulatorio		8
▪ Voluntariado		9
▪ Otro		10
SÓLO A LOS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.54.8 A P.54.14 ó P.54.16 ó P.54.17 (AVDs BÁSICAS)		
P.56. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?		
▪ Nadie		1
▪ Su pareja		2
▪ Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL: _____).....		3
▪ Un familiar que no vive con usted		4
▪ Un amigo o alguien que no cobra por eso		5
▪ Ayuda privada (pagada)		6
▪ Ayuda pública:		
▪ Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales		7
▪ Enfermera del centro de salud o ambulatorio		8
▪ Voluntariado		9
▪ Otro		10

A TODOS

P.57. En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por nosotros o nos proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según la escala de 5 a 1, en la que "5" significa "TANTO COMO DESEA", "4" "casi como desea", "3" "ni mucho ni poco", "2" "menos de lo que desea" y "1" significa "MUCHO MENOS DE LO QUE DESEA" (Mostrar Tarjeta D)

		Tanto como deseo	Casi como deseo	Ni mucho ni poco	Menos de lo que deseo	Mucho menos de lo que deseo
P.57.1.	Recibo visitas de mis amigos y familiares	5	4	3	2	1
P.57.2.	Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa	5	4	3	2	1
P.57.3.	Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo	5	4	3	2	1
P.57.4.	Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede	5	4	3	2	1
P.57.5.	Recibo amor y afecto	5	4	3	2	1
P.57.6.	Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo y/o en la casa	5	4	3	2	1
P.57.7.	Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares	5	4	3	2	1
P.57.8.	Tengo posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos ..	5	4	3	2	1
P.57.9.	Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas	5	4	3	2	1
P.57.10.	Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida	5	4	3	2	1
P.57.11.	Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama	5	4	3	2	1

P.64e. ¿Cuántas personas trabajan bajo su responsabilidad?

- Ninguna 1
- De 1 a 5 2
- De 6 a 9 3
- De 10 a 20 4
- Más de 20 5
- NS/NC 9

P.65. Entre las tareas que realiza en su trabajo, ¿en qué medida está usted expuesto a ...?

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Nunca	NS/NC
▪ Vibraciones provenientes de herramientas o máquinas	1	2	3	4	9
▪ Ruido tan alto que tiene que levantar la voz para hablar con otra gente ...	1	2	3	4	9
▪ Altas temperaturas que le producen sudor	1	2	3	4	9
▪ Bajas temperaturas	1	2	3	4	9
▪ Respirar vapores, humos, polvo, o sustancias peligrosas como químicos, material infeccioso, etc.	1	2	3	4	9
▪ Manejar o tocar sustancias o productos peligrosos	1	2	3	4	9
▪ Radiaciones como rayos X, soldadura, rayos láser	1	2	3	4	9
▪ Posiciones dolorosas / fatigantes	1	2	3	4	9
▪ Tareas repetitivas de menos de 10 minutos	1	2	3	4	9
▪ Movimientos repetitivos de manos o brazos	1	2	3	4	9
▪ Uso de equipo de protección individual	1	2	3	4	9
▪ Trabajar con ordenadores	1	2	3	4	9
▪ Trabajar a un ritmo muy rápido	1	2	3	4	9
▪ Trabajar con plazos inflexibles / rígidos	1	2	3	4	9
▪ Conducir vehículos (escavadoras, camiones, coches)	1	2	3	4	9
▪ Relacionarse con gente que no son compañeros (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, ...)	1	2	3	4	9
▪ Periodos largos de intensa concentración	1	2	3	4	9
▪ Manipular cargas pesadas (más de 15 kgrs)	1	2	3	4	9
▪ Llevarse trabajo para casa	1	2	3	4	9
▪ Trabajar los fines de semana (sábado y/o domingo exclusivamente)	1	2	3	4	9

P.66. Y, en su actual puesto de trabajo, ¿en qué medida ...?

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Nunca	NS/NC
▪ Puede decidir cuándo hacer el trabajo	1	2	3	4	9
▪ Puede decidir su propio ritmo de trabajo	1	2	3	4	9
▪ Tiene margen de libertad para decidir cómo hacer su trabajo	1	2	3	4	9
▪ Su trabajo requiere aprender cosas nuevas	1	2	3	4	9
▪ Su trabajo es monótono	1	2	3	4	9
▪ Su trabajo le permite desarrollar sus habilidades	1	2	3	4	9
▪ Su trabajo requiere hacer tareas muy complicadas	1	2	3	4	9
▪ Puede influir en las decisiones que afectan a su servicio, departamento o unidad	1	2	3	4	9
▪ En su trabajo está poco claro cuáles son las funciones y tareas de los trabajadores	1	2	3	4	9
▪ En su trabajo puede contar con la ayuda de sus compañeros si la necesita	1	2	3	4	9
▪ ¿Sus compañeros son hostiles o conflictivos con usted?	1	2	3	4	9
▪ En general tiene una buena relación con sus compañeros	1	2	3	4	9
▪ A su superior inmediato ¿le preocupa el bienestar de los que trabajan con él?	1	2	3	4	9
▪ Los jefes (superiores inmediatos) apoyan a los trabajadores	1	2	3	4	9
▪ Los jefes (superiores inmediatos) valoran las ideas aportadas por los empleados	1	2	3	4	9

P.67. ¿En qué medida está usted satisfecho con el trabajo que actualmente realiza?

Nada satisfecho					Totalmente satisfecho	
1	2	3	4	5	6	7

P.68. La empresa donde usted trabaja, ¿cuántos empleados tiene?

- Ninguno 1
- De 1 a 9 2
- De 10 a 49 3
- De 50 a 99 4
- De 100 a 499 5
- 500 ó más 6
- No sabe 8
- No contesta 9

P.69. ¿Piensa usted que su trabajo afecta negativamente a su salud?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.70**
- NC 3 ⇒ **P.70**

P.69a. ¿De qué forma afecta su trabajo a su salud?

	Sí	No
▪ Tiene dolores de espalda	1	2
▪ Se siente nervioso y estresado	1	2
▪ Se siente agotado a todas horas	1	2
▪ Tiene dolores musculares	1	2
▪ Tiene dolores de cabeza	1	2
▪ Tiene problemas de sueño	1	2
▪ Otro problema, ¿cuál?	1	
.....		

P.70. En los últimos 12 meses, ¿cuántos días ha estado ausente de su trabajo debido a problemas de salud causados por su trabajo?

□ □ □ días

P.70a. En su empresa

	Sí	No	NS/NC
▪ Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?	1	2	9
▪ Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?	1	2	9
▪ Le han realizado algún reconocimiento médico ?	1	2	9
▪ Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?	1	2	9
▪ Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?	1	2	9

P.70b. Y, ¿sobre los riesgos que implican el uso de los materiales, instrumentos o productos que utiliza en su trabajo, usted diría que está ...

- Bastante o muy bien informado 1
- Bien o suficientemente informado 2
- Mal o insuficientemente informado .. 3
- Bastante o muy mal informado 4

A TODOS

P.71. ¿Con los ingresos de su hogar, cómo suele llegar usted, o en su caso, usted y su familia, en la actualidad a fin de mes?

- Con mucha dificultad 1
- Con dificultad 2
- Con cierta/alguna dificultad 3
- Con cierta/alguna facilidad 4
- Con facilidad 5
- Con mucha facilidad 6

P.72. Por favor, indique el intervalo en el que están comprendidos los ingresos totales netos de su hogar, sumando todas las fuentes (si existe más de una) y deduciendo las retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos asimilados (MOSTRAR TARJETA E)

- Hasta 499 € 1
- De 500 a 999 € 2
- De 1.000 a 1.499 € 3
- De 1.500 a 1.999 € 4
- De 2.000 a 2.499 € 5
- De 2.500 a 2.999 € 6
- De 3.000 a 4.999 € 7
- Más de 5.000 € 8
- No sabe leer, no está seguro 0
- No contesta 9

ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el/la esposo/a o pareja (conviviente) de la persona entrevistada.

P.73. ¿Está usted casado/a y/o vive actualmente en pareja?

- Sí 1 ⇒ **P.74**
- No 2 ⇒ **FIN**
- No contesta 9 ⇒ **FIN**

P.74. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por su esposa/a y/o pareja?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) ... 4
- Estudios de FP I 5
- Estudios de FP II 6
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 7
- Estudios universitarios de grado medio 8
- Estudios universitarios de grado superior 9
- Otros estudios, especificar 10

.....

P.74a. ¿Cuál es la situación laboral actual de su esposo/a y/o pareja?

- Trabaja 1 ⇒ **P.74.c**
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

► ¿Cuántos meses en paro? □ □ □

P.74b. ¿Percibe su esposo/a y/o pareja alguna pensión (pública o privada)?

- Sí1 ⇨ ¿Cuál?
- No2
- NC9

P.74c. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o la última empresa en la que ha trabajado su esposo/a y/o pareja?

.....

--	--	--

P.74d. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado su esposo/a y/o pareja?

.....

--	--	--

P.74e. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o la última categoría profesional en la que ha trabajado su esposo/a y/o pareja?

- Trabajador por cuenta propi sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

DATOS DE LA ENTREVISTA

TRIMESTRE	1	2	3	4
-----------	---	---	---	---

SEMANA DEL TRIMESTRE	1	2	3	4
----------------------	---	---	---	---

FECHA DE REALIZACIÓN:

Día: Mes: Año:

DÍA DE LA SEMANA:

- Lunes 1 Viernes 5
- Martes 2 Sábado 6
- Miércoles 3 Domingo 7
- Jueves 4

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA:

--

 minutos

HORA DE REALIZACIÓN:

- Mañana (9-12) 1 Tarde (4-8) 3
- Mediodía (12-4) 2 Noche (8-10) 4

SINCERIDAD DEL ENTREVISTADO:

- Mucha 1 Poca 3
- Bastante 2 Ninguna 4

LOS SIGUIENTES CUADROS TIENEN QUE VENIR SIEMPRE RELLENOS

<p>NOMBRE DEL/LA ENTREVISTADOR/A</p> <p>.....</p> <p>SUPERVISOR/A</p> <p>.....</p> <p>OBSERVACIONES</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A</p> <p>La persona entrevistada ha sido seleccionada de acuerdo a los criterios marcados para este estudio y la entrevista ha sido cumplimentada en su totalidad con esta persona.</p> <p>Entrevistador/a</p> <p>..... de de 2.003</p> <p><i>(fecha)</i></p> <p>El/la entrevistador/a</p>
--	---



VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN DE LA ENTREVISTA:

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:	
DIRECCIÓN:	
CÓDIGO POSTAL :	LOCALIDAD:
PROVINCIA:	TELÉFONO CONTACTO:

