

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.



¿Cómo es?

Hierba vivaz, perenne, con rizoma ramificado. Tallos erectos, de hasta 70 cm de altura, con más de 2 nudos y hojas numerosas, glaucos, escábridos. Hojas dísticas, con lígula corta, de extremo redondeado, limbo generalmente convoluto, patente, frecuentemente curvado y en disposición dística, con nervios numerosos y muy marcados. Inflorescencia en racimo, espiga con raquis rígido o flexuoso, con 1-9 espiguillas, lineares, glabras, con 10-18 flores, en las que son llamativas las anteras, colgantes y con forma de aspa. Fruto de tipo cariopsiside.

¿Dónde crece?

En pastizales entre matorrales, bajo pinares, en suelos secos. Indiferente al tipo de sustrato.

¿Dónde podemos encontrarla?

Distribución mediterránea.

¿Sabías qué?

Se encuentra incluida en la Lista Roja de la Flora Vasculare de Andalucía Categoría "Preocupación menor". Las formaciones vegetales que constituye, los lastonares, son hábitat de interés comunitario prioritario: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodieta* (HIC 6220*). Tiene usos medicinales como hipotensor, antidiarréico, astringente, diurético, y antiinflamatorio. También se usa en jardinería y para la protección, estabilización y fijación del suelo en taludes secos y pedregosos.

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HOJAS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| FLORES | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| FRUTOS | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |