

RENDINA SIERRA-CAZORLA

PERFIL NÚMERO: J-06-(1-2)
COORDENADAS UTM: X = 493.644 ; Y = 4188.011
USO ACTUAL: PASTOS
ELEVACIÓN: 680 METROS
PENDIENTE: 9 %
RELIEVE: NORMAL
EROSIÓN: MODERADA
DRENAJE: BUENO
PEDREGOSIDAD: ESCASAS PIEDRAS
ROCOSIDAD: FRECUENTES AFLORAMIENTOS
MATERIAL ORIGINAL: MARGA (CRETÁCICO)
POSICIÓN FISIAGRÁFICA: COLINA
CLASIFICACIÓN: RENDOLIC XEROCHREPTS
OBSERVADOR Y FECHA: J. L. MUDARRA; MAYO 1961.

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
A1	0-35 CM.; BLANCO (2.5Y8/), EN SECO; GRIS PARDUZCO CLARO (2.5Y6/2), EN HÚMEDO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA SUBANGULAR, FINA; LIGERAMENTE PLÁSTICO EN MOJADO, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO, DURO EN SECO; FRECUENTES RAÍCES, FINAS; REACCIÓN FUERTE; LIMITE NETO Y ONDULADO.
C	35- CM.; PARDOS MUY PÁLIDOS (10YR8/3), EN SECO; AMARILLO PARDUZCO (10YR6/6), EN HÚMEDO; FRANCO-ARCILLOSO; ESTRUCTURA MASIVA, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO, DURO EN SECO; REACCIÓN FUERTE.
REFERENCIA:	J. L. MUDARRA ET AL. 1976. ESTUDIO GENERAL DE LOS SUELOS DE SIERRA MORENA Y CUENCA ALTA DEL GUADALQUIVIR. PUB. INT. CEBAC. SEVILLA.



J-06-(1-2): RENDSINA SIERRA-CAZORLA (RENDOLIC XEROCHREPTS)

J-06-(1-2) : RENDSINA SIERRA-CAZORLA

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
A1	0 - 35	7,7	6,5	0,94	0,11	8,5				
C	35 -	7,5	6,3	0,14	0,02	7,0				

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
A1		----- (MEQ/L) -----							
C									

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
A1	44,00	4,2	1,1	0,3	0,8		6,50	98
C	41,60	12,0	2,1	0,5	0,3		15,00	99

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
A1				----- (% EN PESO) -----						
C							3,9	21,8	28,6	45,3
							4,3	20,9	33,6	39,4

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.