



¿Cómo es?

Se trata de un árbol que puede superar los 15 m de altura. Posee unas ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes. Su corteza es gris, lisa, con yemas de 9-13 mm, cónico-ovoides y agudas, siendo tomentosas. Hojas imparipinnadas, a veces glabras y con frecuencia pelosas. Con 5 a 7 pares de folíolos, sentados o casi sentados. De bordes aserrados forma oblongo-lanceolada a oblongo elíptica. Tiene una inflorescencia corimbiforme, con las ramas densamente pelosas en la floración y más tarde casi glabras. Flores con pequeños sépalos, con algunos dientes laterales, pelosos. Pétalos de 5-6 x 3-4 mm, patentes y unguiculados, glabros o casi; de color blanco. Fruto tipo pomo de 5-11 x 6-11 mm, subgloboso, rojo o rojo-anaranjado, generalmente. Posee una carne homogénea con esclereidas poco numerosas.

Resulta sencillo de diferenciar del resto de *Sorbus* presentes en el territorio por sus hojas imparipinnadas. Carácter que comparte junto con el *S. domestica*, sin embargo se diferencia de este último en sus yemas, tomentosas en lugar de viscosas, y en sus frutos maduros, pomos de un rojo imperial y de menor tamaño.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Hoya de Pedraza. Carretera de la Sierra, km 27, Monachil (Granada). Tfno.: 670 945 712 - 697 958 939. Email: jbotanico.pedraza.csmaea@juntadeandalucia.es

Serbal de los cazadores

Sorbus aucuparia L.

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

¿Dónde crece?

En la naturaleza vive en hayedos, abedulares, robledales, etc. Aunque es más frecuente sobre sustrato silíceo también aparece en sustrato calcáreo. En el piso mesomediterráneo a supramediterráneo, entre los 600 - 2.300 m snm.

¿Dónde podemos encontrarla?

Planta de distribución eminentemente euroasiática, con presencia en Europa, Siberia, el Cáucaso, Asia menor, norte de Irán, Islandia, Groenlandia y naturalizada en Madeira. En la Península Ibérica se localiza en la mitad norte y está citada en Sierra Nevada y Sierra de la Sagra sin que se haya podido confirmar hasta la fecha. Siendo probable que todos los ejemplares encontrados procedan de cultivo.

¿Sabías qué?

El epíteto específico de la especie (*aucuparia*) procede del latín y está relacionado con la caza de aves. De ahí parece provenir también su nombre vernáculo ya que se usaban los propios frutos para atraer a las aves y cazarlas por lo llamativos (por su color) y la gran cantidad que producen sus árboles.

Usos medicinales parece haber tenido pocos ya que los frutos son algo tóxicos aunque posee propiedades astringentes y se ha usado tanto para detener diarreas como aliviar y curar hemorroides.

Se trata de un árbol citado en el siglo pasado en Sierra Nevada en la Dehesa de Camarate por P. Prieto (1975) y en la Sierra de la Sagra por A.M. Negrillo & G. Marín Calderón (1985). Ambas citas se han considerado como dudosas o no referidas a plantas naturales si no cultivadas. Por lo que, hasta la fecha, no se han localizado poblaciones naturales de esta planta.

¿Quieres visitar el jardín? [Pincha aquí](#)

¿Quieres conocer esta planta en iNaturalist? [Pincha aquí](#)

Visita la colección de la Red de Jardines Botánicos y Micológico en iNaturalist [Pincha aquí](#)



Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad
y Medio Ambiente