2024 /JUN

Espino negro, cambrón o escambrón

Rhamnus lycioides L. subsp *velutina*

Cneorum tricoccon

JARDÍN BOTÁNICO DETUNDA-CUEVA DE NERJA

P. N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

RED ANDALUZA JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC



¿Dónde podemos encontrarla?

Es un endemismo bético-magrebí. Frecuente en su mitad oriental, siendo más esporádico en el sur de Andalucía occidental, con presencia en las provincias de Almería, Granada (Trevenque, Alpujarras y Almijara) y Málaga (Almijara y Ronda).

¿Sabías qué?

En función de la forma de las hojas se diferencian tres subespecies: la subsp. *Laderoi*, principalmente del O de la península ibérica; la subsp. *borgiae* del levante peninsular y ésta, la subsp. *lycioides*, de la zona oriental. Para distinguirla de otras especies próximas se acude a su pilosidad, siendo en ocasiones la diferenciación una tarea complicada.

Hay cierta tendencia al dimorfismo sexual: los pies masculinos tienen con frecuencia una floración más abundante y precoz, pero alcanzan menor porte y tienen las hojas también algo menores. Las flores, anemófilas, pero también entomófilas, ofrecen polen y algo de néctar a sus visitantes y sus frutos, que maduran al final de la estación seca, son un recurso alimenticio para aves y pequeños mamíferos. Son arbustos extraordinariamente resistentes a la aridez y capaces de rebrotar tras los incendios. Actualmente se cultiva esta especie para su uso en las repoblaciones ecológicas que tienen por objeto recuperar el tapiz vegetal natural, así como en los tratamientos de terraplenes y taludes de obras públicas, para integrar la obra al paisaje.

La corteza de los tallos, las hojas y los frutos de muchas especies del género *Rhamnus* se han utilizado como laxopurgantes; pero en dosis elevadas puede llegar a producir cólico intestinal; por ello, debe evitarse su empleo sin control médico.

¿Cómo es?

Arbusto perenne dioico, de hasta 2,5 m, erecto, de ramas intrincadas y espinosas, glabras o pubérulas. Hojas alternas o fasciculadas, estipuladas, con pelos cortos y rígidos, coriáceas, de unos 1-3 mm, de aciculares a lanceoladas y nervadura poco visible por el envés; pecíolo indiferenciado o de 0,5-1 mm. Especie dioica, con inflorescencias en fascículos o racimos axilares, la masculina de unas 8-15 flores y la femenina de 2-6 flores, ocasionalmente con flores hermafroditas. Flores tetrámeras, de 4-6 mm de anchura, con sépalos verde-amarillentos y pétalos rudimentarios, de 0,5-1 mm. El fruto es una drupa globosa de hasta 7 mm, inicialmente verde-rojiza y finalmente negra, que contiene 3 semillas.

¿Dónde crece?

Lo encontramos en matorrales y coscojares xerófilos sobre calizas y dolomías, generalmente en substrato básico. Entre 400–1.400 m de altitud.

¿Quieres visitar el jardín? *Pincha aquí*

¿Quieres conocer esta planta en iNaturalist? *Pincha aquí*

Visita la colección de la Red de Jardines Botánicos y Micológico en iNaturalist *Pincha aquí*

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Detunda-Cueva de Nerja. Calle Carretera de la Cueva, s/n, Maro, Nerja (Málaga). Tfno.: 670 945 712. Email: jbotanico.cuevanerja.csmaea@juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul