2024 /MAR Abejera amarilla, flor de abeja amarilla

Ophrys lutea Cav.

Cneorum tricoccon

JARDÍN BOTÁNICO DETUNDA-CUEVA DE NERJA
P. N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

RED ANDALUZA JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES



HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC



¿Dónde crece?

Ophrys lutea crece en prados húmedos, claros de encinar, tomillares, estepas e incluso en lugares ligeramente nitrificados. En alturas que oscilan de 200 a 1300 m.

¿Dónde podemos encontrarla?

Esta especie se encuentra presente en gran parte del Mediterráneo, habiendo sido observada en numerosas localidades aunque normalmente con un número reducido de individuos.

¿Sabías qué?

Las flores del género Ophrys son únicas, no sólo por su belleza, graduación de color y formas excepcionales, sino también por su habilidad para llamar la atención de los insectos polinizadores. Estas se disfrazan de insecto engañando al insecto polinizador, que viene y trata de copular con entusiasmo con las flores una y otra vez, sirviendo las arremetidas del engañado insecto para polinizar a la astuta planta.

Este engaño sexual o pseudocópula puede ser visual, táctil e incluso olfativo, ya que algunas flores de Ophrys producen sustancias aromáticas que resultan atractivas y estimulantes para los machos de los insectos polinizadores. Esta pseudocópula puede durar desde pocos segundos hasta un cuarto de hora.

Cada especie de Ophrys tiene su propio insecto polinizador y depende completamente de esta especie polinizadora para su supervivencia. Solamente un 10 % de la población de Ophrys llega a ser polinizada, pero esto es suficiente para mantener la población ya que cada flor fertilizada produce más de 10.000 diminutas semillas.

¿Cómo es?

Es una planta herbácea, geófita y bulbosa. Hojas basales entre 5 y 9 cm, ovadas u ovadolanceoladas. Inflorescencia laxa. Brácteas inferiores casi de la misma longitud o más largas que el ovario, oblongo-lanceoladas, de color verde claro o verde amarillento. Sépalos laterles libres, cóncavos, de color verde amarillento. Pétalos laterales entre 5 y 9 mm, oblongolineares, de margen ondulado, amarillentos. Labelo 9-16 mm, más largo que ancho, obovavado, trilobulado, con lóbulos laterales situados en el tercio distal y lóbulo central emarginado y sin apéndice carnoso terminal, algo convexo en la zona media, plano en el margen, pardo violáceo o rojizo negruzco en el centro, con franja marginal de 3-6 mm de anchura, de color amarillo intenso y glabra; mácula central poco a nada brillante, bilobulada, pardo-grisácea o gris azulada. Ginostemo obtuso, sin apículo. Fruto capsular.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Detunda-Cueva de Nerja. Calle Carretera de la Cueva, s/n, Maro, Nerja (Málaga). Tfno.: 670 945 712. Email: jbotanico.cuevanerja.csmaea@juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul