# Bolaga, bufalaga

Thymelaea granatensis (Pau) Lacaita

Viola cazorlensis

Coto Ríos, Jaén 🕅



## ¿Dónde crece?

Tomillares y pastizales, en sustratos calcáreos, 1700-2200 m (s-o).

FLORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FRUTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

# ¿Dónde podemos encontrarla?

Endemismo del S de la Península Ibérica. Sierras de Castril, de Cazorla, de Segura y Calar del Mundo (Granada, Jaén, Albacete).

# ENTRADA TALLER MEDIOAMBIENTAL OFICINA ALMACEN

EN ESTA

**ZONA DEL** 

### ¿Sabías qué?

El nombre genérico "Thymeláea" del latín thymelaea, -ae es la forma en la que denominaban Dioscórides y Plinio al torvisco (Daphne gnidium L.)

El epíteto específico "granatensis" proviene del latín medieval "granatensis, -e", que significa granadino, de Granada.

Se trata de una pequeña y escasa mata leñosa que forma almohadillas compactas, y que muchas veces pasa desapercibida, estando incluida en la Lista Roja Andaluza y en la Lista Roja Nacional con la categoría de VU.

¿Quieres visitar el jardín? Pincha aquí

¿Quieres conocer esta planta en iNaturalist? Pincha aquí

Visita la colección de la Red de Jardines Botánicos y Micológico en iNaturalist Pincha aquí aquí

# ¿Cómo es?

Pequeña mata de hasta 10(15) cm. pulviniforme, con ramas  $\pm$  postradas formando almohadillas compactas, generalmente dioica, verdosa, glabra. Las hojas miden de  $2,5-5 \times 0,5-1,2$  mm, son alternas, linear-oblanceoladas o estrechamente espatuladas, glabras. Las flores se agrupan en inflorescencias en fascículos terminales, con 5-10 flores y brácteas foliáceas. Las flores miden de 3,5-5,5 mm, son actinomorfas, unisexuales, tetrámeras, apétalas; el hipanto mide 2,5-4 mm, es glabro; los sépalos miden 1-1,5 mm, son petaloideos, amarillos. Las flores tienen 8. El ovario es súpero. El fruto mide 2,5-3 mm, con forma de nuez.



**ARDÍN BOTÁNICO TORRE DEL VINAGRE** ? N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. C