



Autor foto: Baldomero Moreno Arroyo

¿Cómo es?

Seta esférica o con forma de pera. Exoperidio (capa externa de la cubierta que envuelve a la parte fértil) inicialmente espinoso o granular, de color blanco a crema o amarillo, acaba desprendiéndose al madurar. Endoperidio (capa interna de la cubierta que envuelve a la parte fértil) con consistencia semejante a la del papel, de color crema o del mismo color que el exoperidio; se abre por un gran poro en la parte superior. Gleba (parte fértil productora de esporas en los gasteromicetes) al principio blanca y maciza, luego amarilla olivácea y finalmente pulverulenta de color pardo. Separada por un diafragma o membrana esponjosa, se encuentra una subgleba más oscura a modo de pseudopie. Carne al principio blanca y maciza, pulverulenta y parda al madurar. Sin olor o sabor particular.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

La Trufa. Zagrilla, Priego de Córdoba (Córdoba). Tfno.: 671 599 562. Email: jmicologico.latrufa.csmaea@juntadeandalucia.es

Bejín de prado

Vascellum pratense (Pers.:Pers.) Kreisel

FRUCTIFICACIÓN **ENE** FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¿Dónde crece?

Como su nombre indica es una especie típica de prados soleados y claros de bosque, aunque también puede encontrarse en bordes de caminos.

¿Dónde podemos encontrarla?

Especie frecuente y a veces abundante, que se encuentra presente en todas las provincias andaluzas. Se desarrolla durante todo el año.

¿Sabías qué?

Sin interés comestible. Comestible mediocre de joven cuando la carne (gleba) está blanca y dura.

Es un género intermedio entre *Lycoperdon* y *Calvatia*. Se diferencia de *Lycoperdon* por su forma más aplanada y la presencia de diafragma entre la gleba fértil y la subgleba estéril del pie. De *Calvatia* se distingue por su reducido tamaño.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul