

2020

Planta
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Linaria nigricans



JARDÍN BOTÁNICO EL ALBARDINAL
P. N. Cabo de Gata-Níjar. Rodalquilar. Almería



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Arbusto perenne dioico, de hasta 2,5 m, erecto, de ramas intrincadas y espinosas, glabras o pubérulas. Hojas alternas o fasciculadas, estipuladas, con pelos cortos y rígidos, coriáceas, de unos 5-35 × 1-5 mm, de aciculares a lanceoladas y nervadura poco visible; pecíolo indiferenciado o de 0,5-1 mm. Especie dioica, con inflorescencias en fascículos o racimos axilares, la masculina de unas 8-15 flores y la femenina de 2-6 flores, ocasionalmente con flores hermafroditas. Flores tetrámeras, de 4-6 mm de anchura, con sépalos verde-amarillentos y pétalos rudimentarios, de 0,5-1 mm. El fruto es una drupa globosa de hasta 7 mm, inicialmente verde-rojiza y finalmente negra, que contiene 3 semillas.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Albardinal. Calle Fundición, s/n, Rodalquilar (Almería). Tfno.: 671 561 226. Email: jbotanico.albardinal.cagpds@juntadeandalucia.es

Espino negro

Rhamnus lycioides L. subsp *lycioides*.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Dónde crece?

Lo encontramos en espinares arbustivos xerófilos y matorrales esclerófilos, espartales, fisuras y repisas de roquedos y pedregales, generalmente en substrato básico. Entre 0-1300 m de altitud.

¿Dónde podemos encontrarla?

Es un endemismo de la península ibérica. Frecuente en su mitad oriental, siendo más esporádico en el sur de Andalucía oriental, con presencia en las provincias de Almería, Granada y Jaén.



¿Sabías qué?

En función de la forma de las hojas se diferencian tres subespecies: la subsp. *laderoi*, principalmente del O de la península ibérica; la subsp. *borgiae* del levante peninsular y ésta, la subsp. *lycioides*, de la zona oriental. Para distinguirla de otras especies próximas se acude a su pilosidad, siendo en ocasiones la diferenciación una tarea complicada.

Hay cierta tendencia al dimorfismo sexual: los pies masculinos tienen con frecuencia una floración más abundante y precoz, pero alcanzan menor porte y tienen las hojas también algo menores. Las flores, anemófilas, pero también entomófilas, ofrecen polen y algo de néctar a sus visitantes. y sus frutos, que maduran al final de la estación seca, son un recurso alimenticio para aves y pequeños mamíferos. Son arbustos extraordinariamente resistentes a la aridez y capaces de rebrotar tras los incendios.

La corteza de los tallos, las hojas y los frutos de muchas especies del género *Rhamnus* se han utilizado como laxopurgantes; pero en dosis elevadas puede llegar a producir cólico intestinal; por ello, debe evitarse su empleo sin control médico.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible