

2019

Planta
del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC



¿Cómo es?

Especie anual, arrosetada, con hojas verde grisáceas, pelosas, con el limbo de oblanceolado a marcadamente lobulado. De la roseta surgen numerosos escapos florales de hasta 30 cm, que ocasionalmente pueden presentar alas estrechas, que sí son evidentes en las ramas secundarias. Las inflorescencias se reúnen en espigas de hasta 13 mm formadas por espiguillas agrupadas densamente, que disponen de tres brácteas, la interna con dos apéndices en forma de uña. Las flores son hermafroditas, pentámeras, con el cáliz de 9-12 mm de color celeste, formado por dientes desiguales, y los pétalos de 9-11 mm de color crema.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Albardinal - C/ Fundición s/n 04071 - Rodalquilar (Almería) - Tfno: 671 561 226 - jbotanico.albardinal.cmaot@juntadeandalucia.es

Saladilla

Limonium lobatum (L. fil.) Chaz.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Dónde podemos encontrarla?

Se distribuye por el sur de mediterráneo, limitándose en la península ibérica al sureste, de Valencia hasta Málaga.

¿Dónde crece?

Vive en pastizales de carácter anual, en ambientes halófilos tanto litorales como continentales, alcanzando los 800 m.

¿Sabías qué?

Este táxon, al igual que otros del género, como *L. insigne* o *L. sinuatum*, son conocidos como siemprevivas debido a que el cáliz, coloreado y de carácter papiráceo, es bastante persistente y a pesar de perder los pétalos, parecen seguir en flor. Esta característica hace que se empleen en el ámbito doméstico para elaborar ramos de flores secas.


En algunas zonas de Australia, donde se ha introducido esta especie por su utilización como ornamental, se ha convertido en una especie invasora en zonas de cultivos, por su adaptación a germinar y crecer en suelos salinos, y su capacidad de germinar en suelos áridos.

Junto con *L. sinuatum* son las únicas dos especies del género que no presentan hojas enteras y tienen un apéndice en forma de uña en la bráctea interna. Aunque ambas especies son similares, a diferencia de *L. lobatum*, *L. sinuatum* es perenne y no presenta el cáliz dentado, siendo de color azul intenso.

Estas uñas pueden estar relacionadas con la dispersión por animales, aunque también parece que las gotas de lluvia colaboran en este proceso, pues lo que se dispersa son las espiguillas completas, no las semillas individualmente. Su carácter anual condiciona a la pluviometría su presencia y abundancia en el territorio.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



JARDÍN BOTÁNICO EL ALBARDINAL
P. N. Cabo de Gata-Níjar. Rodalquilar. Almería



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE