



Autor foto: Pablo J. Pérez Daniels

¿Cómo es?

Píleo (sombrero) con forma de embudo, después aplanado, deprimido en la zona de inserción con el pie, de 2-8(-10) cm de diámetro; de color crema amarillento a pardo oscuro, con la superficie lisa, seca y mate. Himenóforo (parte de la seta donde se producen las esporas) situado en la zona inferior del píleo, constituido por láminas delgadas, de color blanco a crema. Pie excéntrico, cilíndrico de hasta 6 x 2 cm, macizo, de color blanco, fibriloso. Base cubierta de un fino tomento, con micelio de color blanco y con restos de *Eryngium campestre*. Carne fibrosa, de color blanco a crema ocráceo. Olor fúngico y sabor dulce.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

La Trufa. Zagrilla, Priego de Córdoba (Córdoba). Tfno.: 671 599 562. Email: jmicologico.latrufa.cagpds@juntadeandalucia.es

Seta de cardo

Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

¿Dónde crece?

Especie que crece en prados y claros de bosque, sobre las cañas muertas del cardo corredor (*Eryngium campestre*).

¿Dónde podemos encontrarla?

Muy frecuente en todas las provincias andaluzas, podemos encontrarla en otoño y en primaveras lluviosas.

¿Sabías qué?

Está considerada como un excelente comestible, siendo una de las setas más populares entre los recolectores.

Se cultiva a nivel industrial, aunque su proceso es más complejo que el del champiñón o el *Pleurotus ostreatus*, motivo por el que actualmente se sigue investigando en la mejora de su producción.

Puede confundirse con algunas especies del género *Clitocybe* y con su variedad *Pleurotus eryngii* var. *ferulae*, siendo fácil su diferenciación con la simple observación de su hábitat, ya que esta última crece sobre la cañaheja (*Thapsia villosa*).

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible