2022 /AGO

Labiadas

Teucrium chrysotrichum Lange

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

¿Cómo es?

Pequeño arbusto o mata de hasta 20 cm, rizomatoso, erecto o cespitoso. Con tallos cuadrangulares que pueden ser ascendentes o postrados, finos, rojizos, vellosos, muy foliosos. Las hojas carecen de peciolo (sésiles), en verticilos de 3, oblongo-lineares u ovado-lineares de 12 × 3-4 mm aproximadamente, espatuladas, cuneadas, con borde crenados o casi lobuladas desde la mitad, con 5 lóbulos a cada lado, fasciculadas o en braquiblastos, discoloras, con haz color gris, amarillento o rojizo, con pelos cortos, largos, envés blanquecino. Inflorescencia de 2 a 6 cm, bien diferenciada, en cabezuela terminal, en racimo corto, excepcionalmente ramificada, cabezuelas densas, ovoides. La inflorescencia típica tiene un color amarillo dorado, que es debido a la coloración del indumento que cubre el margen de los dientes del cáliz y el ápice de las bractéolas Brácteas más largas que la cabezuela. Flores sésiles, declinadas. Cáliz tubular, estrecho, irregular 3/2, por fuera verde o rojizo, con pelos patentes, largos, por dentro con pelos cortos, con carpostegio tenue (corona de pelos blancos que cierran el cáliz totalmente cuando éste está maduro y seco, evitando así que se salgan los frutos) ; dientes planos, agudos, aquillados en la fructificación, con mucrón de 1-1,5 mm, rojizo, con pelos amarillentos largos. Corola 10-11 mm, unilabiada (singularidad de muchas especies de este género de la familia de las Labiadas), color crema, rosado o amarillento; tubo 6 mm; lóbulos latero-posteriores glabros, erectos y más cortos que los inferiores; lóbulos laterales oblongo-lanceolados, agudos; lóbulo central ovado, erecto. Núculas 1,9 x 1,2 mm, subglobosas, reticuladas, a veces con glándulas esferoidales, color negro.



¿Dónde crece?

Se trata de un endemismo rondeño, exclusivo de la Sierra de Mijas (Málaga).

¿Dónde podemos encontrarla?

Vive en zonas muy térmicas, parte de matorrales, formando roquedos y colinas pedregosas, en substrato calizo-dolomítico y dolomítico cristalino; abarcando un rango altitudinal que va desde los 100 a los 1000 metros.

¿Sabías qué?

Esta especie presenta un hábitat muy reducido, gravemente amenazado por incendios, construcción no regulada, canteras y con escasas poblaciones fragmentadas, por estos motivos aparece recogida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía bajo la categoría de amenazada.

Está representada en el Jardín Botánico El Castillejo, junto a otras especies propias de estas sierras del sur de Málaga, como son *Linaria clementei, Linaria huteri* o *Genista haenseleri*, entre otras.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí

JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque, Cádiz

Abies pinsapo

RED ANDALUZA JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible