

Quitameriendas

Merendera montana (L.) Lange

Abies pinsapo



JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Planta herbácea perenne que presenta un bulbo de oblongo a ovoide, con un tamaño de 2-3 x 1,5-2 cm y túnicas protectoras que forman un cuello de 3-12,5 cm. Tallo subterráneo, la mayor parte de tiempo no visible, pero que alcanza 2 cm en la floración y hasta de 4 cm en la fructificación. Catáfilo (hojas modificadas sin clorofila que protegen la yema apical) con el ápice libre de obtuso a truncado y con un mucrón poco saliente hasta de 1 mm. Hojas lineares, 50-160 x 3,5-10 mm, 2-4 (en raras ocasiones 5) por cada flor o bulbo, acanaladas, con margen liso o un poco áspero, en general con un desarrollo muy posterior al de las flores y subterráneas en la antesis. Flores 1(2) por bulbo, que aparecen en verano u otoño, subsésiles o con un pedicelo hasta de 15 mm en la antesis. Tépalos de color morado o rosado, con frecuencia blanquecino hacia la base, con nervios rectos u ondulados. Filamentos estaminales con anteras amarillas que pueden ser desde un poco más largas a 3(7) veces más largas que los filamentos, rara vez iguales o algo más cortas. Estilos 3-12 cm; estigma de puntiforme a capitado, con los márgenes a menudo decurrentes. Cápsula que puede alcanzar los 25 mm, elipsoide, con un largo pedicelo que la eleva claramente por encima del nivel del suelo. Las semillas son de color pardo.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

¿Dónde crece?

Pastos de montaña a menudo nitrificados por el ganado, claros de matorral, de bosque, bordes de caminos, eras, tanto en substrato calizo como silíceo, desde el nivel del mar hasta muy por encima de los 2000 metros de altitud.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de un endemismo ibérico, presente en la Península Ibérica y centro de los Pirineos franceses.

¿Sabías qué?

Merendera es un género que cuenta con entre 10 y 15 especies, dependiendo del autor, exclusivo de la Cuenca Mediterránea. En la Península Ibérica están presentes 3 taxones: *M. montana*, *M. filifolia* y *M. androcymbioides*. Este último es de floración primaveral y los dos primeros otoñal, debiendo de prestar atención en la presencia/ausencia de hojas durante la antesis. En caso de ausencia de hojas durante este periodo fenológico y con estigmas decurrentes, estaremos ante *M. montana*; si presenta hojas durante la floración y estigma no recurrente, será el caso de *M. filifolia*.

Un género muy próximo, es *Colchicum*, con taxones como *C. lusitanicum* y *C. autumnale* de floración otoñal pero que se diferencian de las merenderas, por presentar los tépalos soldados en un tubo de al menos 3 cm.

Ambos géneros son tóxicos para los herbívoros por presencia de colchicina.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 

