

2024 / ABR

Hypochaeris salzmänniana DC.

Diplazium caudatum



JARDÍN BOTÁNICO EL ALJIBE
P. N. Los Alcornocales. Alcalá de los Gazules. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTANICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Es una hierba anual con tallos de 6-30 centímetros. Hojas en roseta basal, de dentadas a pinnatifidas. Pedúnculo foral marcadamente clavado, generalmente con pelos. Involucro mucho más pequeño que las flores, que son amarillas. Brácteas del involucro con una fila de pelos duros y erectos en el nervio medio. Aquenios externos 4-5 milímetros, sin pico; los internos 8-9 milímetros, con pico. Vilano de 10,5-16 milímetros, con los pelos externos escábridos y los internos plumosos. Florece de marzo a mayo y fructifica de mayo a junio. Anual como *Hypochaeris glabra* pero con flores mayores. Se diferencia de la perenne *Hypochaeris radicata* por los pedúnculos florales ensanchados en el ápice.

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC


SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

¿Dónde crece?

Especie distribuida por el suroeste de España (Cádiz) y oeste de Marruecos. En el litoral gaditano la encontramos desde Conil hasta La Línea de la Concepción, en la zona franca con Gibraltar.

¿Dónde podemos encontrarla?

Ocupa dunas, retamares y herbazales costeros cerca de la línea de playa, en suelos arenosos, aunque en algunas localidades se aleja de la línea de playa como ocurre en el Pinar de la Breña en Barbate y Pinar del Rey en San Roque donde es frecuente verla formando parte de los arenales de las zonas de cortafuegos. Tolerancia a niveles altos de nitrógeno, por lo que puede convivir con especies nitrófilas tales como *Plantago coronopus*, *Hedypnois cretica* y *Paronychia argentea*.



¿Sabías qué?

Es una especie protegida por la ley andaluza que se encuentra recogida con la categoría de Vulnerable. Es por ello que se está incluida en el del Plan de Recuperación Dunas, Arenales y Acantilados Costeros.

La mayor población de *Hypochaeris salzmänniana* se concentra en la franja costera de Conil-El Palmar, aunque hay núcleos dispersos por la mayor parte del litoral. Concretamente, dentro del sector Aljibico se encuentra en los municipios de Barbate, Tarifa, Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción.

Es de destacar que fruto de los trabajos de prospección del litoral incluidos en el marco de actuación del dicho plan de conservación, se está ampliando el área de distribución de esta especie al haber localizado numerosos núcleos nuevos.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Aljibe. Carretera Benalup-Casas Viejas (A-2228), km. 1, Alcalá de los Gazules (Cádiz). Tfno.: 697 956 959. Email: jbotanico.aljibe.csmaea@juntadeandalucia.es



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul