

2024 /JUL

Amapola marina, adormidera marina

Glaucium flavum Crantz

Diplazium caudatum



JARDÍN BOTÁNICO EL ALJIBE
P. N. Los Alcornocales. Alcalá de los Gazules. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Esta hierba suele comportarse como perenne, alcanzando los 90 cm, con tallos erectos, generalmente ramificados. Hojas de 15-30 x 4-5 cm, divididas, con segmentos lobado-dentados y dientes aristados, de color grisáceo y densamente vilosas; las inferiores son pecioladas y se disponen en una roseta basal y más largas que las que se disponen en el tallo. Estas últimas son sésiles y abrazan al tallo. Las flores son solitarias, hermafroditas, sobre pedúnculos de 1-2 cm, con 2 sépalos de 15-30 x 5-10 mm, ovado-oblongos, con pelos esparcidos. Los pétalos son 4, de 30-40 mm, obovados o suborbiculares, amarillos, con frecuencia manchados en la base, presentando numerosos estambres filiformes y anteras amarillas. El fruto es una cápsula de 15-30 cm, cilíndrica y alargada, con dos lóculos, recurvada. Las semillas son negras, de 1,5 x 1 mm.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Aljibe. Carretera Benalup-Casas Viejas (A-2228), km. 1, Alcalá de los Gazules (Cádiz). Tfno.: 697 956 959. Email: jbotanico.aljibe.csmaea@juntadeandalucia.es

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

¿Dónde crece?

Vca, Islas Canarias. Dispersa por la Península Ibérica y Baleares.

Vegetación nitrófila, generalmente sobre arenas litorales y gravas, a veces en el interior.

¿Dónde podemos encontrarla?

Dispersa por el litoral del continente europeo y sus principales islas y naturalizada en otras zonas de Europa. Se encuentra además en el suroeste de Asia y en el noroeste de África.


¿Sabías qué?

En la actualidad, la flora costera española está especialmente expuesta a amenazas de carácter antrópico, fundamentalmente debido a la urbanización en las áreas costeras, al incremento en el uso público intensivo del litoral así como a la limpieza mecanizada de gran número de playas.

En el caso de esta especie, se ha comprobado una disminución en más del 60% de las localizaciones constatadas en Andalucía en la últimas décadas, siendo la causa fundamental de esta desaparición la destrucción de su hábitat.

Al igual que otras especies de la familia papaveráceas, la amapola marina produce una serie de alcaloides que, además de tener un importante papel ecológico, poseen propiedades terapéuticas.

Su llamativa floración y el tono azulado de sus hojas la hacen candidata a ser empleada en jardinería. Resulta además útil para la restauración de zonas costeras.



¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Junta de Andalucía

Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul