

Abies pinsapo



JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz



¿Cómo es?

Se trata de un género muy diverso tanto en número de especies como en formas biológica. Son plantas herbáceas anuales, bienales o perennes, glabras o pelosa, con tallos heteromorfos: que pueden ser fértiles o estériles; o tallos homomorfos, sin diferenciación. Hojas homomorfas o heteromorfas, enteras, pinnatinervias, de lineares a suborbiculares, obtusas o agudas, atenuadas, truncadas, generalmente planas y sésiles; las inferiores con frecuencia verticiladas; las superiores alternas. La inflorescencia es terminal en racimo o espiga, generalmente laxa, al menos en la fructificación, con brácteas opuestas. Lo más característico de este género son sus flores zigomorfas (poseen un solo plano de simetría), pediceladas o sésiles, con el pedicelo por lo general acrescente (que sigue creciendo después de fecundada la flor). Cáliz, profundamente dividido, con 5 sépalos iguales o desiguales, en este caso el superior mayor o menor que los laterales, de lineares a ovados, soldados solo en la base, no imbricados, generalmente más cortos que el tubo de la corola, por lo general acrescentes, más cortos o más largos que la cápsula, erectos o alrededor de ella. Corola personada (bilabiada en la que el labio inferior tiene

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: jbotanico.castillejo.csmaea@juntadeandalucia.es

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

una abolladura o paladar que cierra la garganta), en ocasiones versicolor, de color blanco, amarillo, rojizo, violeta, rosa o lila, con frecuencia con venas más oscuras; tubo cilíndrico, a veces lateralmente comprimido, prolongado en la base en un espolón; labio superior erecto o erecto-patente, con 2 lóbulos profundamente separados, iguales, enteros; labio inferior de patente a reflexo, con 3 lóbulos. Fruto tipo cápsula son numerosas semillas.

¿Dónde crece?

Ocupa prácticamente cualquier hábitat: rupícola, pastizales, sotobosque de quercíneas y pinares, desde las arenas costeras hasta las cotas más elevadas de nuestras sierras.

¿Dónde podemos encontrarla?

Se distribuye principalmente por Europa, norte de África, centro y oeste de Asia, algunas de las cuales se encuentran introducidas y naturalizadas en otras regiones, por lo general en zonas templadas.

¿Sabías qué?

Es el género, el más diversificado de la tribu Antirrhineae, comprende unas 150 especies, de las que unas 40 están presentes en la Península Ibérica. En Andalucía contamos con muchos taxones endémicos de este género como: *Linaria huteri*, *L. clementei*, *L. becerrae*, *L. sagrensis*, *L. subbaetica*, *L. amethystea* subsp. *toloxense* o *L. aeruginea* subsp. *nevadensis*.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 

